

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05)

Questão 01 (Peso 1)

De acordo com a norma culta, a alternativa que apresenta a colocação pronominal correta é

- A) Ontem encontrei-me com a Dra. Cláudia e recebi o relatório.
- B) A acompanhante, que lhe pediu orientação, chama-se Maria.
- C) Entregarei-lhe o relatório que deverá ser encaminhado ao especialista.
- D) Me trataram com respeito, tanto o Médico quanto a Equipe de enfermagem.
- E) Ninguém procurou-me ontem. Os acompanhantes do paciente foram embora após o procedimento.

Questão 02 (Peso 2)

_____ anos que elas não cuidavam da saúde. Agora, estão _____ motivadas a mudar os hábitos alimentares e entenderam que Fibra é _____ para o intestino.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Havia / bastante / boa
- B) Havia / bastante / bom
- C) Havia / bastantes / boa
- D) Haviam / bastantes / boa
- E) Haviam / bastantes / bom

Questão 03 (Peso 2)



Google Imagens (2017)

Durante o _____, após a realização da _____, prescrevi _____ para o paciente José Silva da unidade _____.

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que preenche correta e sequencialmente as lacunas do trecho acima são

- A) fim-de-semana / ultra-sonografia / anti-inflamatório / semintensiva
- B) fim-de-semana / ultra sonografia / antiinflamatório / semi-intensiva
- C) fim de semana / ultrassonografia / anti inflamatório / semi intensiva
- D) fim de semana / ultra-sonografia / anti-inflamatório / semi-intensiva
- E) fim de semana / ultrassonografia / anti-inflamatório / semi-intensiva

Questão 04 (Peso 2)

Compareci ___ emergência ontem. Eu estava ___ distância de dez metros do veículo. Nunca vi um acidente igual _____.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a / a / àquele
- B) a / à / aquele
- C) à / a / aquele
- D) à / à / àquele
- E) à / há / aquele

Questão 05 (Peso 3)

A maioria dos candidatos _____ pela vaga da capital. _____ dez anos que moro fora de Salvador. Posso assegurar que _____ bem no interior.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) optou / Faz / se vive
- B) optaram / Faz / se vive
- C) optou / Fazem / vive-se
- D) optaram / Fazem / se vive
- E) optaram / Fazem / vive-se

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10)

Questão 06 (Peso 1)

Nem sempre o mouse está disponível e as teclas especiais podem ser muito úteis na edição de textos. Sobre a ação realizada no Word, versão 2007, ao pressionar, simultaneamente, as teclas CTRL e END, é correto afirmar que desloca o cursor para o

- A) fim da linha.
- B) fim do parágrafo.
- C) fim do documento.
- D) final da página atual.
- E) final do parágrafo anterior.

Questão 07 (Peso 2)

Dra. Cláudia resolveu acompanhar o Índice de Massa Corporal (IMC) dos seus pacientes e criou uma planilha no Excel 2007. Sabe-se que o IMC é calculado dividindo-se o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado.

Figura 1_Planilha IMC

	A	B	C	D	E	F	G
1	TABELA DE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL						
2	Paciente	Idade (anos)	Peso (kg)	Estatura (m)	IMC		
3	A.L.D.	16	65	1,54			
4							
5							
6							






Fonte: Elaboração Própria (2017)

Para calcular o IMC, deve-se digitar na célula E3 da planilha apresentada na figura 1 os seguintes caracteres

- A) =C3/(^D3)
- B) =C3/(D3*2)
- C) =C3/(2^D3)
- D) =C3/(D3^2)
- E) =C3*(D3/D3)

Questão 08 (Peso 2)

Para paginar um relatório digitado no Word 2007, a opção que deve ser selecionada na barra de ferramentas Inserir é

- A) 
- B) 
- C) 
- D) 
- E) 

Questão 09 (Peso 3)

Existem vários tipos de backup. O backup _____, por exemplo, consiste na cópia de todos os dados que foram modificados desde o último backup. Assim, primeiro verifica-se o horário de alteração de um arquivo é mais recente que o horário de seu último backup. Se o arquivo não foi modificado desde o último backup, é ignorado, mas se a data de modificação for mais recente que a data do último backup, o backup é feito.


A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) normal
- B) completo
- C) diferencial
- D) progressivo
- E) incremental

Questão 10 (Peso 2)

Foi elaborada uma relação de materiais no Word 2007, para ressurgimento na Unidade de Saúde da Família, conforme apresentado na figura 2.

Figura 2_Relação de materiais



Fonte: Elaboração própria

Para organizar os materiais em ordem alfabética, a alternativa que contém o recurso a ser clicado na barra de ferramentas é

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 11 (Peso 1)

O e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB) é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Esta ação está alinhada à proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população. A estratégia e-SUS AB, faz referência ao processo de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico.

Disponível em: <<http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php>>. Acesso em: 17 jan. 2017. (Adaptado).

Sobre o e-SUS AB, é correto afirmar que

- A) a regulação do usuário na “fila de espera” para atenção especializada é realizada, atualmente, através do e-SUS AB.
- B) a implantação do e-SUS AB necessita da instalação de computadores com conectividade, pelo menos, nos consultórios, recepção e sala de vacina.
- C) a entrada de dados no e-SUS é individualizada por cidadão, possibilitando a gestão do cuidado e aproximação desses dados ao processo de planejamento da equipe.
- D) a digitação e o envio dos dados do e-SUS AB devem ser, obrigatoriamente, realizados pelos Agentes Comunitários de Saúde e auxiliares administrativos das Unidades Básicas de Saúde.
- E) os municípios que utilizam prontuários eletrônicos privados não necessitam integrar à plataforma nacional. Para isso, basta informar ao Ministério da Saúde que fazem uso de outro software.

Questão 12 (Peso 1)

_____ é um instrumento de avaliação familiar bastante útil no mapeamento de redes, apoios sociais e ligações da família com a comunidade. Costuma ser utilizado em associação ao _____ tanto para fins diagnósticos, quanto em planejamento de ações em saúde. Ambos os instrumentos retratam graficamente a constituição e as dinâmicas relacionais de um grupo social com foco na família.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) O Ecomapa / Genograma
- B) O APGAR Familiar / Programa Telessaúde
- C) O Projeto Terapêutico Singular / e-SUS AB
- D) O *Family Assessment Device* / Projeto Terapêutico Singular
- E) A Programação para Gestão por Resultados na Atenção Básica (PROGRAB) / Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF)

Questão 13 (Peso 1)

As Unidades de Atenção Básica, muitas vezes, são os únicos equipamentos públicos que diversas pessoas se relacionam e precisam agir de forma abrangente e integral para servir como instrumento de integração de diversas políticas públicas, como as de educação e segurança. Em relação à atenção às mulheres em situação de violência sexual e/ou doméstica, tendo como base o Protocolo de Saúde da Mulher e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) do Ministério da Saúde, é correto afirmar que

- A) a atenção ao risco de abortamento deve ser compreendida como uma ação exclusiva dos hospitais de referência em saúde da mulher.
- B) o Protocolo apresenta-se como um documento de sistematização do plano de ações e cuidados às mulheres, no entanto não representa o arcabouço ético-legal para a atuação dos trabalhadores da Atenção Básica.
- C) o acolhimento com escuta qualificada, no caso da violência contra a mulher, é uma das principais estratégias para a garantia do cuidado, principalmente, no registro da ocorrência policial, que, nesse caso, é obrigatório.
- D) a violência doméstica/intrafamiliar ocorre entre os parceiros e entre os membros da família, principalmente, no ambiente da casa, representando, percentualmente, menor frequência se comparado à taxa de mortalidade das demais causas de violência contra a mulher.
- E) a busca para o atendimento integral das mulheres, com acolhimento de suas demandas e necessidades, a garantia do acesso e as respostas a contento, ainda estão em processo de consolidação no Brasil, apesar da construção de documentos norteadores e protocolos.

Questão 14 (Peso 2)

A _____ precisa ser entendida, ao mesmo tempo, como uma 'prática de ensino-aprendizagem' e como uma 'política de educação na saúde'. Ela se parece com muitas vertentes brasileiras da _____ e compartilha muitos de seus conceitos, mas enquanto a _____ tem em vista a cidadania, a _____ tem em vista o trabalho.

Disponível em: <<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/>>. Acesso em: 18 jan. 2017. (Adaptado).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) educação profissional em saúde / educação popular em saúde / educação popular em saúde / educação profissional em saúde
- B) educação popular em saúde / educação em saúde / educação em saúde / educação popular em saúde
- C) educação permanente em saúde / educação popular em saúde / educação popular em saúde / educação permanente em saúde
- D) educação permanente em saúde / educação em saúde / educação em saúde / educação permanente em saúde
- E) educação profissional em saúde / educação continuada / educação continuada / educação profissional em saúde

Questão 15 (Peso 3)

O principal objetivo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) é induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica (AB) em Saúde.

Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Manual_Instrutivo_3_Ciclo_PMAQ.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017 (Adaptado)

Considerando os objetivos específicos do PMAQ, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Fornecer padrões e subsidiar as ações de órgãos de controle e auditoria do SUS.
- () Realizar a remuneração dos trabalhadores do SUS por desempenho, de forma equânime.
- () Melhorar a qualidade da alimentação dos Sistemas de Informação, como ferramenta de gestão da AB.
- () Injetar recursos financeiros no sistema de saúde local com vistas a diminuir o subfinanciamento da saúde.
- () Ampliar o impacto da AB sobre as condições de saúde da população e sobre a satisfação dos seus usuários

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V V V
- B) V F F V F
- C) F V F F F
- D) F F V F V
- E) F V V V V

Questão 16 (Peso 2)

Sobre os modelos de Atenção em saúde, Paim (2008, p. 554) afirma que “[...] refletem as combinações tecnológicas disposta nos meios de trabalho. São uma espécie de lógica que orienta a ação e organiza os meios de trabalho (saberes e instrumentos) utilizados nas prática de saúde”.

Considerando a mudança de lógica de Programa Saúde da Família (PSF) para Estratégia de Saúde da Família (ESF), é correto afirmar que

- A) a mudança de nomenclatura se deu pela baixa implementação do PSF no Brasil.
- B) a ESF é uma alternativa de assistência à saúde para a população que reside nas periferias das grandes cidades e na zona rural.
- C) a mudança de nomenclatura foi suficiente para induzir as mudanças no modelo de atenção, que reproduzam práticas mais cuidadosas e resolutivas no SUS.
- D) a mudança de lógica foi orientada pela compreensão que a ESF deveria ser o modelo de atenção que fosse alternativa para toda população brasileira, independente de ser para zona rural ou para zona urbana.
- E) não há diferença histórica e conceitual entre o PSF e a ESF quanto à atuação prática no SUS. Desta forma, é indiferente a classificação em Programa ou Estratégia.

Questão 17 (Peso 2)

Sobre o processo de trabalho da equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF), de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é correto afirmar que

- A) é desenvolvido com o mais alto grau de centralização, próximo da vida das pessoas.
- B) utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- C) utiliza baixa densidade tecnológica e cuidado simplificado, que devem auxiliar o manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e menor relevância no território.
- D) é desenvolvido por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, pelas quais não assume a responsabilidade sanitária.
- E) consiste em ações de vigilância em saúde e de atenção à saúde que devem ser rigorosamente separadas do processo de trabalho da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), envolvendo as ações do Sistema de Informação de Agravos e do Programa Nacional de Imunização.

Questão 18 (Peso 2)

O Ministério da Saúde compreende o envelhecimento populacional como uma conquista e um triunfo da humanidade no século XX, mas reconhece que existem muitos desafios para que o envelhecimento aconteça com qualidade de vida. No campo das políticas e dos programas dirigidos à população idosa, o desafio é contemplar seus direitos, suas preferências e suas necessidades, para a manutenção e a melhoria da sua capacidade funcional, garantindo a atenção integral à sua saúde.

Disponível em: <http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_pessoa_idosa_3ed.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2017.

Sobre a Caderneta do idoso, é correto afirmar que

- A) a Caderneta permite o registro e o acompanhamento de informações por um período de sete anos.
- B) a pessoa idosa deve levar a Caderneta consigo apenas nas consultas para evitar a perda da Caderneta.
- C) a Caderneta deve ser preenchida por apenas um profissional, evitando duplicidade de informações.
- D) a Caderneta tem o propósito de auxiliar no bom manejo da saúde da pessoa idosa, sendo usada tanto pelas equipes de saúde quanto pelo idoso, familiares e cuidadores.
- E) a Caderneta tem como função ser um instrumento de coleta de dados e monitoramento das ações, entretanto não tem o objetivo de qualificar a atenção ofertada às pessoas idosas.

Questão 19 (Peso 3)

Durante o mês de novembro, o Gerente de uma Unidade de Saúde da Família (USF) aderiu ao movimento “Novembro Azul” e decidiu que todos os profissionais das equipes deveriam recomendar ou proceder a marcação de exames de toque retal e dosagem de Antígeno Prostático Específico (PSA) para homens adultos maiores de 50 anos e maiores de 45 anos, no caso de homens negros e com parentes de primeiro grau de portadores de câncer de próstata.

Considerando a situação hipotética acima e de acordo com os protocolos existentes e as orientações do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer (INCA), é correto afirmar que

- A) a organização do serviço no novembro azul com o objetivo de prevenir o câncer de próstata é uma solução acertada para aumentar as taxas de sobrevivência nos casos diagnosticados.
- B) a campanha “Novembro Azul”, assim como no caso do “Outubro Rosa”, tem contribuído com a diminuição de casos de morte em relação ao câncer de próstata no Brasil nos últimos cinco anos.
- C) o Gerente da Unidade de Saúde fez uma ação correta em promover a campanha “Novembro Azul” e em recomendar os exames de toque retal e dosagem de PSA, pois o câncer de próstata é o câncer com maior letalidade no país.
- D) o “Novembro Azul” é fundamental para a promoção da saúde do homem, já que eles são menos frequentes nas unidades de saúde e o exame de toque retal é obrigatório para homens nas faixas etárias descritas pelo Gerente da USF.
- E) o INCA e o Ministério da Saúde não recomendam a organização de programas de rastreamento de câncer de próstata, pois as evidências mostram que é mínima a redução da mortalidade por câncer de próstata por meios de programas.

Questão 20 (Peso 3)

Sobre as atribuições da Atenção Básica, segundo a Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Produzir, conjuntamente, metodologias de ação e de investigação de casos.
- () Reconhecer os processos produtivos no território e intervir na autuação do estabelecimento.
- () Preencher o laudo de exame médico da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) nos casos pertinentes.
- () Direcionar o trabalhador para o órgão responsável, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), para prestar orientações trabalhistas e previdenciárias básicas.
- () Identificar os potenciais riscos e impactos à saúde dos trabalhadores no território de abrangência da Atenção Básica.
- () Encaminhar o trabalhador para o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) para que o caso seja notificado nos sistemas de informação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V F
- B) V V F F F V
- C) V F F V F V
- D) F F V F V F
- E) F V V V V F

Questão 21 (Peso 3)

Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, o Manual sobre o cuidado em saúde junto à população em situação de rua e a Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011, que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultórios na Rua, é correto afirmar que

- A) os Consultórios na Rua realizam atendimentos apenas à população de rua em abstinência de drogas.
- B) os Consultórios na Rua são equipes da atenção especializada, compostas por um elenco de profissionais da assistência social.
- C) os Agentes Comunitários de Saúde não realizam atividades com a população de rua, cabendo apenas ao Agente Social essas atribuições.
- D) a responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde (SUS), entretanto, é dos Consultórios na Rua a responsabilidade exclusiva de atendimento à população de rua.
- E) a Redução de Danos é uma estratégia da Saúde Pública que busca minimizar as consequências adversas do consumo de drogas do ponto de vista da saúde e dos seus aspectos sociais e econômicos sem, necessariamente, reduzir esse consumo.

Questão 22 (Peso 1)

Um princípio e uma diretriz da Política Nacional de Humanização (2013), são, respectivamente, _____ e _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) ambiência / clínica ampliada
- B) transversalidade / acolhimento
- C) indissociabilidade entre atenção / gestão e universalidade
- D) defesa dos direitos dos usuários / valorização do trabalhador
- E) responsabilidade sanitária / autonomia dos sujeitos e coletivos

Questão 23 (Peso 1)

A construção de pesquisas que busquem o progresso científico, mas que respeitem os direitos humanos individuais e coletivos, é um dos grandes avanços da bioética no fim do século XX e início do século XXI. São princípios da bioética, descritos no Relatório de Belmont:

- A) Beneficência, Autonomia e Justiça.
- B) Integralidade, Autonomia e Justiça.
- C) Legalidade, Autonomia e Benevolência.
- D) Integralidade, Universalidade e Equidade.
- E) Beneficência, Autonomia e Universalidade.

Questão 24 (Peso 3)

A noção de Clínica Ampliada no Sistema Único de Saúde (SUS) é um elemento importante para constituição de novas práticas cuidadosas e resolutivas no SUS.

Sobre os eixos fundamentais de Clínica Ampliada, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Compreensão ampliada sobre processo saúde-doença.
- () Aprofundamento do núcleo e campo de práticas e saberes.
- () Ampliação de tecnologias leves, como o conhecimento teórico do núcleo profissional.
- () Capacidade do profissional de não se envolver emotivamente e afetivamente com o caso.
- () Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas com os profissionais da equipe e usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F F
- B) V F V V F
- C) V V F F V
- D) F V F F V
- E) F F F V V

Questão 25 (Peso 2)

O _____ é instrumento de organização do cuidado em saúde construído entre _____ considerando as singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. A identificação das necessidades de saúde, a discussão do diagnóstico e a definição do cuidado são _____ o que leva a aumento da eficácia dos tratamentos, pois a ampliação da comunicação traz o fortalecimento dos vínculos e o aumento do grau de _____.

Fonte: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS: gestão participativa e cogestão. Brasília: Ministério da Saúde, 2009 (adaptado)

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) Projeto Terapêutico Singular / equipe e especialistas / individualizadas / seriedade
- B) Projeto Terapêutico Singular / equipe e usuário / compartilhadas / corresponsabilização
- C) Projeto Terapêutico Singular / equipes da Estratégia de Saúde da Família / individualizadas / humanização
- D) Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica / gestores municipais e equipes de atenção básica / elementares / horizontalidade

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica / gestores federais e municipais / fundamentais / investimento financeiro

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 3)

Os principais agravos que acometem a saúde bucal na atenção básica devem ser diagnosticados a nível local e os serviços de saúde devem intervir e controlá-los.

Quanto ao diagnóstico das principais doenças bucais na atenção básica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O exame radiográfico é indispensável para a identificação da lesão de cárie.
- () O diagnóstico diferencial mais importante da fluorose dental é com a mancha branca decorrente de cárie que se apresenta como finas linhas brancas, amareladas ou marrons.
- () A gengivite é uma manifestação inflamatória cujo diagnóstico deve ser pautado na avaliação do controle de placa e da presença de sangramento, de alterações sistêmicas, assim como da presença de tabagismo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F V
- C) V F V
- D) V F F
- E) V V F

Questão 27 (Peso 3)

Segundo o Ministério da Saúde/Caderno de Atenção Básica (2006), os principais agravos que acometem a saúde bucal são: cárie dentária, doença periodontal, câncer de boca, traumatismos dentários, fluorose dentária, edentulismo e má oclusão.

Considerando a prevenção das doenças bucais na atenção básica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O acompanhamento de gestantes para evitar o uso de drogas teratogênicas e a prevenção da cárie e doença periodontal são ações de prevenção da má oclusão.
- () A prevenção do edentulismo dá-se através de mudanças no modelo de oferta dos serviços odontológicos, buscando a incorporação e a universalização das tecnologias restauradoras e reabilitadoras.
- () As medidas de saúde pública intersetoriais e educativas de controle e prevenção da cárie visam possibilitar o acesso ao flúor, a redução do consumo do açúcar e o fornecimento de informações sobre os fatores de risco e autocuidado.
- () As ações de vigilância à saúde com ênfase na prevenção e detecção da doença periodontal incluem a investigação epidemiológica, o controle e a orientação à população sobre as várias formas de utilização do flúor e vigilância do teor de flúor nos cremes dentais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 28 (Peso 1)

De acordo com o Ministério da Saúde/Caderno de Atenção Básica (2006), o tratamento restaurador atraumático é considerado uma estratégia de tratamento apropriado de lesões cáries iniciais, integrada a programas educativo-preventivos em populações com acesso restrito à serviços tradicionais. Utiliza instrumentos manuais para promover a remoção da dentina _____ seguido pelo selamento da cavidade com _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) afetada / amálgama
- B) afetada / selantes resinosos
- C) infectada / selantes resinosos
- D) afetada / cimento de ionômero de vidro
- E) infectada / cimento de ionômero de vidro

Questão 29 (Peso 2)

A atenção primária em saúde constitui a porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS). Na Odontologia, as ações de cuidados devem ser realizadas nos diferentes ciclos de vida no contexto da atenção básica.

Com relação à organização da atenção à saúde bucal nos dois primeiros anos de vida, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A limpeza da cavidade bucal deve ser realizada com tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro a partir da erupção do primeiro dente decíduo.
- () O aleitamento materno protege contra doenças infecciosas e por isso as crianças, sem exceção, devem ser amamentadas, exclusivamente, com leite materno até os seis meses de idade.
- () O aparecimento de sintomas, tais como: salivação abundante, diarreia, aumento da temperatura e sono agitado, pode ser associado à erupção dos dentes. O tratamento deve ser sintomático e, quando necessário, realizar investigação de outras causas para os sintomas descritos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F V
- C) V F V
- D) V F F
- E) V V F

Questão 30 (Peso 2)

O atendimento a pacientes com traumatismo dental exige do profissional uma avaliação criteriosa dos muitos fatores envolvidos.

Quanto ao tratamento de dentes anteriores fraturados em crianças e/ou adolescentes, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Quando o paciente disponibiliza o “pedaço de dente” fraturado, a colagem do fragmento é sempre a conduta mais adequada a ser realizada.
- () O tipo e o grau de extensão da fratura no sentido apical são os fatores que mais influenciam o plano de tratamento e o prognóstico do dente fraturado.
- () A pulpotomia é indicada nos casos de fratura em esmalte/dentina e polpa, quando a exposição pulpar é limitada e a intervenção é imediata à fratura dental.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V F F
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 31 (Peso 3)

Ao longo da história da humanidade, observa-se a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas. A saúde bucal constitui, em toda sua complexidade, parte integrante e inseparável da saúde geral. Considerando essa associação, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Hipotireoismo () As alterações na mucosa oral, como o aparecimento de pigmentação macular marrom, são, frequentemente, as primeiras manifestações da doença.
- (2) Doença de Addison () O edema da face, o aumento difuso da língua e os lábios espessos são manifestações clínicas observadas devido ao acúmulo de glicosaminoglicanos.
- (3) Estomatite Urêmica () A presença de placas brancas e dolorosas predominantemente na mucosa jugal, língua e assoalho da boca são observadas e o paciente se queixa de dor oral ou sensação de queimação nas lesões.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2
- B) 1 2 3
- C) 2 1 3
- D) 3 2 1
- E) 3 1 2

Questão 32 (Peso 3)

A gengivite necrosante, a periodontite necrosante e a estomatite necrosante são as formas de doença periodontal inflamatória mais graves provocadas pela placa bacteriana. O conhecimento da prevalência e das características clínicas e histopatológicas são fundamentais para diagnóstico e adequado tratamento.

Quanto à doença periodontal necrosante, é correto afirmar que

- A) as primeiras lesões, frequentemente, surgem na área interproximal da região anterior da maxila.
- B) a periodontite necrosante ocorre quando o processo de necrose progride além da junção mucogengival, distinguindo-se da gengivite necrosante.
- C) as lesões necrosantes são dolorosas, apresentam evolução lenta e tendem a provocar sangramento de forma espontânea ou em resposta a estímulos leves, razão pela qual os pacientes procuram atendimento odontológico.
- D) a doença periodontal necrosante (DPN) pode ser confundida com outras doenças da mucosa oral, dentre elas, a gengivoestomatite herpética primária. No diagnóstico diferencial entre essas doenças, sabe-se que a DPN acomete, frequentemente, indivíduos na faixa etária entre 15 e 30 anos e, clinicamente, observa-se tecido necrótico, ulcerado e placa branco-amarelada.
- E) o tratamento inicial consiste em eliminar a atividade da doença manifestada pela progressão da necrose tecidual e evitar a dor e o desconforto. A raspagem deve ser realizada para remover depósito moles e calcificados. Além disso, o paciente deve ser instruído sobre os cuidados com a higiene oral e o uso de agentes químicos para controle de placa nas áreas com feridas abertas, uma vez que a escovação não permite a cicatrização. Dentre os agentes químicos recomenda-se o uso de peróxido de hidrogênio a 37% e solução de clorexidina 0,2%.

Questão 33 (Peso 1)

A prevenção do câncer bucal reafirma a importância da implantação de ações para prevenção, programas de saúde pública e divulgação de fatores de risco para a sociedade. Dentre estes fatores, sabe-se que a deficiência de ferro, especialmente a forma grave e crônica conhecida como Síndrome de _____ é associada a um risco elevado de carcinoma de células escamosas do esôfago, da faringe e da área posterior da boca.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Eagle
- B) Sjogren
- C) Crouzon
- D) Paterson-Kelly
- E) Papillon-Lefevre

Questão 34 (Peso 2)

A anamnese e a avaliação física fornecem informações essenciais para o diagnóstico e ajudam o cirurgião-dentista a estabelecer o perfil do paciente. As informações coletadas são pré-requisitos importantes para a escolha da solução anestésica e prescrição de medicamentos.

Quanto à terapêutica medicamentosa em Odontologia, é correto afirmar que

- A) o anestésico local mepivacaína 3% é indicado para procedimentos de longa duração e quando há contra-indicação relativa ao uso de epinefrina.
- B) os antibióticos considerados como seguros para uso clínico em pacientes grávidas são: penicilinas, cefalosporinas, estolato de eritromicina e azitromicina.
- C) a clindamicina faz parte do grupo das lincosaminas, apresenta espectro de ação semelhante ao das penicilinas, porém atinge outros microrganismos, a exemplo do *Staphylococcus aureus* e *Fusobacterium nucleatum*.
- D) o metronidazol é um composto sintético, derivado do nitroimidazol, que apresenta eficácia sobre microrganismos anaeróbicos. O seu mecanismo de ação está associado à inibição da síntese proteica, apresentando ação bacteriostática.
- E) os procedimentos eletivos em gestantes devem ser preferencialmente programados para o segundo trimestre de gestação. Entretanto, em casos de dor ou infecção, deve-se realizar a intervenção e é recomendado o uso de lidocaína 3% com epinefrina 1:10.000.

Questão 35 (Peso 1)

São procedimentos classificados como de urgência em odontologia:

- A) tratamento de alveolite, colagem de fragmentos e recimentação de trabalho.
- B) tratamento de alveolite, tratamento de perfuração radicular e colagem de fragmentos.
- C) imobilização dentária permanente, recimentação de trabalho protético e reimplante de dente avulsionado.
- D) ulotomia, curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial e imobilização dentária permanente.
- E) curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial, capeamento pulpar direto e reimplante de dente avulsionado.

Questão 36 (Peso 1)

Sobre o câncer de boca, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O câncer do lábio é mais comum em pessoas negras e ocorre mais frequentemente no lábio superior.
- () O tratamento do câncer bucal é cirúrgico e quimioterápico. Não é recomendado o uso de radioterapia.
- () O câncer bucal afeta os lábios e o interior da cavidade oral (gengivas, mucosa jugal, palato duro, língua e região embaixo da língua).

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V
- B) F V F
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

Questão 37 (Peso 1)

A _____ é uma lesão no tecido periodontal em dentes decíduos, que se caracteriza pelo deslocamento apical do dente para o interior do alvéolo. O dente parece estar encurtado em suas dimensões.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) avulsão
- B) concussão
- C) percussão
- D) luxação intrusiva
- E) luxação extrusiva

Questão 38 (Peso 3)

A cárie dental é uma doença infecciosa oportunista, de caráter multifatorial, fortemente influenciada pelos carboidratos da dieta e componentes salivares. A adoção de medidas educativas e preventivas é fundamental para o controle da doença cárie, entretanto, em alguns casos o tratamento restaurador é necessário.

Com relação à cárie dental, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O primeiro sinal clínico da atividade de cárie em esmalte é o aparecimento de uma área esbranquiçada, opaca e rugosa.
- () A indicação para realizar o tratamento restaurador com resina composta ou amálgama em áreas de cicatrículas ou fissuras está associada com a probabilidade de envolvimento dentinário.
- () A lesão de cárie em esmalte localizada na superfície proximal de dentes posteriores, observada através de radiografias proximal, deve ser restaurada com resina composta, já que permite a confecção de preparos minimamente invasivos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V F F
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 39 (Peso 2)

Sobre as indicações de tratamento de lesões aos tecidos dentais duros e à polpa em dentes decíduos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Na fratura incompleta de esmalte (trinca) sem a perda de estrutura dentária, geralmente, não se realiza qualquer intervenção.
- () Na fratura de esmalte-dentina com exposição pulpar, o tratamento imediato consiste em realizar restauração com cimento ionômero de vidro (CIV).
- () Na fratura de esmalte que não envolve a polpa, deve-se remover as bordas cortantes e realizar aplicação de verniz com flúor/ restauração com cimento ionômero de vidro (CIV) ou resina composta.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V F F
- C) V V F
- D) F V F
- E) F F V

Questão 40 (Peso 2)

Sobre a conduta recomendada na concussão, é correto afirmar que se deve

- A) realizar pulpectomia.
- B) realizar pulpotomia com hidróxido de cálcio.
- C) realizar reposicionamento dental e contenção rígida por quatro semanas.
- D) prescrever dieta líquida/pastosa nas primeiras 48 horas. Nenhuma terapia pulpar está indicada, salvo se houver uma infecção associada.
- E) realizar pulpotomia com hidróxido de cálcio e realizar reposicionamento do elemento dental e contenção semirrígida por duas semanas.