

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)**

**Questão 01 (Peso 0,50)**

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- ( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- ( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 02 (Peso 0,50)**

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

**Questão 03 (Peso 0,50)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

**Questão 04 (Peso 0,50)**

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

**Questão 05 (Peso 0,50)**

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

**Questão 06 (Peso 0,75)**

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- ( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- ( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

**Questão 07 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- ( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- ( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- ( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 08 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

**Questão 09 (Peso 0,75)**

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

**Questão 10 (Peso 0,75)**

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

**Questão 11 (Peso 0,75)**

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). \_\_\_\_\_ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

**Questão 12 (Peso 0,75)**

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Questão 13 (Peso 0,75)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

**Questão 14 (Peso 0,75)**

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

**Questão 15 (Peso 0,75)**

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar \_\_\_\_\_ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial \_\_\_\_\_ dos casos \_\_\_\_\_ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as \_\_\_\_\_. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)**

**Questão 16 (Peso 0,50)**

“As principais doenças bucais são a cárie dentária e a doença periodontal; juntas, são as primeiras responsáveis pelas perdas dentárias na população. Mas, ao contrário do que se possa pensar, não é normal ter essas doenças; elas podem ser prevenidas e seu desenvolvimento está intimamente ligado às condições socioeconômicas e culturais das populações e, principalmente, refletem as desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde” (SÃO PAULO, 2009, p. 23).

Sobre a cárie dental, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A doença cárie é multifatorial.
- ( ) A doença cárie não depende da formação do biofilme.
- ( ) A doença cárie não possui relação com a perda da unidade dental.
- ( ) A doença cárie depende, exclusivamente, dos carboidratos consumidos à noite.
- ( ) A doença cárie depende de quatro fatores básicos: hospedeiro, microrganismo, substrato e tempo. Fatores essenciais para sua instalação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F F F V V
- C) V V F F F
- D) V F V V F
- E) V F F F V

**Questão 17 (Peso 0,50)**

O câncer da boca poderia ser evitado na maior parte dos casos. A principal estratégia é baseada na prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a doença. A prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de \_\_\_\_\_. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição solar, seja esta de natureza ocupacional ou não. Na prevenção secundária, o Cirurgião-Dentista tem uma contribuição muito relevante pelo seu conhecimento e técnica do exame intrabucal. As lesões mais comuns de câncer bucal são de origem \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) tabaco e álcool / epitelial
- B) tabaco e álcool / endotelial
- C) alimentos gordurosos / epitelial
- D) tabaco e alimentos gordurosos / epitelial
- E) álcool e alimentos gordurosos / endotelial

**Questão 18 (Peso 0,50)**

Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o Cirurgião-Dentista esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja atrasos desnecessários no encaminhamento para o tratamento oncológico, que possam comprometer a morbidade e a mortalidade dos pacientes.

Em relação ao câncer de boca, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) As mulheres são mais acometidas pelo câncer de boca do que os homens.
- ( ) Entre os homens, o câncer de boca trata-se do segundo maior risco de ocorrência.
- ( ) Não há relação entre o consumo de frutas e verduras e a ocorrência de câncer de boca.
- ( ) Tabaco e álcool são fatores de risco menos importantes que o consumo pobre de frutas e verduras.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V V
- D) F F V F
- E) F V F F

**Questão 19 (Peso 0,50)**

As oclusopatias têm ocorrência mundial e podem afetar quatro sistemas simultaneamente: dentes, ossos, músculos e nervos. A disposição dos dentes nos arcos dentários, a forma e o volume dos ossos maxilares, bem como a maneira pela qual se articulam os músculos e as articulações envolvidas, não permanecem estáticas durante toda a vida, mudando continuamente.

Sobre as oclusopatias, é correto afirmar que

- A) sofrem influência do meio ambiente.
- B) não sofrem influência do envelhecimento.
- C) não são causadas por fatores hereditários.
- D) não estão relacionadas aos processos de crescimento.
- E) não são influenciadas por tratamentos dentários, desgastes e processos patológicos.

**Questão 20 (Peso 0,50)**

A fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. As formas brandas são caracterizadas por \_\_\_\_\_ ou manchas branco-giz que surgem \_\_\_\_\_ ou nas pontas de cúspides.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) finas linhas/ na dentina
- B) finas linhas/ no esmalte
- C) pontos amarelados/ no esmalte
- D) pontos amarelados/ no vestibular
- E) pontos amarelados e arredondados/ na dentina

**Questão 21 (Peso 0,75)**

O diagnóstico da doença cárie é estabelecido através de um exame criterioso, que se inicia na avaliação dos fatores etiológicos biológicos e socioeconômicos, seguidos pela detecção e caracterização das lesões de cárie quanto a sua atividade e profundidade.

Quanto às estratégias de diagnóstico da doença cárie, é correto afirmar que

- A) o afastamento imediato com elásticos separadores permite ao clínico estabelecer um diagnóstico correto com inspeção direta de lesões proximais.
- B) o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade na detecção de lesões de cárie nas superfícies proximais em esmalte de dentes decíduos.
- C) o DIAGNOdent é um método de fluorescência induzida pela luz, que auxilia a detecção das lesões de cárie pelas diferenças nas propriedades de fluorescência do dente e do tecido cariado.
- D) o método mais comumente utilizado para detecção de cárie é o exame visual, que deve ser realizado após limpeza dos dentes, secagem cuidadosa e com o auxílio de exploradores e sondas pontiagudas para realizar o exame tátil das lesões.
- E) a transluminação por fibra óptica utiliza luz branca de alta intensidade, permitindo que o esmalte e a dentina com lesões de cárie apareçam como sombra. É um método que apresenta alta confiabilidade e que pode ser utilizado para todas as superfícies, em especial para as superfícies proximais.

**Questão 22 (Peso 0,75)**

As oclusopatias são caracterizadas como anomalias do \_\_\_\_\_, afetando, principalmente, os \_\_\_\_\_ no período da infância e da adolescência, os quais podem produzir desde desvios estéticos nos dentes e/ou face até distúrbios funcionais na \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos maxilares / oclusão
- B) sistema estomatognático / músculos e ossos maxilares / cabeça da ATM
- C) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos mandibulares / oclusão
- D) sistema estomatognático / músculos e ossos mandibulares / cabeça da ATM
- E) crescimento e desenvolvimento / ossos da cabeça e pescoço / cabeça da ATM

**Questão 23 (Peso 0,75)**

As doenças dermatológicas são representadas não somente pelas numerosas doenças primárias que afetam a pele, mas, também, pelas manifestações cutâneas comuns de doenças mais profundas, viscerais e sistêmicas, que podem envolver as mucosas do corpo, inclusive a mucosa oral.

Sobre as manifestações sistêmicas que provocam lesões orais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                        |     |  |
|------------------------|-----|--|
| (1) Líquen plano       | ( ) | É uma patologia autoimune caracterizada pela formação de bolhas intraepiteliais na pele e nas mucosas, que se rompem pelo menor trauma, evoluindo para ulcerações dolorosas e de fácil infecção.   |
| (2) Pênfigo vulgar     | ( ) | É uma desordem ulcerativa e bolhosa, de etiopatogênese incerta, caracterizada por erupção cutânea, seguida ou não de envolvimento oral, podendo, ocasionalmente, envolver a boca de maneira isolada.   |
| (3) Eritema multiforme | ( ) | É uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas, que se manifesta na cavidade oral com grande frequência, antes ou depois das aparições epidérmicas. Essas lesões são caracterizadas pelas estrias de Wickham e apresentam-se sob várias formas clínicas, principalmente, a reticular e a erosiva. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3
- B) 2 1 3
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2
- E) 3 2 1

**Questão 24 (Peso 0,75)**

O conhecimento das técnicas de raspagem dental, aplainamento radicular e dos instrumentais utilizados para esse propósito são de fundamental importância para o tratamento e a manutenção da saúde do periodonto.

Considerando as técnicas para o tratamento das doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) as curetas universais mais utilizadas são as curetas Mc.Call e de Gracey. Ambas apresentam dois cortes com ângulo de conexão entre 90° e 100°.
- B) as limas mais utilizadas são as de Hirschfeld e as de Dunlop. A primeira serve para instrumentar as paredes dentais de bolsas periodontais com profundidades maiores que 6 mm e as segundas para instrumentar as partes mais apicais.
- C) o encontro da face coronária com o dente determina a formação do ângulo de trabalho que varia de acordo com o instrumento a ser utilizado. Por exemplo, para as curetas Pádua Lima e Pádua Lima/Francisco utiliza-se angulação que varia entre 35° e 45°.
- D) as curetas denominadas de Goldman #2 e #3 apresentam distintas indicações. A primeira é indicada para uso em dentes anteriores e pré-molares, enquanto a cureta de Goldman #3 é indicada para as faces vestibulares e linguais de dentes posteriores e anteriores.
- E) a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica são medidas clínicas obtidas com o auxílio de sondas milimetradas. A sonda deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente, sendo a sonda milimetrada de Goldman-Fox especialmente indicada para região de furcas.

**Questão 25 (Peso 0,75)**

O uso de protetores bucais, durante a prática de esportes de contato, tem sido cada vez mais divulgado como uma importante medida contra o traumatismo dentoalveolar. Os protetores bucais devem ser, preferencialmente, personalizados, confeccionados com placas siliconizadas plastificadas e prensadas sob um modelo de gesso da arcada superior do paciente. Além disso, os protetores bucais devem estender-se até o fundo do vestibulo na região vestibular e até \_\_\_ mm além da coroa clínica na região palatal e apresentar espessura \_\_\_\_\_ e término em bisel.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) 5 / irregular
- B) 2 / uniforme
- C) 10 / uniforme
- D) 8 / maior na região anterior
- E) 3 / maior na região anterior

**Questão 26 (Peso 0,75)**

Estudos têm demonstrado a efetividade de programas de controle da placa bacteriana sobre a saúde periodontal. Assim, o paciente, além de receber informações sobre o processo da doença, alternativas de tratamento, potencial das complicações e expectativas dos resultados, deve estar ciente da sua responsabilidade no tratamento.

Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) a estomatite aftosa recorrente é uma condição idiopática, antígeno dependente, que se manifesta na cavidade bucal pelo aparecimento de úlceras, que afetam, preferencialmente, a mucosa móvel.
- B) o abscesso periodontal agudo é resultante da impactação alimentar, principalmente, na região interproximal, devido ao inadequado restabelecimento do ponto de contato em restaurações classe II.
- C) a gengivite ulcerativa necrosante é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival, caracterizada por ulceração, perda de inserção, necrose gengival e destruição das papilas interdentais.
- D) a pericoronarite não é passível de controle através da higiene oral com tufo e clorexidina. O tratamento deve ser realizado com a total eliminação dos tecidos envolvidos e, até mesmo, com a extração do dente antagonista nos casos de pericoronarite traumática.
- E) o abscesso periodontal crônico é caracterizado por dor irradiada e pulsátil de formação edematosa flutuante e circunscrita. Observa-se começo súbito, mobilidade aumentada, dificuldade à mastigação, sendo sensível à percussão horizontal, além de febre, mal-estar geral e enfartamento ganglionar. Histologicamente, há modificações vasculares como vasodilatação, edema e infiltração leucocitária.

**Questão 27 (Peso 0,75)**

A infância é uma fase crucial da vida para formar um cidadão que possa cuidar de si próprio. No que se refere às ações de promoção, prevenção e assistência direcionadas à saúde da gestante e da criança sabe-se que o profissional de saúde tem um papel importante como educador ativo.

Considerando a doença cárie na infância, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A água fluoretada e o uso de dentifrícios fluoretados são considerados os meios mais efetivos para o controle da cárie dentária na infância.
- ( ) A realização da higiene bucal da criança, logo após as refeições, com o estômago cheio, reduz a absorção do fluoreto inadvertidamente ingerido. Essa conduta deve ser considerada na recomendação do uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância.
- ( ) A cárie dentária em crianças pré-escolares pode ocorrer em todas as superfícies de todos os dentes. Considerando crianças na faixa etária entre um e três anos, os molares decíduos são, normalmente, os primeiros dentes a serem atingidos pela lesão de cárie.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F V F
- E) F V V

**Questão 28 (Peso 0,75)**

Sobre traumatismo alvéolo dentário, é correto afirmar que

- A) em fraturas envolvendo somente o esmalte, não é necessário o tratamento endodôntico.
- B) a classificação mais utilizada para os traumatismos dentoalveolares é a de Obwergeiser.
- C) a reabsorção interna inflamatória promove a substituição do tecido pulpar normal por osso trabecular.
- D) nas fraturas de terço médio e apical, não se realizam contenção rígida, exceto em casos de mobilidade.
- E) os dentes mandibulares anteriores estão, normalmente, mais expostos a traumatismos e deslocamentos.



**Questão 29 (Peso 0,75)**

Sobre as fraturas orbitais, é correto afirmar que

- A) o tubérculo de Whitnall encontra-se 2 cm abaixo da sutura frontozigomática.
- B) a parede óssea medial da órbita é composta pela maxila, lacrimal, frontal e etmoide.
- C) as radiografias de seios da face promovem visualização adequada das paredes orbitárias.
- D) a distância média entre a fissura supraorbital até o canal ótico, em seu aspecto superior, é de 32 mm.
- E) os pacientes com encarceramento da cápsula de Tenon devem ser submetidos a reparo urgente dentro de 12h.

**Questão 30 (Peso 0,75)**

Sobre o tratamento dos dentes retidos ou impactados, é correto afirmar que

- A) todos os dentes inclusos são considerados impactados.
- B) o trismo é considerado como uma complicação rara após exodontias de terceiros molares.
- C) os pacientes praticantes de esportes de contato não devem ser submetidos a exodontia de dentes inclusos para evitar fraturas.
- D) os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática deverão realizar exodontia de terceiros molares impactados entre três e cinco meses antes da cirurgia.
- E) os pacientes com terceiros molares impactados, cobertos por osso, sem comunicação com a cavidade bucal, sem sinais patológicos e acima de 40 anos não devem ser submetidos a exodontia.

**Questão 31 (Peso 1,00)**

O trauma dentário, em especial quando acomete os dentes anteriores, marca as pessoas independentemente da idade, gênero e nível socioeconômico. Um exame minucioso e a obtenção de radiografias são de fundamental importância para o diagnóstico do tipo de fratura e o adequado planejamento do tratamento.

Sobre o tratamento no trauma dentário, é correto afirmar que

- A) nos casos de fratura dental com invasão dos espaços biológicos, deve-se sempre considerar a realização de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia associada à fase restauradora.
- B) quando ocorrer exposição pulpar, a polpa exposta será coberta por uma camada de fibrina. Essa área inflamada acomete cerca de 1 a 2 mm mesmo após uma semana de ocorrência a exposição.
- C) o tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são fatores que influenciam o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes fraturados. As fraturas de esmalte/dentina são classificadas em transversais, mistas, apicais e longitudinais.
- D) em dentes desvitalizados, fraturados ou com indicação de tratamento endodôntico, deve-se considerar o uso de retentores intraradiculares, uma vez que estes contribuem para retenção da restauração e para o aumento da resistência do remanescente.
- E) a colagem do fragmento dental é uma alternativa viável e conservadora, especialmente, para dentes anteriores. Quando o fragmento dental apresenta múltiplos pedaços, estes devem ser unidos e colados ao remanescente dental.

**Questão 32 (Peso 1,00)**

Os anestésicos locais são fármacos amplamente utilizados na prática clínica do cirurgião dentista. São constituídos por um grupo lipofílico, que permite a passagem da molécula pela membrana da célula nervosa, e um grupo hidrofílico, que interage com as estruturas das células. Considerando que os anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração do seu efeito, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| (1) Agente de curta ação (por até 30 minutos)            | ( ) Mepivacaína a 3%                  |
| (2) Agente de longa duração (por até 8 horas)            | ( ) Articaina a 4% com epinefrina     |
| (3) Agente de duração intermediária (por até 60 minutos) | ( ) Prilocaína a 4% com felipressina  |
|  | ( ) Bupivacaína a 0,5% com epinefrina |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 2
- B) 1 3 3 2
- C) 2 3 1 3
- D) 3 1 3 2
- E) 3 1 2 2

**Questão 33 (Peso 1,00)**

O uso de antibióticos, muitas vezes desnecessário, como terapêutica medicamentosa condicionou a chamada resistência microbiana, promovendo a seleção de cepas não mais suscetíveis à ação dos agentes de uso corrente. Ciente disto, cada vez mais, se faz necessário o conhecimento destes fármacos, dos critérios que orientam a escolha e a forma de uso, assim como dos agentes causais prevalentes em infecções odontológicas.

Sobre a terapêutica medicamentosa utilizada na odontologia, é correto afirmar que

- A) a intolerância gastrointestinal, náuseas, diarreia, fotossensibilidade, hepatotoxicidade, assim como a intolerância a bebidas alcoólicas são considerados efeitos adversos do metronidazol.
- B) as penicilinas possuem ação bactericida e constituem um dos mais importantes grupos de antimicrobianos na odontologia, em especial, devido à sua ação contra pseudomonas em infecções odontogênicas.
- C) a penicilina V é o antibiótico de primeira escolha para infecções endodônticas. Alternativamente à penicilina V, pode-se prescrever a cefalexina, o metronidazol, o itraconazol e os macrolídeos para tratamento dessas infecções.
- D) os macrolídeos apresentam atividade primariamente bacteriostática, mas podem apresentar ação bactericida a depender da concentração plasmática e tecidual atingida, assim como do tipo de microorganismo envolvido.
- E) na periodontite, observa-se o aumento da complexidade da flora com predomínio de bacilos anaeróbicos Gram-negativos e espiroquetas. Por outro lado, abscessos periodontais e infecções endodônticas caracterizam-se por flora polimicrobiana em que *P. gingivalis*, *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *Capnocytophaga sp* são os agentes isolados predominantes.

**Questão 34 (Peso 1,00)**

Dentre as manifestações sistêmicas, o pênfigo e o penfigóide apresentam quatro variantes clínicas e patológicas: vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso.

Sobre as variantes clínicas do pênfigo e do penfigóide, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O penfigóide bolhoso é uma patologia crônica autoimune subepitelial, sendo menos frequente em indivíduos idosos entre a quinta e sexta década.
- ( ) O pênfigo eritematoso pode ser considerado como uma variante do pênfigo foliáceo. Apresenta-se, clinicamente, como bolhas profundas e formação de crostas e exsudação sobre o couro cabeludo e a face
- ( ) O pênfigo vegetante é uma variante do vulgar e, em geral, não se apresenta com vesículas ou bolhas, mas sim grandes placas úmidas, verrucosas, vegetantes e salpicadas de pústulas (microabscessos intraepiteliais).
- ( ) O pênfigo vulgar é o mais comum com cerca de 80% dos casos. As bolhas são superficiais (acima da camada basal), rompem-se com facilidade deixando erosões ou úlceras hemorrágicas, exsudativas e crostosas, que não cicatrizam espontaneamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V F F

**Questão 35 (Peso 1,00)**

A principal razão para a limitada ocorrência de urgência no consultório dentário é o alicerce da educação odontológica, que prepara os profissionais para identificar os problemas potenciais e intervir de forma preventiva.

Sobre as urgências em odontologia, é correto afirmar que

- A) a aplicação de diazepam (5-10 mg) ou midazolam (2-6 mg) faz parte do tratamento nos casos de reações de toxicidade moderada aos anestésicos locais.
- B) o aumento da taxa e da profundidade das respirações, a xerostomia e a tetania são manifestações respiratórias da síndrome de hiperventilação.
- C) a hipertensão, o infarto do miocárdio e reações de hipersensibilidade constituem as três situações de emergência mais comuns que ocorrem nos pacientes antes, durante ou logo após o tratamento dentário.
- D) quando um paciente diabético relata a sensação de sinais ou sintomas da hipoglicemia durante o tratamento odontológico, deve-se interromper o procedimento e permitir que o paciente consuma carboidratos de alto teor calórico.
- E) a causa mais comum de perda temporária da consciência no consultório dentário é a síncope vasovagal, causada pelo acúmulo de sangue na periferia, pois este não é mobilizado com rapidez suficiente para prevenir isquemia cerebral, quando um paciente assume rapidamente a posição vertical.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)**

**Questão 36 (Peso 1,00)**

As responsabilidades e diretrizes para o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes foram, recentemente, estruturadas pelo Sistema Único de Saúde. As últimas conferências de saúde mental propuseram a montagem de uma Rede Pública Ampliada de Atenção à Saúde Mental com o intuito de construir uma vida menos atormentada para cada criança e adolescente (BRASIL, 2013).

Sobre a promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, é correto afirmar que

- A) as políticas públicas atuais defendem que as crianças e os adolescentes sejam tratados fora de seu contexto de vida para evitar o estigma.
- B) cabe ao Centro de Atenção Psicossocial ou ao Ambulatório de Especialidade em saúde mental problematizar junto às escolas o encaminhamento a um especialista em crianças e adolescentes.
- C) os fatores de risco a serem enfrentados com ações de promoção da saúde devem ser os ligados ao domínio psicológico, a exemplo do temperamento difícil e das dificuldades significativas de aprendizagem.
- D) a articulação entre as Equipes de Atenção Básica e as escolas do território possibilita a implementação de ações de promoção da saúde mental, visto que o território por elas compartilhado detém recursos importantes para construção do cuidado dos sujeitos.
- E) para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, o principal domínio a ser focalizado é o biológico, com investimento na investigação de condições clínicas que podem auxiliar na construção da hipótese diagnóstica.

**Questão 37 (Peso 1,00)**

A discussão sobre vulnerabilidade na Atenção Básica auxilia as equipes de saúde na identificação, \_\_\_\_\_ e ofertas de ações voltadas ao conjunto de aspectos individuais, coletivos, sociais e de disponibilidade de recursos que podem resultar em \_\_\_\_\_ adoecimento, ou agravos à saúde. Sua incorporação no cotidiano das práticas dos profissionais da Atenção Básica permite melhor compreensão dos \_\_\_\_\_ do processo saúde-doença das famílias e dos territórios.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) notificação / ampliação do / limites
- B) notificação / recusa ao / determinantes
- C) planejamento / ampliação do / agravos
- D) planejamento / suscetibilidade ao / agravos
- E) planejamento / suscetibilidade ao / determinantes

**Questão 38 (Peso 1,00)**

A Estratégia Saúde da Família configura-se como uma proposta de redução da fragmentação e parcialização do cuidado à saúde na Atenção Básica. A constituição da família como objeto do cuidado das Equipes de Saúde é uma forma de reversão do modelo hegemônico voltado à doença, que separa o indivíduo de seu contexto e de seus valores socioculturais (BEERENWINKEL; KEUSEN, 2014; SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011).

Considerando a família como unidade de promoção do desenvolvimento, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A Equipe de Saúde inicia o atendimento à família a partir do surgimento de uma doença em um de seus membros.
- ( ) O conhecimento da realidade das famílias e o vínculo facilitam o atendimento dos problemas de saúde da comunidade.
- ( ) O foco das visitas domiciliares deve ser a família com um indivíduo acamado, compreendendo as mudanças na dinâmica familiar em decorrência da doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V F
- D) F F V
- E) F V V

**Questão 39 (Peso 1,00)**

Diante de situações complexas ligadas às famílias nos territórios de atuação, as Equipes de Atenção Básica de referência no território, antes de encaminhá-las a outros pontos de atenção, solicitam o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). \_\_\_\_\_ é uma das ferramentas de apoio do NASF, que se caracteriza pela organização e planejamento do cuidado em saúde, construído coletivamente entre usuários e equipe, a partir da identificação das necessidades de saúde e sistematização das condutas terapêuticas para o caso.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Ecomapa
- B) Genograma
- C) Trabalho Grupal
- D) Projeto Terapêutico Singular
- E) Atendimento Domiciliar Compartilhado

**Questão 40 (Peso 1,00)**

“Por planejamento, entende-se um processo de racionalização das ações humanas que consiste em definir proposições e construir a sua viabilidade, com vistas à solução de problemas e atendimento de necessidades individuais e coletivas” (TEIXEIRA, 2010, p. 17), onde a elaboração do plano é parte desse processo.

Considerando as etapas para construção do plano de saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Módulo operacional      ( ) Diagrama que objetiva explicar o problema, identificando seus determinantes e condicionantes.
- (2) Árvore de problemas      ( ) Processo de identificação, priorização e explicação dos problemas, objetos das intervenções propostas.
- (3) Análise de viabilidade      ( ) Instrumento que sistematiza os objetivos, atividades, responsáveis, prazos e indicadores para cada problema prioritário.
- (4) Análise da situação de saúde      ( ) Corresponde à identificação da disponibilidade de determinados tipos de recursos utilizados para o desencadeamento e continuidade das ações.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 4 2
- B) 2 4 1 3
- C) 2 1 3 4
- D) 3 4 2 1
- E) 4 2 4 1

**Questão 41 (Peso 1,00)**

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, em substituição ao Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Sua operacionalização acontece a partir do e-SUS AB, que, por sua vez, é alimentado por dois softwares: o Sistema de Coleta de Dados Simplificados (CDS) e o Sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Sobre o e-SUS AB, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O PEC e o CDS devem ser utilizados pelos profissionais de nível superior das Equipes de Saúde.
- ( ) O CDS e o PEC utilizam o Cartão Nacional do SUS como identificador do registro do atendimento.
- ( ) O PEC deve ser implantado nos municípios de médio e grande porte e o CDS nos municípios de pequeno porte.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) F V F
- D) F F V
- E) F V V

**Questão 42 (Peso 1,00)**

Entre as disposições da Política Nacional de Atenção Básica, publicada através da Portaria/GM nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estão as definições acerca do processo de trabalho da Atenção Básica, a exemplo da formação e educação permanente, desenvolvida de maneira institucionalizada no cotidiano das equipes. Algumas estratégias podem potencializar os espaços de educação permanente entre equipes e gestores.

\_\_\_\_\_ é uma dessas estratégias “[...] que busca a reformulação do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde [...]” (BRASIL, 2017, p. 33), assumindo como objetivo a mudança nas organizações, a partir dos problemas e tensões do cotidiano (BRASIL, 2017). “[...] Nesse sentido, pressupõe-se o esforço de transformar os modelos de gestão verticalizados em relações horizontais que ampliem a democratização, autonomia e compromisso dos trabalhadores e gestores, baseados em relações contínuas e solidárias” (BRASIL, 2017, p. 33).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Apoio institucional
- B) Formação em saúde
- C) Educação continuada
- D) Cooperação horizontal
- E) Coordenação do cuidado

**Questão 43 (Peso 1,00)**

A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada através da Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, versa sobre a função de Gerente de Atenção Básica. De acordo com o previsto nessa portaria, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O Gerente de Atenção Básica deve ser escolhido entre um dos membros da Equipe de Saúde, que acumulará as duas funções.
- ( ) Cabe ao Gerente de Atenção Básica, garantir o planejamento em saúde e a organização do processo de trabalho das equipes.
- ( ) É papel do Gerente de Atenção Básica alimentar os sistemas de informação com os dados produzidos pelos profissionais da equipe.
- ( ) A função de Gerente de Atenção Básica deverá ser exercida por profissionais com experiência na área e, preferencialmente, com nível superior.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V
- B) F V F V
- C) F V V F
- D) V V F V
- E) V F V F

**Questão 44 (Peso 1,00)**

Sobre a saúde reprodutiva e a sexualidade na Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) as ações de promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva devem ser direcionadas a adolescentes e mulheres em idade fértil.
- B) as ações de saúde sexual estão voltadas ao bem-estar em todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo, suas funções e processos.
- C) a abordagem em saúde sexual para adolescentes não deve ser discutida pelas Equipes de Saúde nas atividades de promoção da saúde no ambiente escolar.
- D) discutir saúde reprodutiva é investir em ações voltadas à expressão da sexualidade de homens e mulheres, orientando sobre o risco de infecções sexualmente transmissíveis.
- E) as Equipes de Atenção Básica têm papel primordial na promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva, tendo como princípios a abordagem integral e a promoção de direitos humanos.

**Questão 45 (Peso 1,00)**

As taxas de transmissão vertical do HIV durante a gestação, sem qualquer intervenção, figuram entre os 25% e 30% (BRASIL, 2012, p. 196). Considerando os fatores de risco conhecidos para a transmissão vertical do HIV, é correto afirmar que

- A) o aleitamento materno é contraindicado às gestantes HIV positivas.
- B) a terapia antirretroviral para gestante deve ser iniciada após o parto.
- C) a carga viral da gestante não interfere na transmissão vertical do vírus ao recém-nascido.
- D) o peso ao nascer define a necessidade do uso de terapia antirretroviral para o recém-nascido.
- E) não existe relação entre a recontaminação pelo HIV da gestante e a transmissão vertical do vírus ao recém-nascido.

**Questão 46 (Peso 1,00)**

“A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis [...]” (BRASIL, 2011, p. 1).

Sobre o componente pré-natal da Rede Cegonha, é correto afirmar que

- A) a consulta odontológica da gestante deve ser garantida durante o pré-natal.
- B) a vinculação à maternidade para o parto é responsabilidade da gestante e de sua família.
- C) a gestante, após a 40ª semana de gestação, deve ser orientada sobre o parto e seu pré-natal será encerrado.
- D) o cartão da gestante será entregue à gestante em sua última consulta de pré-natal para que ela o apresente na maternidade.
- E) a classificação do risco gestacional é definida na primeira consulta de pré-natal e não deve ser alterada nas consultas subsequentes.

**Questão 47 (Peso 1,00)**

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) “[...] se estrutura em sete eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e outros agravos, a prevenção das doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças [...]” (BRASIL, 2015, p. 3).

Considerando o perfil epidemiológico da população infantil no Brasil, a alternativa que apresenta as doenças mais prevalentes na infância é

- A) desnutrição, hanseníase e rubéola.
- B) doenças diarreicas, amebíase e rubéola.
- C) desnutrição, amebíase e doenças diarreicas.
- D) infecções respiratórias agudas, tracoma e desnutrição.
- E) infecções respiratórias agudas, doenças diarreicas e desnutrição.

**Questão 48 (Peso 1,00)**

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015 (BRASIL, 2016) apontam que, entre os adolescentes de 13 a 15 anos, 8,0% consumiram cigarros pelo menos uma vez nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa, 21% dos escolares já sofreram com episódios de embriaguez e 18,7% possuem amigos que são usuários de drogas ilícitas.

Os estudos sobre fatores de \_\_\_\_\_ ao uso de drogas em adolescentes enfatizam o desenvolvimento da \_\_\_\_\_, ou seja, sobre os fatores ou processos intrapsíquicos e sociais que possibilitem o desenvolvimento de uma vida \_\_\_\_\_, apesar de experiências de vida \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) risco / resiliência / amorosa / viciada
- B) proteção / abstinência / sadia / viciada
- C) proteção / resiliência / sadia / traumáticas
- D) risco / abstinência / amorosa / traumáticas
- E) afastamento / resiliência / traumática / sadia

**Questão 49 (Peso 1,00)**

Segundo matéria publicada pela versão on line do Jornal Correio Brasiliense (11/06/2017), o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que, se todas as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que exercem alguma atividade no país se reunissem, elas ocupariam uma cidade como Brasília. O trabalho infantil atinge 2,7 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, sendo que 30% dessa mão de obra está na atividade agrícola. O trabalho infantil compreende toda forma de trabalho exercido por pessoa abaixo da idade mínima permitida em lei para tal trabalho (AGUIAR JR., VASCONCELOS, 2017, p. 26).

Sobre o trabalho infantil, é correto afirmar que

- A) o acidente de trabalho com crianças e adolescentes é um agravo à saúde do trabalhador que não necessita de notificação.
- B) um dos critérios de caracterização do trabalho infantil é a ocorrência do mesmo em situações de pobreza e vulnerabilidade.
- C) a erradicação do trabalho infantil será alcançada a partir de punições mais severas aos familiares e empregadores das crianças.
- D) a atenção à saúde de crianças e adolescentes em sua relação com o trabalho se apresenta como um desafio para as políticas e ações em saúde.
- E) incluir a situação das crianças e adolescentes trabalhando como uma das prioridades de maior vulnerabilidade em saúde do trabalhador, é uma das ações de saúde do trabalhador junto à atenção especializada.

**Questão 50 (Peso 1,00)**

“A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária” (BRASIL, 2017, p. 2). Considerando o território como diretriz organizativa da Atenção Básica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A análise sobre o território auxilia na compreensão do processo saúde-doença como uma manifestação social.
- ( ) As Equipes de Saúde utilizam as informações sobre o território para organizar as ações de saúde voltadas aos usuários acamados.
- ( ) A análise do território deve ser atualizada pelas Equipes de Saúde, visto que o mesmo pode ser mutável em decorrência das relações sociais que dele emergem.
- ( ) Espera-se que os Agentes Comunitários de Saúde sejam o elo entre a Equipe de Saúde e a comunidade na compreensão do território, onde as unidades de saúde atuam.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) V F F V
- D) F V V F
- E) F F V F