

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

“As principais doenças bucais são a cárie dentária e a doença periodontal; juntas, são as primeiras responsáveis pelas perdas dentárias na população. Mas, ao contrário do que se possa pensar, não é normal ter essas doenças; elas podem ser prevenidas e seu desenvolvimento está intimamente ligado às condições socioeconômicas e culturais das populações e, principalmente, refletem as desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde” (SÃO PAULO, 2009, p. 23).

Sobre a cárie dental, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A doença cárie é multifatorial.
- () A doença cárie não depende da formação do biofilme.
- () A doença cárie não possui relação com a perda da unidade dental.
- () A doença cárie depende, exclusivamente, dos carboidratos consumidos à noite.
- () A doença cárie depende de quatro fatores básicos: hospedeiro, microrganismo, substrato e tempo. Fatores essenciais para sua instalação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F F F V V
- C) V V F F F
- D) V F V V F
- E) V F F F V

Questão 17 (Peso 0,50)

O câncer da boca poderia ser evitado na maior parte dos casos. A principal estratégia é baseada na prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a doença. A prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de _____. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição solar, seja esta de natureza ocupacional ou não. Na prevenção secundária, o Cirurgião-Dentista tem uma contribuição muito relevante pelo seu conhecimento e técnica do exame intrabucal. As lesões mais comuns de câncer bucal são de origem _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) tabaco e álcool / epitelial
- B) tabaco e álcool / endotelial
- C) alimentos gordurosos / epitelial
- D) tabaco e alimentos gordurosos / epitelial
- E) álcool e alimentos gordurosos / endotelial

Questão 18 (Peso 0,50)

Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o Cirurgião-Dentista esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja atrasos desnecessários no encaminhamento para o tratamento oncológico, que possam comprometer a morbidade e a mortalidade dos pacientes.

Em relação ao câncer de boca, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As mulheres são mais acometidas pelo câncer de boca do que os homens.
- () Entre os homens, o câncer de boca trata-se do segundo maior risco de ocorrência.
- () Não há relação entre o consumo de frutas e verduras e a ocorrência de câncer de boca.
- () Tabaco e álcool são fatores de risco menos importantes que o consumo pobre de frutas e verduras.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V V
- D) F F V F
- E) F V F F

Questão 19 (Peso 0,50)

As oclusopatias têm ocorrência mundial e podem afetar quatro sistemas simultaneamente: dentes, ossos, músculos e nervos. A disposição dos dentes nos arcos dentários, a forma e o volume dos ossos maxilares, bem como a maneira pela qual se articulam os músculos e as articulações envolvidas, não permanecem estáticas durante toda a vida, mudando continuamente.

Sobre as oclusopatias, é correto afirmar que

- A) sofrem influência do meio ambiente.
- B) não sofrem influência do envelhecimento.
- C) não são causadas por fatores hereditários.
- D) não estão relacionadas aos processos de crescimento.
- E) não são influenciadas por tratamentos dentários, desgastes e processos patológicos.

Questão 20 (Peso 0,50)

A fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. As formas brandas são caracterizadas por _____ ou manchas branco-giz que surgem _____ ou nas pontas de cúspides.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) finas linhas/ na dentina
- B) finas linhas/ no esmalte
- C) pontos amarelados/ no esmalte
- D) pontos amarelados/ no vestibular
- E) pontos amarelados e arredondados/ na dentina

Questão 21 (Peso 0,75)

O diagnóstico da doença cárie é estabelecido através de um exame criterioso, que se inicia na avaliação dos fatores etiológicos biológicos e socioeconômicos, seguidos pela detecção e caracterização das lesões de cárie quanto a sua atividade e profundidade.

Quanto às estratégias de diagnóstico da doença cárie, é correto afirmar que

- A) o afastamento imediato com elásticos separadores permite ao clínico estabelecer um diagnóstico correto com inspeção direta de lesões proximais.
- B) o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade na detecção de lesões de cárie nas superfícies proximais em esmalte de dentes decíduos.
- C) o DIAGNOdent é um método de fluorescência induzida pela luz, que auxilia a detecção das lesões de cárie pelas diferenças nas propriedades de fluorescência do dente e do tecido cariado.
- D) o método mais comumente utilizado para detecção de cárie é o exame visual, que deve ser realizado após limpeza dos dentes, secagem cuidadosa e com o auxílio de exploradores e sondas pontiagudas para realizar o exame tátil das lesões.
- E) a transluminação por fibra óptica utiliza luz branca de alta intensidade, permitindo que o esmalte e a dentina com lesões de cárie apareçam como sombra. É um método que apresenta alta confiabilidade e que pode ser utilizado para todas as superfícies, em especial para as superfícies proximais.

Questão 22 (Peso 0,75)

As oclusopatias são caracterizadas como anomalias do _____, afetando, principalmente, os _____ no período da infância e da adolescência, os quais podem produzir desde desvios estéticos nos dentes e/ou face até distúrbios funcionais na _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos maxilares / oclusão
- B) sistema estomatognático / músculos e ossos maxilares / cabeça da ATM
- C) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos mandibulares / oclusão
- D) sistema estomatognático / músculos e ossos mandibulares / cabeça da ATM
- E) crescimento e desenvolvimento / ossos da cabeça e pescoço / cabeça da ATM

Questão 23 (Peso 0,75)

As doenças dermatológicas são representadas não somente pelas numerosas doenças primárias que afetam a pele, mas, também, pelas manifestações cutâneas comuns de doenças mais profundas, viscerais e sistêmicas, que podem envolver as mucosas do corpo, inclusive a mucosa oral.

Sobre as manifestações sistêmicas que provocam lesões orais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|------------------------|--|
| (1) Líquen plano | () É uma patologia autoimune caracterizada pela formação de bolhas intraepiteliais na pele e nas mucosas, que se rompem pelo menor trauma, evoluindo para ulcerações dolorosas e de fácil infecção. |
| (2) Pênfigo vulgar | () É uma desordem ulcerativa e bolhosa, de etiopatogênese incerta, caracterizada por erupção cutânea, seguida ou não de envolvimento oral, podendo, ocasionalmente, envolver a boca de maneira isolada. |
| (3) Eritema multiforme | () É uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas, que se manifesta na cavidade oral com grande frequência, antes ou depois das aparições epidérmicas. Essas lesões são caracterizadas pelas estrias de Wickham e apresentam-se sob várias formas clínicas, principalmente, a reticular e a erosiva. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3
- B) 2 1 3
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2
- E) 3 2 1

Questão 24 (Peso 0,75)

O conhecimento das técnicas de raspagem dental, aplainamento radicular e dos instrumentais utilizados para esse propósito são de fundamental importância para o tratamento e a manutenção da saúde do periodonto.

Considerando as técnicas para o tratamento das doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) as curetas universais mais utilizadas são as curetas Mc.Call e de Gracey. Ambas apresentam dois cortes com ângulo de conexão entre 90° e 100°.
- B) as limas mais utilizadas são as de Hirschfeld e as de Dunlop. A primeira serve para instrumentar as paredes dentais de bolsas periodontais com profundidades maiores que 6 mm e as segundas para instrumentar as partes mais apicais.
- C) o encontro da face coronária com o dente determina a formação do ângulo de trabalho que varia de acordo com o instrumento a ser utilizado. Por exemplo, para as curetas Pádua Lima e Pádua Lima/Francisco utiliza-se angulação que varia entre 35° e 45°.
- D) as curetas denominadas de Goldman #2 e #3 apresentam distintas indicações. A primeira é indicada para uso em dentes anteriores e pré-molares, enquanto a cureta de Goldman #3 é indicada para as faces vestibulares e linguais de dentes posteriores e anteriores.
- E) a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica são medidas clínicas obtidas com o auxílio de sondas milimetradas. A sonda deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente, sendo a sonda milimetrada de Goldman-Fox especialmente indicada para região de furcas.

Questão 25 (Peso 0,75)

O uso de protetores bucais, durante a prática de esportes de contato, tem sido cada vez mais divulgado como uma importante medida contra o traumatismo dentoalveolar. Os protetores bucais devem ser, preferencialmente, personalizados, confeccionados com placas siliconizadas plastificadas e prensadas sob um modelo de gesso da arcada superior do paciente. Além disso, os protetores bucais devem estender-se até o fundo do vestibulo na região vestibular e até ___ mm além da coroa clínica na região palatal e apresentar espessura _____ e término em bisel.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) 5 / irregular
- B) 2 / uniforme
- C) 10 / uniforme
- D) 8 / maior na região anterior
- E) 3 / maior na região anterior

Questão 26 (Peso 0,75)

Estudos têm demonstrado a efetividade de programas de controle da placa bacteriana sobre a saúde periodontal. Assim, o paciente, além de receber informações sobre o processo da doença, alternativas de tratamento, potencial das complicações e expectativas dos resultados, deve estar ciente da sua responsabilidade no tratamento.

Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) a estomatite aftosa recorrente é uma condição idiopática, antígeno dependente, que se manifesta na cavidade bucal pelo aparecimento de úlceras, que afetam, preferencialmente, a mucosa móvel.
- B) o abscesso periodontal agudo é resultante da impactação alimentar, principalmente, na região interproximal, devido ao inadequado restabelecimento do ponto de contato em restaurações classe II.
- C) a gengivite ulcerativa necrosante é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival, caracterizada por ulceração, perda de inserção, necrose gengival e destruição das papilas interdentais.
- D) a pericoronarite não é passível de controle através da higiene oral com tufo e clorexidina. O tratamento deve ser realizado com a total eliminação dos tecidos envolvidos e, até mesmo, com a extração do dente antagonista nos casos de pericoronarite traumática.
- E) o abscesso periodontal crônico é caracterizado por dor irradiada e pulsátil de formação edematosa flutuante e circunscrita. Observa-se começo súbito, mobilidade aumentada, dificuldade à mastigação, sendo sensível à percussão horizontal, além de febre, mal-estar geral e enfartamento ganglionar. Histologicamente, há modificações vasculares como vasodilatação, edema e infiltração leucocitária.

Questão 27 (Peso 0,75)

A infância é uma fase crucial da vida para formar um cidadão que possa cuidar de si próprio. No que se refere às ações de promoção, prevenção e assistência direcionadas à saúde da gestante e da criança sabe-se que o profissional de saúde tem um papel importante como educador ativo.

Considerando a doença cárie na infância, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A água fluoretada e o uso de dentifrícios fluoretados são considerados os meios mais efetivos para o controle da cárie dentária na infância.
- () A realização da higiene bucal da criança, logo após as refeições, com o estômago cheio, reduz a absorção do fluoreto inadvertidamente ingerido. Essa conduta deve ser considerada na recomendação do uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância.
- () A cárie dentária em crianças pré-escolares pode ocorrer em todas as superfícies de todos os dentes. Considerando crianças na faixa etária entre um e três anos, os molares decíduos são, normalmente, os primeiros dentes a serem atingidos pela lesão de cárie.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F V F
- E) F V V

Questão 28 (Peso 0,75)

Sobre traumatismo alvéolo dentário, é correto afirmar que

- A) em fraturas envolvendo somente o esmalte, não é necessário o tratamento endodôntico.
- B) a classificação mais utilizada para os traumatismos dentoalveolares é a de Obwergeiser.
- C) a reabsorção interna inflamatória promove a substituição do tecido pulpar normal por osso trabecular.
- D) nas fraturas de terço médio e apical, não se realizam contenção rígida, exceto em casos de mobilidade.
- E) os dentes mandibulares anteriores estão, normalmente, mais expostos a traumatismos e deslocamentos.

Questão 29 (Peso 0,75)

Sobre as fraturas orbitais, é correto afirmar que

- A) o tubérculo de Whitnall encontra-se 2 cm abaixo da sutura frontozigomática.
- B) a parede óssea medial da órbita é composta pela maxila, lacrimal, frontal e etmoide.
- C) as radiografias de seios da face promovem visualização adequada das paredes orbitárias.
- D) a distância média entre a fissura supraorbital até o canal ótico, em seu aspecto superior, é de 32 mm.
- E) os pacientes com encarceramento da cápsula de Tenon devem ser submetidos a reparo urgente dentro de 12h.

Questão 30 (Peso 0,75)

Sobre o tratamento dos dentes retidos ou impactados, é correto afirmar que

- A) todos os dentes inclusos são considerados impactados.
- B) o trismo é considerado como uma complicação rara após exodontias de terceiros molares.
- C) os pacientes praticantes de esportes de contato não devem ser submetidos a exodontia de dentes inclusos para evitar fraturas.
- D) os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática deverão realizar exodontia de terceiros molares impactados entre três e cinco meses antes da cirurgia.
- E) os pacientes com terceiros molares impactados, cobertos por osso, sem comunicação com a cavidade bucal, sem sinais patológicos e acima de 40 anos não devem ser submetidos a exodontia.

Questão 31 (Peso 1,00)

O trauma dentário, em especial quando acomete os dentes anteriores, marca as pessoas independentemente da idade, gênero e nível socioeconômico. Um exame minucioso e a obtenção de radiografias são de fundamental importância para o diagnóstico do tipo de fratura e o adequado planejamento do tratamento.

Sobre o tratamento no trauma dentário, é correto afirmar que

- A) nos casos de fratura dental com invasão dos espaços biológicos, deve-se sempre considerar a realização de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia associada à fase restauradora.
- B) quando ocorrer exposição pulpar, a polpa exposta será coberta por uma camada de fibrina. Essa área inflamada acomete cerca de 1 a 2 mm mesmo após uma semana de ocorrência a exposição.
- C) o tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são fatores que influenciam o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes fraturados. As fraturas de esmalte/dentina são classificadas em transversais, mistas, apicais e longitudinais.
- D) em dentes desvitalizados, fraturados ou com indicação de tratamento endodôntico, deve-se considerar o uso de retentores intraradiculares, uma vez que estes contribuem para retenção da restauração e para o aumento da resistência do remanescente.
- E) a colagem do fragmento dental é uma alternativa viável e conservadora, especialmente, para dentes anteriores. Quando o fragmento dental apresenta múltiplos pedaços, estes devem ser unidos e colados ao remanescente dental.

Questão 32 (Peso 1,00)

Os anestésicos locais são fármacos amplamente utilizados na prática clínica do cirurgião dentista. São constituídos por um grupo lipofílico, que permite a passagem da molécula pela membrana da célula nervosa, e um grupo hidrofílico, que interage com as estruturas das células. Considerando que os anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração do seu efeito, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Agente de curta ação (por até 30 minutos) | () Mepivacaína a 3% |
| (2) Agente de longa duração (por até 8 horas) | () Articaina a 4% com epinefrina |
| (3) Agente de duração intermediária (por até 60 minutos) | () Prilocaína a 4% com felipressina |
| | () Bupivacaína a 0,5% com epinefrina |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 2
- B) 1 3 3 2
- C) 2 3 1 3
- D) 3 1 3 2
- E) 3 1 2 2

Questão 33 (Peso 1,00)

O uso de antibióticos, muitas vezes desnecessário, como terapêutica medicamentosa condicionou a chamada resistência microbiana, promovendo a seleção de cepas não mais suscetíveis à ação dos agentes de uso corrente. Ciente disto, cada vez mais, se faz necessário o conhecimento destes fármacos, dos critérios que orientam a escolha e a forma de uso, assim como dos agentes causais prevalentes em infecções odontológicas.

Sobre a terapêutica medicamentosa utilizada na odontologia, é correto afirmar que

- A) a intolerância gastrointestinal, náuseas, diarreia, fotossensibilidade, hepatotoxicidade, assim como a intolerância a bebidas alcoólicas são considerados efeitos adversos do metronidazol.
- B) as penicilinas possuem ação bactericida e constituem um dos mais importantes grupos de antimicrobianos na odontologia, em especial, devido à sua ação contra pseudomonas em infecções odontogênicas.
- C) a penicilina V é o antibiótico de primeira escolha para infecções endodônticas. Alternativamente à penicilina V, pode-se prescrever a cefalexina, o metronidazol, o itraconazol e os macrolídeos para tratamento dessas infecções.
- D) os macrolídeos apresentam atividade primariamente bacteriostática, mas podem apresentar ação bactericida a depender da concentração plasmática e tecidual atingida, assim como do tipo de microorganismo envolvido.
- E) na periodontite, observa-se o aumento da complexidade da flora com predomínio de bacilos anaeróbicos Gram-negativos e espiroquetas. Por outro lado, abscessos periodontais e infecções endodônticas caracterizam-se por flora polimicrobiana em que *P. gingivalis*, *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *Capnocytophaga sp* são os agentes isolados predominantes.

Questão 34 (Peso 1,00)

Dentre as manifestações sistêmicas, o pênfigo e o penfigóide apresentam quatro variantes clínicas e patológicas: vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso.

Sobre as variantes clínicas do pênfigo e do penfigóide, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O penfigóide bolhoso é uma patologia crônica autoimune subepitelial, sendo menos frequente em indivíduos idosos entre a quinta e sexta década.
- () O pênfigo eritematoso pode ser considerado como uma variante do pênfigo foliáceo. Apresenta-se, clinicamente, como bolhas profundas e formação de crostas e exsudação sobre o couro cabeludo e a face
- () O pênfigo vegetante é uma variante do vulgar e, em geral, não se apresenta com vesículas ou bolhas, mas sim grandes placas úmidas, verrucosas, vegetantes e salpicadas de pústulas (microabscessos intraepiteliais).
- () O pênfigo vulgar é o mais comum com cerca de 80% dos casos. As bolhas são superficiais (acima da camada basal), rompem-se com facilidade deixando erosões ou úlceras hemorrágicas, exsudativas e crostosas, que não cicatrizam espontaneamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V F F

Questão 35 (Peso 1,00)

A principal razão para a limitada ocorrência de urgência no consultório dentário é o alicerce da educação odontológica, que prepara os profissionais para identificar os problemas potenciais e intervir de forma preventiva.

Sobre as urgências em odontologia, é correto afirmar que

- A) a aplicação de diazepam (5-10 mg) ou midazolam (2-6 mg) faz parte do tratamento nos casos de reações de toxicidade moderada aos anestésicos locais.
- B) o aumento da taxa e da profundidade das respirações, a xerostomia e a tetania são manifestações respiratórias da síndrome de hiperventilação.
- C) a hipertensão, o infarto do miocárdio e reações de hipersensibilidade constituem as três situações de emergência mais comuns que ocorrem nos pacientes antes, durante ou logo após o tratamento dentário.
- D) quando um paciente diabético relata a sensação de sinais ou sintomas da hipoglicemia durante o tratamento odontológico, deve-se interromper o procedimento e permitir que o paciente consuma carboidratos de alto teor calórico.
- E) a causa mais comum de perda temporária da consciência no consultório dentário é a síncope vasovagal, causada pelo acúmulo de sangue na periferia, pois este não é mobilizado com rapidez suficiente para prevenir isquemia cerebral, quando um paciente assume rapidamente a posição vertical.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

A Atenção Básica se constitui na porta de entrada do Sistema de Saúde sendo, portanto, o contato preferencial dos usuários com as redes de atenção. Deve primar pela integralidade do cuidado ofertado tendo, como maior foco, as ações de vigilância à saúde. Dessa forma, “a incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em saúde [...]” (BRASIL, 2014, p.15) é uma das mais importantes diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde.

Sobre as ações de Promoção à Saúde, contextualizadas no âmbito da Atenção Básica, é correto afirmar que

- A) devem buscar articulação e cooperação intrasetorial e intersetorial, tendo em vista o conceito ampliado de saúde.
- B) os determinantes sociais, no caso da atenção básica, ocupam papel secundário nas ações de promoção à saúde.
- C) o empoderamento e a autonomia dos sujeitos devem ser estimulados, a partir da problematização da realidade e das práticas verticalizadas de educação em saúde.
- D) envolvem as ações de promoção da saúde planejadas pelas Equipes de Atenção Básica, a despeito das características do território e das especificidades locais/regionais.
- E) a participação popular e o controle social devem ser incentivados, estimulando o protagonismo das pessoas frente às questões de saúde, desde que não alterem o planejamento das ações de promoção previstas.

Questão 37 (Peso 1,00)

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal apontam para uma reorganização dos serviços, baseando-se na concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas, sobretudo, na promoção da qualidade de vida e na intervenção dos fatores que a colocam em risco. _____ são princípios norteadores das ações de saúde na perspectiva do cuidado que estão explicitados no artigo 196 da Constituição Federal (1988).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Gestão participativa, ética e acolhimento
- B) Integralidade, equidade e universalidade
- C) Universalidade, acolhimento e ações de reabilitação
- D) Gestão participativa, universalidade e responsabilidade profissional
- E) Coresponsabilidade do paciente, responsabilidade profissional e vínculo

Questão 38 (Peso 1,00)

O tratamento restaurador atraumático (TRA) é muito utilizado nos serviços públicos. Sobre a técnica TRA e sua indicação na utilização dos dentes decíduos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Deve ser aplicado com cautela em dentes com perda de cúspide(s) e dentes tratados endodonticamente.
- () O TRA é indicado em posteriores classe I e II (extensas ou não). Restaurações em cavidades classe I são as que apresentam maior longevidade.
- () As restaurações de cavidades classe I têm maior risco de fratura na proximal, o que ainda é uma limitação do TRA. Mesmo fraturado, o índice de recidiva de cárie é baixo.
- () As restaurações realizadas através do TRA são antiestéticas, mas a utilização do cimento ionômero de vidro (CIV) modificado por resina pode ser uma solução, no entanto exige que o procedimento seja feito na cadeira odontológica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V V F
- D) F F F V
- E) F V F V

Questão 39 (Peso 1,00)

Ao longo dos anos, “o SUS aumentou a extensão e importância política e econômica de serviços e programas na área da saúde. [...] Ao desdobrar-se e operacionalizar-se em numerosas ações e iniciativas, torna-se alvo constante de questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade. Dessa forma, surge a necessidade da avaliação, como um dos instrumentos na busca por respostas” (FURTADO, 2015, p. 774).

Sobre a avaliação de programas e sistemas de saúde, é correto afirmar que

- A) a avaliação de programas e serviços de saúde tem ação direta sobre as instituições, mas não atua sobre a constituição de sujeitos e coletivos.
- B) para garantir validade ao processo de avaliação de um programa ou sistema de saúde, o método deve priorizar as abordagens quantitativas.
- C) o campo da avaliação em saúde no Brasil possui tipologia definida pelo Ministério da Saúde, que descentraliza o método a ser replicado em Estados e Municípios.
- D) a função primordial da avaliação de programas e serviços, assim como da área do planejamento em saúde, é produzir saúde, contribuindo para a tomada de decisão.
- E) para que tenha validade, a avaliação de um programa ou sistema de saúde preconiza a neutralidade e, portanto, deve adotar metodologias específicas e padronizadas.

Questão 40 (Peso 1,00)

Entre as disposições da Política Nacional de Atenção Básica, publicada através da Portaria/GM nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estão as definições acerca do processo de trabalho da Atenção Básica, a exemplo da formação e educação permanente, desenvolvida de maneira institucionalizada no cotidiano das equipes. Algumas estratégias podem potencializar os espaços de educação permanente entre equipes e gestores.

_____ é uma dessas estratégias “[...] que busca a reformulação do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde [...]” (BRASIL, 2017, p. 33), assumindo como objetivo a mudança nas organizações, a partir dos problemas e tensões do cotidiano (BRASIL, 2017). “[...] Nesse sentido, pressupõe-se o esforço de transformar os modelos de gestão verticalizados em relações horizontais que ampliem a democratização, autonomia e compromisso dos trabalhadores e gestores, baseados em relações contínuas e solidárias” (BRASIL, 2017, p. 33).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Apoio institucional
- B) Formação em saúde
- C) Educação continuada
- D) Cooperação horizontal
- E) Coordenação do cuidado

Questão 41 (Peso 1,00)

A odontologia brasileira vem experimentando grandes avanços na prevenção da cárie. Assim, o Brasil não figura mais como um país de desdentados, contudo, a cárie ainda tem grande impacto na saúde das crianças brasileiras e o tratamento restaurador continua sendo importante, desde que aplicado somente quando necessário. Neste contexto, surge o tratamento restaurador atraumático (TRA) que, embora desenvolvido nas décadas de 80 e 90 para ser aplicado em comunidades sem acesso a infraestrutura mínima para aplicação da odontologia convencional, vem ganhando muito espaço na Odontologia Moderna.

Sobre o TRA, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O TRA é descrito como um método econômico e eficaz na prevenção e controle da doença cárie em populações vulneráveis.
- () A aplicação desta técnica não é recomendada em locais onde há grande demanda por tratamento restaurador odontológico, uma vez que o atendimento é mais demorado.
- () O TRA é considerado uma estratégia sólida baseada em promoção de saúde e prevenção da doença cárie, permitindo grande alcance populacional em saúde pública.
- () A resolutividade da técnica TRA também impacta positivamente na redução dos custos do tratamento, quando comparado aos tratamentos restauradores convencionais. Uma vez que permite redução do tempo clínico e é menos doloroso, portanto torna-se uma excelente alternativa na Odontopediatria.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) V V F V
- D) F V V F
- E) F F F V

Questão 42 (Peso 1,00)

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, em substituição ao Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). Sua operacionalização acontece a partir do e-SUS AB, que, por sua vez, é alimentado por dois softwares: o Sistema de Coleta de Dados Simplificados (CDS) e o Sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC).

Sobre o e-SUS AB, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas:

- () O PEC e o CDS devem ser utilizados pelos profissionais de nível superior das Equipes de Saúde.
- () O CDS e o PEC utilizam o Cartão Nacional do SUS como identificador do registro do atendimento.
- () O PEC deve ser implantado nos municípios de médio e grande porte e o CDS nos municípios de pequeno porte.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F F
- C) F V F
- D) F F V
- E) F V V

Questão 43 (Peso 1,00)

A cavidade bucal e as estruturas adjacentes podem sediar diversas lesões associadas às doenças autoimunes. É importante, para o clínico, o conhecimento da etiologia e da forma inicial das mesmas (NEVILLE, 2004).

As dermatoses autoimunes são patologias que envolvem formação de _____ direcionados(as) contra alguns elementos teciduais, particularmente, da _____, da mesma forma que podem assumir um âmbito sistêmico.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) bolhas intraepiteliais / epiderme
- B) bolhas intradérmicas / epiderme
- C) bolhas subepiteliais / membrana basal
- D) autoanticorpos / pele ou superfícies das mucosas
- E) anticorpos antinúcleo / pele ou superfícies das mucosas

Questão 44 (Peso 1,00)

A incorporação de tecnologias apropriadas para o controle de infecção e biossegurança nos serviços odontológicos, assim como a educação permanente das Equipes de Saúde Bucal são ações fundamentais para promover a melhoria da assistência à saúde.

Sobre a biossegurança em odontologia, é correto afirmar que

- A) a esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes por meio de processos químicos (autoclave) ou físicos (soluções de ácido peracético a 0,2%).
- B) o uso de equipamento de proteção individual (EPI) é indicado durante o atendimento ao paciente e no reprocessamento dos artigos, sendo dispensável durante os procedimentos de limpeza do ambiente.
- C) a higienização das mãos com água e sabonete líquido, quando realizada com técnica correta, pode reduzir a população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de infecção. O simples ato de lavar as mãos é considerado a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde.
- D) os equipamentos odontológicos e periféricos estão sujeitos à contaminação, sendo fundamental realizar a limpeza e a desinfecção com água e sabão neutro. Além disso, deve-se recobrir estas superfícies com campos de algodão esterilizados para procedimentos cirúrgicos e aplicar barreiras impermeáveis durante a realização de procedimentos clínicos.
- E) o processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico. No monitoramento físico, avalia-se o ciclo de esterilização, pela mudança de cor, na presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado (indicador de processo, teste Bowie-Dick, de parâmetro simples, multiparamétrico, integrador e emuladores).

Questão 45 (Peso 1,00)

Na atualidade, a criança é socialmente valorizada e sua assistência baseia-se em algumas premissas bastante difundidas, embora nem sempre presentes nas atitudes de alguns profissionais que trabalham com as crianças. Pode-se citar, como uma das premissas, que o principal objetivo de qualquer assistência prestada à criança é proteger e favorecer o seu crescimento e desenvolvimento e que a criança é um ser social, que tem direitos e necessidades que precisam ser atendidas, para que possa crescer e desenvolver-se com plenitude e feliz

Sobre a saúde bucal das crianças, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O primeiro dente decíduo deve surgir na cavidade bucal em torno dos seis meses de vida, sendo que a dentição decídua estará completa por volta dos 30/36 meses de idade. Os dentes decíduos são em número de 10 para cada arcada (totalizando 20 dentes decíduos), sendo quatro incisivos, dois caninos e quatro molares para cada arcada.
- () A odontologia para bebês é concebida como uma proposta de educação e prevenção ainda na primeira infância, sendo a conscientização dos pais um aspecto importante, mas não o principal. A educação e a motivação é um processo construído lentamente, devendo ser realizada através de orientações sobre a importância da boca, da dentição decídua, da amamentação natural, do conceito da cárie dentária como uma doença e da existência de medidas eficazes.
- () O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de uma criança deve ser também um ato educativo que possibilite à família conhecer as condições de saúde da criança, participando ativamente nos cuidados a ela dirigidos. Educar para a saúde é educar para a vida e, na maioria das vezes, deve-se começar por ensinamentos dirigidos aos pais, acompanhantes e futuros responsáveis mais próximos, que possam aprender como se promove saúde e se previne doença.
- () A influência dos fatores ambientais sobre o crescimento e desenvolvimento ocorre diretamente desde o momento da concepção e após, podendo ser subdivididos em fatores pré-natais: relacionados à nutrição, fatores endócrinos, infecciosos, imunitários, estado emocional da mãe durante a gravidez, dentre outros, e os fatores pós-natais: representados por nutrição, atividade física, ambiente, estímulos biopsicossociais, agravos de saúde, tanto físicos como emocionais, dentre outros.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F F
- B) F F V V
- C) V V F F
- D) V F F V
- E) V V V F

Questão 46 (Peso 1,00)

A Organização Mundial de Saúde sustenta que, se os Governos, Organizações Internacionais e a Sociedade Civil regulamentarem políticas e programas de envelhecimento ativo, melhorando os indicadores, a saúde, a participação e a segurança dos idosos, os países podem proporcionar o envelhecimento saudável a suas populações. Tais políticas devem se basear em direitos, necessidades, preferências e capacidades dos idosos.

Sobre a saúde bucal dos idosos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Estudos populacionais têm demonstrado um declínio na prevalência da cárie dental, levando aos futuros idosos uma melhor preservação dos elementos dentários.
- () A preservação de maior número de elementos dentários na população idosa, diminui o número de superfícies radiculares em risco de desenvolvimento de lesões de cárie.
- () A doença periodontal crônica é o problema de menor prevalência no idoso. Os trabalhos mostram que há uma baixa correlação entre a profundidade de bolsa e o aumento da idade.
- () Há associação direta entre experiência de cárie no passado (cárie coronária) e o risco de desenvolvimento de lesões de cárie radicular, ou seja, aqueles que tiveram marcante experiência de cárie no passado são pacientes em risco de desenvolver lesões, também, nas superfícies expostas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F
- B) F V F F
- C) V V F F
- D) V F V F
- E) V F F V

Questão 47 (Peso 1,00)

O levantamento epidemiológico de 2004 foi intitulado de “SB Brasil: Condições de Saúde Bucal na População Brasileira”. Sua construção iniciou-se em 1999. Foi um projeto do Ministério da Saúde que possuía como objetivo geral: produzir informações sobre as condições de saúde bucal da população brasileira e subsidiar o planejamento/ avaliação de ações nessa área nos diferentes níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, por meio da coordenação de um amplo esforço nacional para o estudo dessas condições e para a criação e manutenção de uma base de dados eletrônica relativa aos principais problemas nesse campo, articulando diferentes agências e unidades de saúde, e contribuindo na perspectiva da estruturação de um sistema nacional de vigilância epidemiológica em saúde bucal.

Sobre os achados dos levantamentos de 2004 e 2010, é correto afirmar que

- A) em 2004, crianças brasileiras de 12 anos de idade e adolescentes entre 15 e 19 anos apresentaram, respectivamente, em média, os índices de 2,07 e 4,25 dentes com experiência de cárie dentária.
- B) em 2010, quase 27% das crianças entre 18 e 36 meses apresentam pelo menos um dente decíduo com experiência de cárie dentária, sendo que a proporção chegou a quase 60% das crianças de cinco anos de idade.
- C) em 2010, no que se refere aos adultos, o CPO-D médio foi de 16,75 na faixa etária entre 35 e 44 anos e de 27,53 na faixa entre 65 e 74 anos. Menores índices para o grupo entre 35 e 44 anos encontram-se nas regiões Nordeste e Sudeste.
- D) em 2004, aos cinco anos de idade, uma criança brasileira possuía, em média, o índice de 2,43 dentes com experiência de cárie, com predomínio do componente cariado, que é responsável por mais de 80% do índice.
- E) em 2010, um dos achados referiu que, em média, uma criança brasileira de três anos ou menos já possuía, pelo menos, um dente com experiência de cárie dentária, ceo-d=1,1. Já aos cinco anos, esta média aumentou para quase três dentes atacados (ceo-d=2,8).

Questão 48 (Peso 1,00)

A avaliação de programas e serviços de saúde compreende uma série de ações e procedimentos. É essencial que tais ações sigam um roteiro claro e consistente, sendo amplo o necessário para comportar os mais diferentes referenciais, concepções e propostas metodológicas. Dessa forma, se garante legitimidade ao processo avaliativo (FURTADO, 2015, p. 781).

Considerando a sequência correta para se realizar um processo avaliativo, numere em ordem cronológica de 1 a 7 as etapas a seguir:

- () utilizar os resultados
- () descrever o programa
- () comunicar os resultados
- () coletar e analisar os dados
- () definir as questões da avaliação
- () identificar os grupos de interesse
- () definir os propósitos da avaliação

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 7 2 5 4 6
- B) 3 6 7 5 2 4 1
- C) 5 2 4 1 6 3 2
- D) 7 3 6 5 4 1 2
- E) 7 1 6 2 3 4 5

Questão 49 (Peso 1,00)

O levantamento epidemiológico em saúde bucal é um importante instrumento para definição, implementação e avaliação de ações preventivas e assistenciais. Em 2012, o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Saúde Bucal, divulgou a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil 2010), o quarto levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área de Saúde Bucal,

Quanto aos resultados obtidos no SBBrasil 2010, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A proporção de indivíduos livres de cárie (ceo/CPO = 0) diminuiu em função da idade, o que pode ser considerado um fenômeno comum face ao caráter cumulativo dos índices utilizados.
- () Estima-se que a prevalência de fluorose dentária em crianças de 12 anos de idade é de cerca de 50%, sendo que a maior prevalência de crianças com fluorose foi observada na Região Nordeste.
- () Considerando as grandes perdas dentárias nos grupos etários de 35 a 44 anos e de 65 a 74 anos, observa-se que a prevalência de cárie de raiz é baixa e que a maioria das raízes expostas apresenta-se hígidas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) F V V
- D) F F V
- E) F V F

Questão 50 (Peso 1,00)

O tratamento restaurador atraumático (TRA) é um tratamento alternativo para a cárie dentária, através do qual a dentina cariada desmineralizada e insensível é removida.

Sobre o TRA, é correto afirmar que

- A) só deve ser realizado sob isolamento absoluto.
- B) não se deve realizar em dentes angulados ou em pacientes pouco cooperadores.
- C) por não necessitar de equipamentos odontológicos, o cirurgião-dentista e sua equipe só podem atuar em áreas de sua responsabilidade que estejam próximas da sua unidade de saúde.
- D) as revisões devem ser criteriosas e demoradas, pois pode haver cárie por baixo das restaurações, pois o cimento ionômero de vidro (CIV) possui baixa viscosidade, logo pouca aderência, sendo necessário repetir o procedimento de três em três meses.
- E) o paciente se mantém tranquilo durante o procedimento, uma vez que não provoca dor. Assim, é capaz de absorver as instruções e técnicas motivacionais de educação para a saúde com mais facilidade.