

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)**

**Questão 01 (Peso 0,50)**

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- ( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- ( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 02 (Peso 0,50)**

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

**Questão 03 (Peso 0,50)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

**Questão 04 (Peso 0,50)**

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

**Questão 05 (Peso 0,50)**

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

**Questão 06 (Peso 0,75)**

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- ( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- ( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

**Questão 07 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- ( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- ( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- ( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 08 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

**Questão 09 (Peso 0,75)**

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

**Questão 10 (Peso 0,75)**

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

**Questão 11 (Peso 0,75)**

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). \_\_\_\_\_ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

**Questão 12 (Peso 0,75)**

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Questão 13 (Peso 0,75)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

**Questão 14 (Peso 0,75)**

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

**Questão 15 (Peso 0,75)**

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar \_\_\_\_\_ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial \_\_\_\_\_ dos casos \_\_\_\_\_ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as \_\_\_\_\_. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)**

**Questão 16 (Peso 0,50)**

Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência na instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A atuação do psicólogo em um hospital pode ocorrer nos níveis psicoterapêutico, psicoprofilático e psicopedagógico.
- ( ) O nível psicodiagnóstico de atuação trata da atenção primária, ou seja, o objetivo é, exclusivamente, a prevenção de doenças.
- ( ) O nível de atuação que envolve as intervenções psicoterápicas em si, com aplicação de técnicas e de procedimentos específicos, recebe o nome de psicoterapêutico.
- ( ) O nível de atuação psicopedagógica no hospital trata de fornecer as devidas informações ao paciente sobre fatores de risco e de proteção, sobre o estado geral de saúde, procedimentos, diagnósticos e prognósticos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) V F F F
- D) F V V F
- E) F F V V

**Questão 17 (Peso 0,50)**

Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência psicoterápica no *setting* terapêutico da instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O cliente hospitalizado não deve ser abordado pelo psicólogo em seu próprio leito, pois sequer tem claro qual o papel do psicólogo naquele momento de sua hospitalização e até mesmo de sua vida.
- ( ) Independente da abordagem teórica, os objetivos principais da psicoterapia são levar o paciente ao autoconhecimento, ao autocrescimento e à cura de determinados sintomas, inclusive, no contexto hospitalar.
- ( ) Os clientes hospitalizados encaminhados à psicoterapia reservam a si o direito de rejeitar tal encaminhamento, e a opção do cliente de receber ou não esse tipo de intervenção deve ser soberana e deliberar a prática do psicólogo.
- ( ) atendimentos psicológicos devem ser evitados em enfermarias para que não sejam interrompidos pela equipe, seja para prescrição médica em determinados horários, para aplicação de injeções, seja, ainda, para limpeza e assepsia hospitalar, por exemplo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 18 (Peso 0,50)**

\_\_\_\_\_ é o atendimento psicológico que “[...] pressupõe a necessidade de manter profissionais de psicologia [...] à disposição de uma dada comunidade ou instituição por períodos determinados ou ininterruptos” (MAHFOUD, 2012 apud COMIN, 2015, p. 163)

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Clínica Peripatética
- B) Plantão Psicológico
- C) Sobreaviso Psicoterápico
- D) Acompanhamento Terapêutico
- E) Programa de Intensificação de Cuidados

**Questão 19 (Peso 0,50)**

Com relação à diferença entre a relação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Na relação transdisciplinar, as ações são definidas e estabelecidas em conjunto.
- ( ) A relação interdisciplinar exige uma flexibilidade epistemológica que permita transcender os limites de atuação do núcleo em direção ao campo mais vasto.
- ( ) Na relação multidisciplinar, diversos profissionais atendem a um único paciente de forma independente, com olhar somente para sua especificidade de atuação.
- ( ) A relação interdisciplinar acontece quando alguns profissionais discutem entre si a situação de um paciente sobre características comuns a mais de uma especialidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V F
- E) F V F F

**Questão 20 (Peso 0,50)**

Em uma conjuntura de hospitalização, \_\_\_\_\_ torna-se de essencial relevância, não apenas porque o paciente já deve ter sido submetido a várias entrevistas diagnósticas, como também porque o seu estado mental ou, mesmo, uma possível impregnação por medicamentos pode torná-lo menos acessível ou motivado para o tipo de exame que está sendo sugerido. Então, a entrevista inicial e \_\_\_\_\_ para a administração de instrumentos, exatamente por se tratar em geral de um processo diagnóstico multidisciplinar, praticamente, podem se superpor, porque não há necessidade de mobilizar tanto o paciente com perguntas, cujas respostas já constam nos prontuários, e porque os objetivos da avaliação já estão bem claros e definidos.

A alternativa que preenche, corretamente, ambas as lacunas do trecho acima é

- A) o rapport
- B) a congruência
- C) a atitude ética
- D) a intuição profissional
- E) a consideração positiva incondicional

**Questão 21 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo frente à hospitalização de adultos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) No atendimento ao paciente adulto hospitalizado, o psicólogo intensivista permite que o paciente tenha uma livre expressão de seus sentimentos, medos e desejos, propiciando uma elaboração do processo de adoecimento.
- ( ) Lidar com a mudança de comportamento decorrente de tratamentos invasivos e das intervenções que aumentam a sobrevivência, bem como do sofrimento daí advindo, constitui um exemplo de situação que requer orientação da Psicologia Intensiva junto aos pacientes adultos.
- ( ) A atuação do psicólogo junto a pacientes adultos na UTI se justifica na necessidade de suporte psicoterápico que o paciente necessita, devido à possibilidade de apresentar uma série de distúrbios/transtornos psíquicos, relacionados ou não ao processo de adoecimento e à própria internação na UTI.
- ( ) Muitas vezes observa-se, nos psicólogos que atuam junto a adultos hospitalizados em UTI, um raro uso de mecanismos de defesa devido ao desgaste emocional intenso, à responsabilidade, ao cansaço e às difíceis relações estabelecidas nas equipes multiprofissionais, atestando um possível distanciamento emocional e embotamento afetivo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V V F
- C) V F V V
- D) F F F V
- E) F V V F



**Questão 22 (Peso 0,75)**

Quando o adolescente é hospitalizado, depara-se, frequentemente, com uma situação completamente nova e desconhecida, tendo que se submeter a tratamentos, exames e procedimentos muitas vezes invasivos e/ou dolorosos.

Sobre o atendimento psicológico ao adolescente hospitalizado, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O desenvolvimento do paciente hospitalizado pode ficar comprometido pelas experiências que ele se vê obrigado a enfrentar.
- ( ) O adolescente hospitalizado defronta-se com seu novo status de doente e passa a ocupar um espaço que o despersonaliza, longe dos seus pertences e de sua identidade.
- ( ) A experiência mais difícil frente ao adoecimento se refere ao afastamento das pessoas significativas e queridas à criança e ao adolescente, gerando sentimento de abandono.
- ( ) A separação da figura materna no processo de hospitalização, invariavelmente, acarreta diversos problemas, dentre os quais: depressão, ansiedade, psicose, atraso no desenvolvimento, agitação psicomotora, bruxismo e falta de colaboração no tratamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F F
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F F V V

**Questão 23 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo hospitalar frente ao paciente pediátrico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Quando as crianças são hospitalizadas, passam por quatro fases: revolta, negativismo, apatia e aceitação.
- ( ) Na fase do negativismo, a criança se rebela com o internamento e os procedimentos invasivos, passando a se negar a colaborar.
- ( ) A fase da apatia só é convertida em aceitação a partir do processo de formação de vínculos com a equipe a partir da aquiescência dos cuidados oferecidos.
- ( ) A despersonalização atinge a criança hospitalizada quando se espera que ela se comporte de maneira submissa às regras do hospital, incluindo seus horários para dormir, comer e receber visitas, além de se disponibilizar a procedimentos diversos quando a equipe ordena.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F V V
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V F F

**Questão 24 (Peso 0,75)**

Dentre os aspectos avaliados na consulta psicológica do paciente internado, \_\_\_\_\_ é um acontecimento de difícil assimilação por parte do sujeito e que por isso mesmo deflagra ou ajuda a deflagrar o processo de adoecimento.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o retorno do recalçado
- B) a transferência traumática
- C) o estresse pós-traumático
- D) o ganho secundário reverso
- E) a situação vital desencadeante

**Questão 25 (Peso 0,75)**

Com relação ao atendimento psicológico hospitalar aos familiares dos pacientes hospitalizados, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Junto à família, o psicólogo hospitalar deve evitar dar ensejo ao medo da perda do paciente para não gerar uma iatrogenia.
- ( ) O psicólogo hospitalar atua com a possibilidade de auxílio na reorganização egóica do todo familiar do paciente frente ao sofrimento atual.
- ( ) A atuação do psicólogo hospitalar junto à família visa a minorar a elaboração de fantasias, medos e angústias próprios de um momento como este.
- ( ) Cabe ao psicólogo hospitalar, a detecção de focos de ansiedade e de dúvidas no grupo familiar, levando a sua diminuição ou extinção, promovendo a uma aproximação do grupo familiar frente à equipe de saúde, facilitando a comunicação e contribuindo para o tratamento do paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 26 (Peso 0,75)**

Com relação ao que é avaliado nas etapas da interconsulta psicológica, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Técnicas a serem utilizadas em psicoterapia breve.
- ( ) Compreensão geral dos aspectos clínicos do paciente.
- ( ) Expectativas da equipe em relação à atuação do psicólogo.
- ( ) Medidas de proteção e de segurança necessárias para o atendimento ao paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F V V V
- E) F F V F

**Questão 27 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo intensivista, é correto afirmar que

- A) as intervenções psicológicas em UTI podem ser realizadas apenas com o paciente e a família, se houver autorização dos responsáveis legais para tanto.
- B) as intervenções psicológicas mais utilizadas são psicodiagnóstico, orientação, psicoterapia, rapport e entrevista motivacional. Dependendo do caso e da especialidade da UTI, outros objetivos podem existir.
- C) a ação do psicólogo na UTI se deve ao apoio psicoterapêutico que a família demanda devido aos transtornos psicossociais que podem vir a causar, relacionados ou não ao processo do adoecimento e do internamento na UTI.
- D) na UTI, devido aos riscos envolvidos, o psicólogo evita que o paciente tenha uma expressão livre de seus sentimentos, medos ou desejos, proporcionando-lhe uma elaboração do processo do adoecimento, apenas, após a saída da unidade.
- E) lidar com a aflição, a dor e a mudança de comportamento em decorrência de tratamentos invasivos e com as intervenções, que visam a aumentar a sobrevida, constitui um exemplo de situação que requer orientação da Psicologia Intensiva.



**Questão 28 (Peso 0,75)**

Com relação à atuação do psicólogo nas unidades de urgência, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O psicólogo não deve esquecer que é um catalisador dos processos emocionais surgidos dentro da realidade institucional da unidade de urgência.
- ( ) O psicólogo coopera com a equipe trabalhando na preparação do paciente, auxiliando-o a controlar a ansiedade e fornecendo informação adequada e suficiente.
- ( ) Auxiliar na criação de um clima de confiança entre profissionais e paciente, permitindo ao paciente a verbalização dos medos suscitados pelas perspectivas de tratamento são atuações possíveis ao psicólogo na unidade de urgência.
- ( ) Quando o paciente da unidade de urgência descrever suas dores, incômodos, almejando reabilitação e reestruturação de vida, devido à instabilidade do setting em questão, cabe imediatamente ao psicólogo o dever ético deontológico de solicitar formalmente à família e ao serviço social da unidade o encaminhamento externo do mesmo para uma psicoterapia após a intervenção em caráter de urgência.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V V
- C) V V V F
- D) F V F F
- E) F V V F

**Questão 29 (Peso 0,75)**

As \_\_\_\_\_, do ponto de vista psicológico, caracterizam-se por uma \_\_\_\_\_, na qual o sujeito não encontra meios de fazer valer a \_\_\_\_\_, como forma de enfrentamento, estando mergulhado nesse mar de sensações cruas e intensas.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) demandas emergentes / imprevisibilidade / socialização
- B) psicoterapias breves / conveniente celeridade / transferência
- C) situações de emergência / inundação do real no simbólico / simbolização
- D) unidades de pronto-atendimento / pressão constante / estratégia de coping
- E) regressões psicodinâmicas / situação de intenso estresse / racionalidade basal

**Questão 30 (Peso 0,75)**

Com relação ao Mini-Exame de Estado Mental, é correto afirmar que

- A) requer, geralmente, de 60 a 90 minutos para ser administrado.
- B) fornece uma avaliação qualitativa do desempenho e da capacidade cognitiva do paciente.
- C) é útil na avaliação quantitativa da gravidade do prejuízo cognitivo e na documentação em série de alterações cognitivas.
- D) serve para identificar subtipos de episódios psicóticos desencadeados pelo contexto de despersonalização da hospitalização.
- E) o entrevistador é instruído a submeter o paciente a uma situação intencional de frustração, com vistas a avaliar suas reações frente à pressão, enquanto faz uma série de 11 perguntas.

**Questão 31 (Peso 1,00)**

Com relação ao atendimento psicológico hospitalar em ambulatório, \_\_\_\_\_ constitui-se como um instrumento metodológico empregado pelo profissional para compreender e aprimorar a assistência ao paciente no hospital geral, através do diagnóstico e do tratamento de transtornos psicológicos, problemas interpessoais e dilemas institucionais envolvendo o paciente, sua família e a equipe de saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o acolhimento inicial
- B) a psicoterapia breve
- C) a análise institucional
- D) a contrarreferência clínica
- E) a interconsulta psicológica

**Questão 32 (Peso 1,00)**

Sobre as etapas do acolhimento nas unidades de urgência, é correto afirmar que

- A) cabe, primordialmente, ao psicólogo, orientar sobre os benefícios do tratamento e as complicações que podem ocorrer, e flexibilizar o horário da visita quando houver necessidade.
- B) a Fase de Apoio caracteriza-se pelas orientações à família sobre o que está acontecendo com o paciente, usando-se palavras de fácil compreensão e enfatizando que tudo está sendo feito para manter a sua saúde.
- C) oferecer apoio e conforto ao paciente e à família são as principais funções da Fase de Vínculo, orientando a família sobre as condições do paciente antes da visita, identificando as necessidades de informação, e amparo do paciente e da família, buscando ajudá-los a satisfazer tais necessidades.
- D) a Fase de Acesso consiste em receber o paciente, prestando os cuidados necessários, proporcionando segurança ao paciente. Faz-se necessário adequar o ambiente de forma que os familiares tenham conforto enquanto aguardam informações, confortando-os e esclarecendo as regras e rotinas da instituição.
- E) iniciar a educação em saúde desde a internação, ao incentivar paciente e familiares a questionarem sobre suas dúvidas, possibilitando estabelecer uma relação de confiança, na qual o paciente e a família sintam-se seguros e possam expressar suas dúvidas, medos e angústias são atribuições prioritárias do enfermeiro da unidade, portanto o profissional de psicologia deve abster-se de atuar neste mister.

**Questão 33 (Peso 1,00)**

Na \_\_\_\_\_, o sofrimento se tornou insuportável para o sujeito, impossível de ser expresso em \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) simbolização / mecanismos de defesa
- B) urgência subjetiva / palavras e imagens
- C) angústia de castração / fantasias oníricas
- D) situação de emergência / alguns minutos
- E) internação hospitalar / situação de institucionalização

**Questão 34 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ caracteriza indivíduos ambiciosos, competitivos, impacientes, que necessitam aparentar ser fortes. São indivíduos que procuram fazer mais e mais em menos tempo. Apresentam correlação estatística importante com coronariopatia, pois seu padrão de personalidade favorece a emergência da doença.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Personalidade Tipo A
- B) Personalidade Tipo B
- C) Personalidade Tipo C
- D) Personalidade Anancástica
- E) Transtorno de Personalidade Borderline

**Questão 35 (Peso 1,00)**

A intensidade, forma e duração da resposta do paciente à cirurgia oncológica está relacionada com sua \_\_\_\_\_, com o modo como foi preparado (\_\_\_\_\_) e como foi conduzido, e o comportamento de seus familiares e dos profissionais de saúde. Isto determina sua \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) metástase / cuidados paliativos / aceitação / ortotanásia
- B) enfermidade / empatia / convalescência / retorno às atividades
- C) personalidade / psicoprofilaxia / desadaptação afetiva / luto corporal
- D) recuperação / instrumentação cirúrgica / conduta anestesiológica / nível de consciência
- E) atividade de vida diária / acompanhamento terapêutico / estratégia de enfrentamento / coping

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)**

**Questão 36 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ é o transtorno alimentar mais comum entre a população, atinge, principalmente, as mulheres, e apresenta taxa de mortalidade de 0,3%. Para receber o diagnóstico, a pessoa deve apresentar: compulsão alimentar periódica, comportamentos compensatórios e cognições relacionadas à insatisfação com a imagem corporal.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna no trecho acima é

- A) Ortorexia
- B) Anorexia nervosa
- C) Bulimia nervosa
- D) Transtorno de Compulsão Alimentar
- E) Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP)

**Questão 37 (Peso 1,00)**

O estudo das condições psicológicas do adolescente cardiopata aponta para uma autoestima, frequentemente, rebaixada, associada a sentimentos de inadequação e menos-valia. Os pacientes atribuíram a etiologia destes estados às suas condições de cardiopatas (ALMEIDA, 2000).

Sobre os aspectos psicossociais relevantes ao profissional de saúde para a abordagem clínica do adolescente cardiopata, é correto afirmar que

- A) a percepção do paciente em pertencer à categoria de cardiopata se traduz como clinicamente irrelevante, já que tal consciência interessa apenas ao paciente adulto, capaz de projetar as ameaças da doença ao seu corpo.
- B) a maioria dos pacientes cardiopatas (cerca de 90%) não se percebe limitado quanto à experimentação do ambiente e de seu corpo, mantendo hábitos comuns à fase como o uso de bebida alcoólica e prática de esportes.
- C) a tendência à experimentação dos limites do ambiente e de seu corpo são inerentes à vivência da adolescência, o que aponta, ao profissional de saúde, a necessidade de punir tais transgressões no ambiente hospitalar, a fim de propiciar um melhor manejo da adesão do paciente.
- D) o adolescente cardiopata, à revelia da condição de doente, não consegue valorizar a saúde, engajando-se em comportamentos de risco na busca pela autonomia, apresentando assim os chamados comportamentos imunógenos, referentes a hábitos e estilo de vida prejudiciais à saúde.
- E) há diferenças emocionais entre o adolescente saudável e aquele portador de cardiopatia, o que gera a sobreposição de experiências mentais de perdas e lutos, no caso do doente, relacionadas à perda do corpo da infância, da identidade infantil, por um lado, e alterações sexuais, escolares e emocionais, a partir do adoecimento.

**Questão 38 (Peso 1,00)**

“O impacto das condições e estilos de vida na saúde das populações é um tema muito discutido atualmente. Os determinantes sociais em saúde têm estado no centro deste debate” (ASSIS et al, 2009. p. 93).

Em relação aos determinantes sociais de problemas de saúde da população infantil, é correto afirmar que

- A) atributos familiares, escolares, comunitários e do cenário sociopolítico em que vive a criança e sua família são fatores secundários nesse contexto.
- B) baixo estrato socioeconômico familiar e precário nível de escolaridade dos pais são determinantes sociais que influenciam negativamente na saúde infantil.
- C) os determinantes sociais ocupam uma função secundária durante a infância, a despeito da vulnerabilidade e da dependência observadas nesta fase da vida.
- D) os determinantes sociais de saúde da população infantil englobam temas como desnutrição e baixo peso ao nascer, mas não se relacionam a problemas perinatais graves.
- E) os determinantes sociais relacionados à população infantil desconsideram como fatores responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento infantil aqueles que perpassam os período pré-natal e perinatal.

**Questão 39 (Peso 1,00)**

Osório (2004) caracteriza a família como um sistema de interrelações, que tende a evoluir e expressar mudanças de acordo com as vivências inerentes ao desenvolvimento do grupo familiar e às mudanças ambientais, a exemplo de uma doença.

Considerando a experiência de adoecimento cardíaco do adolescente e o manejo destinado à sua família, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Um erro comum da família de adolescentes cardiopatas é a abertura à negociação da autonomia e controle, já que o grupo familiar deve priorizar as alterações biológicas e o imperativo terapêutico.
- ( ) São estratégias de manejo do adolescente cardiopata e da sua família descritos pela literatura: comunicação eficaz, investimento em estratégias de vínculo terapêutico, preparo emocional ao curso da doença e psicoeducação.
- ( ) A família do adolescente cardiopata deve ser tratada como protagonista das práticas assistenciais da equipe multiprofissional em cardiologia, manejo comprovadamente facilitador da aceitação do paciente às diretrizes terapêuticas.
- ( ) No cotidiano da assistência hospitalar ao adolescente cardiopata, o contato com a família possibilita à equipe o entendimento dos efeitos familiares sobre o processo de doença, já que aquelas famílias, que não apresentam estrutura emocional para a crise, tendem a dificultar o tratamento e o prognóstico do paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 40 (Peso 1,00)**

“O saber na área da saúde, assim como em outras áreas do conhecimento, caracteriza-se pela fragmentação disciplinar. Cada vez mais lidamos com especialidades e sub-especialidades. Reproduzindo o modelo médico, a psicologia estrutura a sua formação em grandes áreas de especialização, como psicologia clínica, social, educacional, hospitalar, e outras e, dentro de cada área, surgem ‘especializações’ que, embora não estejam formalizadas como tal, funcionam deste modo na prática” (GALVÁN, 2007, p.54).

Sobre o trabalho do psicólogo em equipe e os desafios do trabalho multi, inter e transdisciplinar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A transdisciplinaridade diz respeito a uma compreensão que transcende o âmbito de cada disciplina e surge através da articulação que possibilita o surgimento de uma nova visão da natureza e da realidade.
- ( ) Em uma equipe interdisciplinar, há possibilidade de troca de instrumentos, técnicas, metodologias e esquemas conceituais entre as disciplinas. Assim, trata-se de um diálogo que leva ao enriquecimento e à transformação das disciplinas envolvidas.
- ( ) Na medida em que uma equipe abre mão da rigidez disciplinar e as interlocuções passam a ser mais efetivas entre os participantes, a identidade oferecida pelo título profissional (psicólogo) se fragiliza e o indivíduo perde o seu papel e a sua identidade profissional.
- ( ) Quando a equipe funciona de modo multidisciplinar, cada especialista emprega sua metodologia, baseado em suas hipóteses e teorias, sendo que o objeto em questão é visto sob múltiplos pontos de vista, numa justaposição de conhecimentos, ou seja, o mesmo tema é abordado sob ângulos variados, não existindo a perspectiva de síntese.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F V F F

**Questão 41 (Peso 1,00)**

No que diz respeito às populações em situação de risco, estando incluídas neste público as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a Psicologia Social Comunitária tem um importante papel nas ações voltadas para a promoção da saúde e para a prevenção de danos à saúde mental destes sujeitos. Esta situação de vulnerabilidade social pode atingir diversas áreas da vida de crianças e adolescentes: o aproveitamento escolar, as relações afetivas consigo mesmo e com o mundo, aumento da exposição a situações de violência e ao uso problemático de drogas, até nas condições de saúde de uma forma geral (BRAGA et. al., 2015).

Sobre o papel da Psicologia Social Comunitária no cuidado a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A Psicologia Social Comunitária tem como objetivo fortalecer os sujeitos como cidadãos, que possuem direitos e deveres, valorizando os aspectos saudáveis presentes nos sujeitos, nas famílias e na comunidade.
- ( ) O psicólogo social deve fazer intervenções com o objetivo de eliminar ou minimizar os efeitos dos riscos e das vulnerabilidades que podem causar prejuízos ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, articulando, para isso, diversas políticas públicas.
- ( ) O psicólogo social deve realizar trabalhos que possibilitem a autonomia dos sujeitos de acordo com a demanda de cada território e atendam às necessidades apresentadas pelos sujeitos e seus familiares através de um mapeamento da ocorrência de situações de riscos e vulnerabilidade.
- ( ) O psicólogo social no trabalho com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social deve ter como principais objetivos: o acompanhamento individualizado das etapas do desenvolvimento infantil e a realização de intervenções, que busquem a modificação do comportamento destas crianças em relação aos riscos existentes em sua realidade social.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F V
- C) V V V F
- D) F F V F
- E) F V F F

**Questão 42 (Peso 1,00)**

Com relação aos transtornos de personalidade apresentados na décima edição da Classificação Internacional das Doenças (CID-10), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O transtorno de personalidade anancástica é caracterizado por um sentimento de dúvida, verificações, perfeccionismo, escrupulosidade e preocupação com pormenores, obstinação, prudência e rigidez excessivas.
- ( ) Existe um desejo permanente de ser amado e aceito, reticência a se relacionar pessoalmente, hipersensibilidade à crítica e à rejeição, e tendência a evitar certas atividades que saem da rotina com um exagero dos perigos ou dos riscos potenciais em situações banais nas pessoas acometidas pelo transtorno de personalidade ansiosa.
- ( ) A pessoa com transtorno da personalidade antissocial é caracterizada por uma incapacidade de expressar seus sentimentos e de experimentar prazer, um retraimento dos contatos sociais, afetivos ou outros, preferência pela fantasia, pelas atividades solitárias e pela reserva introspectiva.
- ( ) O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma sugestibilidade, egocentrismo, autocomplacência, dramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções, afetividade superficial e lábil, falta de consideração para com o outro, desejo permanente de ser apreciado e de constituir-se no objeto de atenção e pela tendência a se sentir facilmente ferido.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F V F F

**Questão 43 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ é um transtorno caracterizado por um déficit intenso de memória de fixação (sobretudo do tipo episódica), geralmente, acompanhado de confabulações e desorientação temporoespacial. As confabulações ordinariamente têm caráter de grandeza. Geralmente, é um distúrbio decorrente da deficiência de vitamina B1 (tiamina) em indivíduos desnutridos, alcoolistas crônicos, caquéticos. Indivíduos acometidos apresentam um grave déficit de memória episódica, podendo ter a memória semântica bem preservada. Nos casos mais graves, o doente é incapaz de reter informação nova, não conseguindo aprender nada; segundos após ser apresentado ao profissional avaliador, não sabe dizer quem é ele nem o seu nome, por exemplo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Nistagmo
- B) Narcolepsia
- C) Síndrome de Klinefelter
- D) Síndrome de Korsakoff
- E) Demência de Creutzfeld-Jakob

**Questão 44 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ são formas de psicose esquizofreniforme com início tardio, caracterizada pelo surgimento de delírios, geralmente, acompanhados de alucinações, guardando relativa preservação da personalidade do sujeito acometido. Alguns autores as consideram tipos tardios de esquizofrenia, surgindo, usualmente, após os 45 ou 50 anos de idade.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Parafrenias
- B) Paranoias
- C) Experiências anômalas
- D) Exterocepções
- E) Hebefrenias metanoicas

**Questão 45 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ caracteriza-se pela resistência não deliberada, imotivada e incompreensível às solicitações externas. No tipo passivo, o paciente, simplesmente, não faz o que lhe é pedido; no tipo ativo, ele faz o oposto ao solicitado. É um sintoma observado em quadros catatônicos, como na esquizofrenia e na depressão.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Hipobulia
- B) Frangofilia
- C) Negativismo
- D) Apragmatismo
- E) Ambitendência

**Questão 46 (Peso 1,00)**

\_\_\_\_\_ caracteriza-se pela dificuldade ou incapacidade de realizar condutas volitivas e psicomotoras minimamente complexas, como atentar para a própria higiene pessoal ou ambiental, ou qualquer tipo de atividade produtiva para si ou para seu meio. Não havendo incapacidade neuropsicológica de realizar tais atos motores complexos, resulta de alteração básica das esferas volitivas e afetivas. Por ser um sintoma frequente nas psicoses crônicas, representa um desafio à reabilitação dos pacientes acometidos.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Apragmatismo
- B) Discinesia
- C) Mioclonia
- D) Acatisia
- E) Apraxia



**Questão 47 (Peso 1,00)**

Tendo em vista a Reforma Psiquiátrica Brasileira e a transformação do modelo de atenção à saúde mental, a família assume um lugar central no cuidado e na reinserção social das pessoas com transtorno mental (NASCIMENTO et al, 2016).

Sobre os desafios encontrados pelos familiares e o cuidado que deve ser ofertado para a família da pessoa com transtorno mental, é correto afirmar que

- A) o profissional de saúde deve acolher a família, oferecer informações sobre os transtornos mentais e dizer qual o melhor modo de cuidar dos indivíduos, de modo que os familiares deixem de lado antigas crenças e rotinas de cuidado.
- B) os familiares enfrentam muitas dificuldades no cuidado à pessoa com transtorno mental, e as pesquisas demonstram que, de um modo geral, o nível de sobrecarga emocional os torna insatisfeitos por ter que exercer esse papel de cuidadores.
- C) os cuidados aos familiares nos serviços de saúde mental devem estar focados na informação sobre os transtornos mentais e nas orientações sobre o cuidado. As questões relacionadas à sobrecarga emocional sofrida pelos familiares devem ser tratadas em outros serviços de saúde.
- D) um dos grandes desafios dos familiares está relacionado com a imprevisibilidade e o manejo das crises, visto que, independente do tempo e da experiência que tenham acumulado no cuidado com as pessoas com transtorno mental, este manejo só é possível de ser feito por profissionais.
- E) nas situações de crise, os familiares tendem a buscar os serviços de saúde e as condutas a serem adotadas por parte da equipe são o acolhimento, as visitas domiciliares, a observação continuada, o cuidado medicamentoso e o apoio ao familiar para que o internamento seja o último recurso utilizado.

**Questão 48 (Peso 1,00)**

“As desigualdades na organização da sociedade implicam que a liberdade para gozar de uma vida próspera e de boa saúde esteja distribuída de forma desigual dentro e entre sociedades. Essa desigualdade pode ser constatada nas condições vigentes na primeira infância e idade escolar [...]” (CARVALHO, 2013. p. 24).

Sobre a influência dos determinantes sociais de saúde relacionados à população infantil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O desenvolvimento na primeira infância não tem influência nas possibilidades subseqüentes da vida e saúde do indivíduo.
- ( ) Os programas de educação pré-escolar e as escolas podem ter um papel vital na construção das capacidades das crianças.
- ( ) A primeira infância é afetada de forma direta pelos riscos de obesidade, má nutrição, transtornos mentais, doenças cardiovasculares e criminalidade.
- ( ) A qualidade de vida na infância não demanda, necessariamente, ações intersetoriais, visto que o setor saúde é o principal responsável pelas ações que promovem o bem-estar das crianças.

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V V F
- E) F V F V

**Questão 49 (Peso 1,00)**

Sobre a promoção e prevenção relacionadas à saúde da criança e do adolescente, a partir das contribuições da psicologia social comunitária, é correto afirmar que

- A) as ações do psicólogo social devem estar voltadas para as famílias e a comunidade, visto que as crianças e adolescentes ainda não são sujeitos conscientes de seus direitos e deveres.
- B) o psicólogo social deve desenvolver atividades que promovam o protagonismo de crianças e dos adolescentes, de modo que eles possam conquistar sua autonomia, fazer suas próprias escolhas e ter projetos de vida.
- C) ao defender os direitos de crianças e adolescentes o psicólogo social deve se preocupar, principalmente, em modificar a dinâmica familiar, não devendo se envolver em questões políticas que envolvam a comunidade em geral.
- D) para iniciar o trabalho com crianças e adolescentes, o psicólogo social deve fazer uma análise da comunidade onde elas estão inseridas, e, a partir de parâmetros teóricos, definir e transmitir as soluções dos problemas para a família e a comunidade.
- E) dentre as atividades desenvolvidas pelo psicólogo social estão, principalmente, o psicodiagnóstico e a psicoterapia individual, que terão como objetivo a mudança de comportamento destes sujeitos para lidar com a realidade em que vivem.

**Questão 50 (Peso 1,00)**

“O psicólogo, profissional presente nas instituições de saúde, tem a sua prática atravessada por vivências de grande significado na vida das pessoas: o nascimento, a doença e a morte. A presença ou iminência dessas situações geram ansiedades, angústias, medos, desencadeiam crises pessoais e familiares, configuram mudanças e impõem aos profissionais vinculados aos cuidados com a saúde inúmeras dúvidas com relação a práticas que sejam coerentes com o propósito ético da ciência que representam” (MEDEIROS, 2002, p. 1).

Sobre a postura ética do psicólogo que trabalha em instituições de saúde, é correto afirmar que o psicólogo deve agir

- A) de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, pois o seu cumprimento garante uma postura ética.
- B) com base em suas convicções pessoais, guiado por seus valores e princípios, construídos ao longo de sua formação pessoal e profissional.
- C) de acordo com os princípios da justiça, da beneficência e da autonomia, princípios que regem a atuação de todos os profissionais de saúde.
- D) com base nos princípios éticos específicos a todos os psicólogos da saúde, ou seja, princípios que não priorizem crenças ou valores pessoais.
- E) de forma reflexiva e crítica, tendo como base a inter-relação de fatores constituintes do dilema ético, bem como de recursos morais para a solução dos mesmos.