

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)**

**Questão 01 (Peso 0,50)**

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- ( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- ( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 02 (Peso 0,50)**

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

**Questão 03 (Peso 0,50)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

**Questão 04 (Peso 0,50)**

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

**Questão 05 (Peso 0,50)**

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

**Questão 06 (Peso 0,75)**

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- ( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- ( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

**Questão 07 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- ( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- ( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- ( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 08 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

**Questão 09 (Peso 0,75)**

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

**Questão 10 (Peso 0,75)**

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

**Questão 11 (Peso 0,75)**

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). \_\_\_\_\_ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

**Questão 12 (Peso 0,75)**

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Questão 13 (Peso 0,75)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

**Questão 14 (Peso 0,75)**

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

**Questão 15 (Peso 0,75)**

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar \_\_\_\_\_ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial \_\_\_\_\_ dos casos \_\_\_\_\_ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as \_\_\_\_\_. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)**

**Questão 16 (Peso 0,50)**

As práticas em enfermagem são permeadas por tecnologias. As do tipo leve, por exemplo, são relativas ao cuidado mais próximo do usuário, utilizando a escuta como ferramenta de comunicação e são consagradas por melhores resultados prognósticos.

Considerando as tecnologias leves, \_\_\_\_\_ é a característica mais próxima da humanização do cuidado, sobretudo, na atenção primária em saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) a estrutura física da unidade básica de saúde
- B) o conjunto de equipamentos utilizados pela equipe de enfermagem
- C) o vínculo firmado entre o profissional de enfermagem e os usuários
- D) a Rede de Atenção, composta pela principal porta de entrada – a Estratégia de Saúde da Família,
- E) a integralidade da atenção, um dos princípios do Sistema Único de Saúde, associada ao processo de enfermagem, centrado na clínica e no modelo de cuidado curativista,

**Questão 17 (Peso 0,50)**

Durante a verificação dos sinais vitais, permitida mediante valores registrados em monitor multiparamétrico, em uma enfermaria de clínica médica, o enfermeiro deve \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) calcular a média da temperatura
- B) registrar apenas a pressão arterial para os pacientes hipertensos
- C) zerar a cabeceira do paciente para medir a frequência respiratória, se for uma pessoa em dispneia
- D) atentar para a proximidade entre os valores de pulso e de frequência cardíaca para não haver dúvidas
- E) calcular os valores de pressão da artéria pulmonar, se o paciente não estiver em uso de cateter de pressão arterial invasiva

**Questão 18 (Peso 0,50)**

“Um plano de contingência é essencialmente voltado para ações preventivas, preditivas e reativas. Apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajudará a controlar uma situação de emergência e a minimizar as suas consequências negativas. Ele propõe uma série de procedimentos alternativos ao funcionamento normal de uma organização, sempre que alguma das suas funções usuais se vê prejudicada por uma contingência interna ou externa” (MARTINS, 2017, p. 1). No caso do serviço hospitalar de urgência, algumas inconformidades podem acontecer, sendo agravante o fato de estar cuidando de pessoas com problemas de saúde diversos. O que torna, de todo modo, indispensável o cuidado com as ocorrências de eventuais inconformidades em todo o ambiente hospitalar.

Considerando que o Enfermeiro responsável pela gestão de uma unidade de urgência e emergência hospitalar esteja elaborando um Plano de Contingência para esta unidade, ele deve observar que \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o atendimento pré-hospitalar não gera contingências
- B) a reserva de aparelhos de uso no cuidado é uma prioridade
- C) os recursos humanos de enfermagem não geram contingências
- D) a área administrativa tem baixo impacto na contingência interna
- E) as contingências tecnologias e energia elétrica são menos prioritárias

**Questão 19 (Peso 0,50)**

A falência terapêutica em pessoas com hanseníase é um evento que pode acontecer, em situações específicas. Neste tipo de falência, o paciente não apresenta sinais de melhora clínica durante tratamento regular e adequadamente indicado com doses de medicamentos em tempo correto.

Para o devido controle da hanseníase, se o paciente já estiver em alta do tratamento, a notificação de casos de falência terapêutica deve ser feita utilizando a opção \_\_\_\_\_ como modo de entrada.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) recidiva
- B) resistentes
- C) outros reingressos
- D) incapacitantes medicamentosos
- E) pós-alta por recidiva com resistência terapêutica

**Questão 20 (Peso 0,50)**

Considerando as características das vias comuns de administração de medicamentos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Via intravenosa      ( ) Adequada para administração de veículos oleosos.
- (2) Via subcutânea      ( ) Inadequada para administração de grandes volumes.
- (3) Via intramuscular    ( ) Inadequada para administração de substâncias pouco hidrossolúveis.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2
- B) 1 2 3
- C) 2 1 3
- D) 3 1 2
- E) 3 2 1

**Questão 21 (Peso 0,75)**

“O tratamento diretamente observado constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, porém sem mudanças no esquema terapêutico: o profissional treinado passa observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura” (BRASIL, 2011, p. 28).

Considerando as modalidades de supervisão do tratamento diretamente observado da tuberculose, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os Agentes Comunitários de Saúde não podem fazer tal supervisão.
- ( ) Os horários e os dias são definidos pelos profissionais de saúde na supervisão domiciliar.
- ( ) A supervisão pode ser delegada aos responsáveis legais treinados, nos casos excepcionais.
- ( ) Essa supervisão não pode acontecer em ambiente hospitalar, por conta da transmissão cruzada.

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) F V F F
- D) F F V F
- E) F F F V

**Questão 22 (Peso 0,75)**

“A situação atual apresentada no último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado dia 31/10/2017, ainda apresenta números significativos de casos de sífilis na população. Vários fatores do comportamento sexual dos brasileiros devem ser observados e, apesar das ações governamentais, temos um problema de saúde pública importante e com números que expressam desafios”.

Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/o-desafio-da-sifilis>>. Acesso em: 14 nov. 2017.

Considerando os objetivos do Programa Nacional de DST/AIDS, os desafios para o combate a essa doença, frente ao papel do Estado, estão concentrados \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) em medidas mais eficazes, prioritariamente, nos tratamentos de pessoas com sífilis secundária
- B) na adoção de políticas públicas capazes de atuar nos determinantes sociais de saúde e da doença
- C) na promoção de políticas prioritárias para controle e combate mais eficiente da sífilis, sobretudo, nas classificações secundária e terciária
- D) em atuar estritamente no combate à sífilis congênita, sobretudo, em maternidades públicas, cuja clientela é usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde (SUS)
- E) em ações governamentais nos três níveis: municipal, estadual e federal, fazendo com que as ações planejadas pelos municípios, em nível local, estejam sob as do Ministério da Saúde

**Questão 23 (Peso 0,75)**

O advento das vacinas e o seu aprimoramento com passar dos anos, acompanhada de inovações importantes têm gerado inúmeros benefícios para a humanidade. E o que chama a atenção é o fato de ter, no Brasil, uma procura por vacinas entre as diversas classes sociais, o que tem se configurado como uma política de tendência universalizante no quesito acesso.

Considerando o calendário vacinal do grupo-alvo crianças, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A vacina Rotavírus é administrada, em três doses, com reforço aos nove meses.
- ( ) A vacina BCG é administrada ao nascer e em dose única, e não precisa de reforço.
- ( ) A primeira dose da vacina Hepatite B é administrada ao nascer, com as demais doses aos três e seis meses depois da primeira.
- ( ) As primeiras doses das vacinas pentavalente e influenza são administradas ao nascer, em seguida, são intervaladas a cada dois meses até completar a terceira dose aos seis meses.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V V F V
- C) F F V V
- D) F F F F
- E) F V F F

**Questão 24 (Peso 0,75)**

O Ministério da Saúde anunciou mudança para o esquema vacinal para combate à febre amarela, sendo de fato uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a qual qualifica a nova medida como segura e que protege as pessoas do vírus.

Sobre o esquema vacinal dessa vacina para um adulto não viajante para o exterior, é correto afirmar que

- A) a segunda dose é administrada aos 20 anos.
- B) os reforços são realizados a cada cinco anos.
- C) as doses se assemelhavam às da vacina Hib.
- D) a dose única é a recomendação atualizada neste esquema.
- E) os idosos acima de 65 anos não têm indicação, por causar anafilaxia.

**Questão 25 (Peso 0,75)**

Quando o foco do cuidado é a prevenção de infecções em pessoas submetidas à cirurgia, algumas ações não podem ser negligenciadas, sobretudo, a lavagem das mãos, que é uma estratégia simples, não cara, com grande impacto, sendo, por isto, muito difundida pelos órgãos internacionais e nacionais da área de controle de infecções em serviços de saúde.

Sobre a lavagem das mãos como estratégia para prevenção e controle de infecção hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Deve-se lavar as mãos, obrigatoriamente, antes de tocar no paciente.
- É prescindível lavar as mãos após retirar luvas utilizadas no curativo de ferida operatória.
- É facultado lavar as mãos, quando o profissional for tocar superfícies inanimadas no leito.
- É necessário usar álcool em gel a 98,7% e sabão, simultaneamente, para dar maior segurança ao profissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F F V V
- E) F V F V

**Questão 26 (Peso 0,75)**

A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde pública, em nível global, à medida que diminui a sobrevida e aumenta a mortalidade e a morbidade.

Sobre os objetivos da investigação clínico-laboratorial da HA, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Diagnosticar a hipertensão secundária.
- Dispensar a identificação dos fatores de risco para doenças cardiovasculares.
- Estratificar o risco cardiovascular, exclusivamente, naqueles com acidente vascular.
- Avaliar as lesões de órgãos-alvo (rins, cérebro, coração, etc.) e a presença de doença cardiovascular.
- Recomendar mudanças de hábitos alimentares e do estilo de vida, estritamente, naqueles com suspeita de desenvolver acidente vascular encefálico.
- Ratificar diagnóstico, após mensurar a pressão arterial em momentos de educação em saúde, quais sejam, feiras de saúde, eventos em comunidades, eventos festivos etc.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F V
- B) V V V F V F
- C) V V V V F F
- D) F V V F V V
- E) F F V V F V

**Questão 27 (Peso 0,75)**

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um método que organiza o trabalho profissional da enfermagem, atentando para os aspectos recursos humanos, tecnologias da atenção à saúde e processos assistenciais, tornando possível a operacionalização do cuidado de enfermagem.

Sobre as formas de sistematizar a assistência de enfermagem, é correto afirmar que

- A) os protocolos clínicos não estão contemplados.
- B) a escala diária de enfermagem não requer tal sistematização.
- C) os fluxos instituídos contribuem para o aspecto logístico do cuidado.
- D) a segurança clínica é pouco contemplada, por ser muito relacionada com a conduta interdisciplinar do cuidado.
- E) o cuidado transdisciplinar é o maior desafio, por conta de a enfermagem ser limitada em, por exemplo, prescrever medicamentos e solicitar exames.



**Questão 28 (Peso 0,75)**

“As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares. As pesquisas indicam que esta posição tende a se manter até o ano de 2030”. Sabe-se que o atendimento rápido e preciso pode contribuir para redução do número de complicações e morbidades.

Disponível em: <<http://www.redebrasilavc.org.br/para-profissionais-de-saude/manual-de-rotinas/>>. Acesso em: 17 dez. 2017.

Considerando que o enfermeiro esteja diante de atendimento com vítima acompanhada por cuidadora domiciliar, apresentando confusão mental, crise convulsiva, desvio de rima labial, perda da força e do equilíbrio, os cuidados de enfermagem incluem \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) investigação do último sintoma apresentado
- B) aplicação da escala de coma de Ramsay para ver consciência
- C) verificação da pressão, se iniciar esmolol prescrito pelo médico
- D) acompanhamento da pressão arterial, aceitando a diastólica em até 180 mmHg
- E) início de endarterectomia, por estar em suspeita diagnóstica de estenose carotídea

**Questão 29 (Peso 0,75)**

A resolução COFEN nº 358/2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. Considerando as etapas do processo de enfermagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

Com relação às etapas do Processo de Enfermagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| (1) Avaliação       | ( ) Realização das ações ou intervenções determinadas no planejamento de enfermagem.  |
| (2) Diagnóstico     | ( ) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, que culmina com a tomada de decisão.   |
| (3) Planejamento    | ( ) Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações e intervenções de enfermagem que serão realizadas.   |
| (4) Implementação   | ( ) Verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença.                                    |
| (5) Coleta de dados | ( ) Utiliza-se métodos e técnicas variadas com o objetivo de obter informações sobre a pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde-doença. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 5 3 4
- B) 1 5 4 2 3
- C) 4 3 5 1 2
- D) 4 1 3 5 2
- E) 4 2 3 1 5

**Questão 30 (Peso 0,75)**

As dislipidemias em pessoas portadoras de Diabetes são muito estudadas pelas Sociedades de Endocrinologia e Metabologia e de Cardiologia, que determinam novos parâmetros para o controle dessas doenças, quando há riscos para aquelas cardiovasculares. O risco cardiovascular \_\_\_\_\_, por exemplo, inclui pacientes com diabetes, que não tiveram eventos vasculares ou que não têm doença aterosclerótica avançada, mas que têm evidência de aterosclerose subclínica.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) alto
- B) baixo
- C) muito alto
- D) muito baixo
- E) intermediário

**Questão 31 (Peso 1,00)**

As penicilinas são muito usadas nos tratamentos de diversas doenças, sendo sua apresentação em Unidade Internacionais (UI).

Considerando a situação hipotética em que uma criança tem, prescrito por médico, o uso de 400 UI a cada oito horas, é correto afirmar que

- A) por ser medicamento liofilizado, a diluição deve ser em 10 ml para ser administrado em via subcutânea.
- B) para ampolas com o medicamento liofilizado com 1.000.000 UI, formando 10 ml do composto, o administrado é 4/250 ml por dia.
- C) ao diluir o medicamento em 8 ml de água destilada, considerando ampola com 5.000.000 UI, o administrado é 0,040 ml por dia.
- D) para frascos com o medicamento liofilizado com 1.000.000 UI, formando 10 ml do composto, o administrado é 0,004 ml por dose.
- E) ao diluir o medicamento em 8 ml de água destilada, considerando ampola com 5.000.000 UI, o administrado é 2/225 ml em duas doses.

**Questão 32 (Peso 1,00)**

Em pessoas submetidas à ventilação mecânica invasiva, o uso de tubo oro/nasotraqueal ou uma traqueostomia é indispensável.

Considerando os cuidados de enfermagem para pacientes com tubo orotraqueal, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O tubo seletivo quer dizer que está em via esofágica.
- ( ) A posição incorreta do tubo impede que seja dado banho no momento.
- ( ) A higiene oral é importante para evitar infecções do trato respiratório inferior.
- ( ) Uma forma de saber se o tubo está mal posicionado é fazendo ausculta pulmonar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F V V V

**Questão 33 (Peso 1,00)**

Úlceras por pressão (UPP) causam danos consideráveis aos pacientes, dificultando o processo de recuperação funcional, frequentemente causando dor e levando ao desenvolvimento de infecções graves. Também têm sido associadas às internações prolongadas, à sepse e à mortalidade.

Disponível em: <<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/ulcera-por-pressao>>. Acesso em: 12 nov. 2017.

Sobre o estadiamento das UPP, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Estágio I      ( ) Eritema não branqueável.
- (2) Estágio II     ( ) Perda total da espessura da pele.
- (3) Estágio III    ( ) Perda parcial da espessura da pele.
- (4) Estágio IV    ( ) Perda total da espessura dos tecidos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 4
- B) 2 3 1 4
- C) 3 1 2 4
- D) 4 3 1 2
- E) 4 2 1 3

**Questão 34 (Peso 1,00)**

“A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.” (BRASIL, 2009, p.18).

Sobre as funções da vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) a investigação epidemiológica de campo é um método de trabalho utilizado, exclusivamente, em casos de doenças transmissíveis.
- B) a partir do processamento dos dados, deverá ser realizada a análise dos mesmos, transformando-os em informação capaz de orientar a adoção das medidas de controle.
- C) a coleta de dados deve ocorrer ao nível da atenção básica, sendo que a força e o valor da informação dependem da qualidade e fidedignidade com que a mesma é gerada.
- D) as recomendações para a aplicação de medidas de prevenção e controle devem partir das esferas mais altas do sistema de saúde, considerando ser o SUS uma rede hierarquizada.
- E) a instituição de ações de vigilância epidemiológica não implica, necessariamente, que as informações obtidas venham a ser utilizadas para a adoção de medidas específicas.

**Questão 35 (Peso 1,00)**

“A manutenção da tuberculose como um problema de saúde pública faz com que novas respostas sejam pensadas no sentido de promover a equidade, garantindo o acesso aos pacientes, visando não apenas o seu atendimento e bem-estar, mas, em sentido mais amplo, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em suas diretrizes” (BRASIL, 2011, p. 168).

Dessa forma, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose compreende diversas estratégias, visando garantir a integralidade da atenção, através de ações que envolvem as três esferas de governo.

Em relação à linha de cuidado em tuberculose pulmonar, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Prevê o fornecimento gratuito e ininterrupto de medicação específica.
- ( ) É dever do laboratório municipal garantir a realização de baciloscopia, visando o diagnóstico e o acompanhamento dos casos.
- ( ) Privilegia a centralização das medidas de controle para a gestão estadual, por se tratar de um grave problema de saúde pública.
- ( ) A pessoa com tuberculose pode apresentar-se em qualquer unidade de saúde, mesmo em unidades que não incluam, em sua rotina de atendimento, pacientes com a doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V F F

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)**

**Questão 36 (Peso 1,00)**

“O impacto das condições e estilos de vida na saúde das populações é um tema muito discutido atualmente. Os determinantes sociais em saúde têm estado no centro deste debate” (ASSIS et al, 2009. p. 93).

Em relação aos determinantes sociais de problemas de saúde da população infantil, é correto afirmar que

- A) atributos familiares, escolares, comunitários e do cenário sociopolítico em que vive a criança e sua família são fatores secundários nesse contexto.
- B) baixo estrato socioeconômico familiar e precário nível de escolaridade dos pais são determinantes sociais que influenciam negativamente na saúde infantil.
- C) os determinantes sociais ocupam uma função secundária durante a infância, a despeito da vulnerabilidade e da dependência observadas nesta fase da vida.
- D) os determinantes sociais de saúde da população infantil englobam temas como desnutrição e baixo peso ao nascer, mas não se relacionam a problemas perinatais graves.
- E) os determinantes sociais relacionados à população infantil desconsideram como fatores responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento infantil aqueles que perpassam os período pré-natal e perinatal.

**Questão 37 (Peso 1,00)**

“As desigualdades na organização da sociedade implicam que a liberdade para gozar de uma vida próspera e de boa saúde esteja distribuída de forma desigual dentro e entre sociedades. Essa desigualdade pode ser constatada nas condições vigentes na primeira infância e idade escolar [...]” (CARVALHO, 2013. p. 24).

Sobre a influência dos determinantes sociais de saúde relacionados à população infantil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O desenvolvimento na primeira infância não tem influência nas possibilidades subsequentes da vida e saúde do indivíduo.
- ( ) Os programas de educação pré-escolar e as escolas podem ter um papel vital na construção das capacidades das crianças.
- ( ) A primeira infância é afetada de forma direta pelos riscos de obesidade, má nutrição, transtornos mentais, doenças cardiovasculares e criminalidade.
- ( ) A qualidade de vida na infância não demanda, necessariamente, ações intersetoriais, visto que o setor saúde é o principal responsável pelas ações que promovem o bem-estar das crianças.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

**Questão 38 (Peso 1,00)**

A Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2015).

\_\_\_\_\_, dentre outras, são diretrizes da PNAISC que devem ser observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltadas para crianças.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Acesso universal à saúde e intersetorialidade
- B) Promoção da saúde e humanização da atenção
- C) Equidade em saúde e monitoramento e avaliação
- D) Integralidade do cuidado e organização das ações e serviços na rede de atenção
- E) Gestão interfederativa das ações de saúde da criança e qualificação da força de trabalho do SUS

**Questão 39 (Peso 1,00)**

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, sendo resultado de uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (BRASIL, 2009).

Sobre o PSE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Promover a saúde e a cultura de paz é um dos objetivos do PSE.
- As políticas de saúde consideram o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde.
- A avaliação da saúde bucal e a atualização do calendário vacinal não são ações previstas pelo PSE, visto que tais ações demandam equipamentos específicos para sua realização.
- Os profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família não participam diretamente das ações previstas no PSE, cujas ações são assumidas pelas Equipes de Saúde da Família.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F F F V
- E) F V F V

**Questão 40 (Peso 1,00)**

“Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto e, posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser pactuada com a família a partir das necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de proteção” (BRASIL, 2012, p. 35).

Em relação às visitas domiciliares como estratégia de promoção da saúde de crianças no contexto da atenção primária, é correto afirmar que

- A) a primeira visita domiciliar feita ao recém-nascido e à puérpera deve ser realizada pelo Agente Comunitário de Saúde.
- B) em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança.
- C) a orientação à família sobre os cuidados com o bebê deve ser feita na Unidade de Saúde, onde a equipe dispõe dos recursos necessário para este fim.
- D) caso a criança tenha bom estado de saúde, os profissionais devem optar pelo acompanhamento ambulatorial da criança, após a primeira semana de vida.
- E) a identificação de sinais de depressão puerperal não pode ser realizada pela equipe de saúde da família durante a visita, pois tal situação exige diagnóstico especializado.

**Questão 41 (Peso 1,00)**

“Prevenir violência significa antecipar, intervir precocemente, evitar ou tornar impossível que o fenômeno aconteça ou se repita. Para lidar com a prevenção de violências e a promoção da saúde é preciso acreditar que prevenir é possível e crer no potencial de transformação” (BRASIL, 2015, p. 213).

Considerando o papel do profissional de saúde na prevenção da violência contra crianças, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- No caso de violência escolar, não deve haver interferência da equipe de saúde, já que tais atribuições não estão previstas no seu escopo de ações.
- No primeiro ano de vida da criança, é fundamental que, a cada consulta ou visita, seja feito um reforço do vínculo afetivo da criança com os pais e os cuidadores.
- O afeto fortalecido, o acompanhamento do bebê já no pré-natal, e o acompanhamento da saúde materno-infantil pelos profissionais de saúde são recursos protetores.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V F F

**Questão 42 (Peso 1,00)**

Ao longo dos anos, “o SUS aumentou a extensão e importância política e econômica de serviços e programas na área da saúde. [...] Ao desdobrar-se e operacionalizar-se em numerosas ações e iniciativas, torna-se alvo constante de questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade. Dessa forma, surge a necessidade da avaliação, como um dos instrumentos na busca por respostas” (FURTADO, 2015, p. 774).

Sobre a avaliação de programas e sistemas de saúde, é correto afirmar que

- A) a avaliação de programas e serviços de saúde tem ação direta sobre as instituições, mas não atua sobre a constituição de sujeitos e coletivos.
- B) para garantir validade ao processo de avaliação de um programa ou sistema de saúde, o método deve priorizar as abordagens quantitativas.
- C) o campo da avaliação em saúde no Brasil possui tipologia definida pelo Ministério da Saúde, que descentraliza o método a ser replicado em estados e municípios.
- D) a função primordial da avaliação de programas e serviços, assim como da área do planejamento em saúde, é produzir saúde, contribuindo para a tomada de decisão.
- E) para que tenha validade, a avaliação de um programa ou sistema de saúde preconiza a neutralidade e, portanto, deve adotar metodologias específicas e padronizadas.

**Questão 43 (Peso 1,00)**

A avaliação de programas e serviços de saúde compreende uma série de ações e procedimentos. É essencial que tais ações sigam um roteiro claro e consistente, sendo amplo o necessário para comportar os mais diferentes referenciais, concepções e propostas metodológicas. Dessa forma, se garante legitimidade ao processo avaliativo (FURTADO, 2015, p. 781).

Considerando a sequência correta para se realizar um processo avaliativo, numere em ordem cronológica de 1 a 7 as etapas a seguir:

- ( ) utilizar os resultados
- ( ) descrever o programa
- ( ) comunicar os resultados
- ( ) coletar e analisar os dados
- ( ) definir as questões da avaliação
- ( ) identificar os grupos de interesse
- ( ) definir os propósitos da avaliação

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 7 2 5 4 6
- B) 3 6 7 5 2 4 1
- C) 5 2 4 1 6 3 2
- D) 7 3 6 5 4 1 2
- E) 7 1 6 2 3 4 5

**Questão 44 (Peso 1,00)**

“Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, conforme fluxo estabelecido em cada município. [...] Os casos suspeitos devem ser notificados e registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN).” (BRASIL, 2017, p. 59).

Em relação às ações de vigilância epidemiológica no acompanhamento dos casos de Chikungunya no Brasil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A febre de Chikungunya se constitui em agravo de Notificação Compulsória.
- ( ) Os óbitos suspeitos são de notificação imediata e devem ser comunicados pelo profissional à Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas.
- ( ) Os casos que evoluem para a fase crônica da doença não necessitam de acompanhamento em longo prazo, considerando que estão fora do risco de morte.
- ( ) Ao realizar a notificação de Chikungunya pelos canais de comunicação disponíveis, o profissional e o serviço de saúde ficam isentos de realizar o registro SINAN.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 45 (Peso 1,00)**

As decisões clínicas, sociais ou mesmo políticas relacionadas com a saúde das populações devem ser baseadas numa investigação científica rigorosa, de modo a maximizar os benefícios e minimizar os custos e agravos. Dessa forma, os estudos epidemiológicos assumem papel primordial na caracterização e definição do problema, bem como na tomada de decisões (LOPES, 2013, p. 140).

Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Os estudos de coorte são considerados retrospectivos, buscando a comparação entre um grupo que apresenta o desfecho de interesse e outro que não apresenta tal desfecho.
- Os estudos de caso-controle são considerados estudos longitudinais, nos quais um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma população é acompanhado durante certo período.
- Os estudos ecológicos são chamados de estudos agregados e diferem de outros delineamentos por ter a unidade de análise representada por grupos e não por indivíduos.
- Os estudos transversais permitem que, a partir de dados de uma amostra extraída num dado momento de uma população bem delimitada, seja possível estabelecer um perfil clínico de interesse, delimitando parâmetros e construindo hipóteses.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F F V F

**Questão 46 (Peso 1,00)**

“As medidas de saúde coletiva contemplam duas categorias de índices: os índices de prevalência que descrevem o que existe numa população [...] e as medidas de incidência, que descrevem o que ocorre nessa população” (LIMA et al, 2013. p. 29).

Em relação aos tipos de medidas em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- As taxas são medidas secundárias geradas pelo quociente entre medidas primárias de variáveis independentes.
- Os índices de prevalência detalham a situação da saúde, ao passo que as medidas de incidência detalham as condições e a qualidade de vida.
- Os coeficientes são medidas de risco aplicadas a cálculos de estimativas e projeções de incidência e prevalência em populações de interesse.
- Índice é um termo genérico e apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde, incluindo todos os termos numéricos que trazem a noção de grandezas existentes e incidentes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V
- B) F F V V
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V V V F

**Questão 47 (Peso 1,00)**

“As investigações epidemiológicas têm por objetivo fornecer medidas precisas da ocorrência das doenças [...]. No entanto, há muitas possibilidades de erro nessas medidas. Os epidemiologistas têm tentado minimizar esses erros e estimar os impactos daqueles que não podem ser eliminados.” (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖ, 2010. p. 52).

Em relação aos erros que podem ocorrer nas investigações epidemiológicas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O erro aleatório ocorre quando o valor medido na amostra do estudo diverge do verdadeiro valor da população, devido ao acaso.
- ( ) Pode-se afirmar que um estudo com um pequeno erro sistemático tem alta precisão, já que esta não é afetada pelo tamanho da amostra.
- ( ) O erro de amostragem decorre, geralmente, da falta de representatividade da amostra, que não contempla toda a variabilidade da população.
- ( ) O viés de seleção ocorre quando as características das pessoas selecionadas para o estudo são idênticas em relação àquelas que não foram selecionadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F F
- E) F F F V

**Questão 48 (Peso 1,00)**

“As políticas públicas de saúde correspondem a todas as ações de governo que regulam e organizam as funções públicas do Estado para o ordenamento setorial” (WARGAS, 2004. p. 11).

Sobre os objetivos, princípios e diretrizes constitucionais que orientam o processo de formulação de políticas de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A rede de ações e serviços tem caráter regionalizado e hierarquizado, primando pela centralização político-administrativa.
- ( ) A participação da comunidade assume papel secundário na formulação de políticas de saúde, na medida em que cabe ao Estado esta função.
- ( ) A Constituição estabelece que compete ao poder público organizar sua atuação nas áreas de saúde, previdência e assistência social no âmbito da Seguridade Social.
- ( ) As ações e serviços de saúde executados por instituições privadas não estão sujeitas à fiscalização e ao controle do poder público por possuírem regulamentação própria.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F
- B) F V F V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V



**Questão 49 (Peso 1,00)**

A vigilância epidemiológica exerce papel fundamental no acompanhamento dos casos relacionados à infecção pelo vírus Zika, incluindo a tomada de decisão por parte dos gestores e o planejamento adequado das ações de intervenção.

Em relação à notificação dos casos de infecção pelo vírus Zika, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Todo recém-nascido com desproporção craniofacial deve ser notificado como caso suspeito de síndrome congênita em até 48 horas de vida.
- ( ) A partir da oitava semana de gestação até o nascimento, deve ser notificado todo feto que tenha exame de imagem com presença de calcificações cerebrais.
- ( ) Caso haja um evento de aborto espontâneo até a 22ª semana de gestação, é dispensável a notificação do caso como óbito suspeito de síndrome congênita.
- ( ) Todo óbito neonatal precoce, ocorrido até o sétimo dia de vida, deve ser notificado como óbito suspeito de síndrome congênita, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F F V
- C) F V V F
- D) V F V F
- E) V V F V

**Questão 50 (Peso 1,00)**

A dengue é uma doença viral aguda e de rápida disseminação. A notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença na área, e a curva endêmica (BRASIL, 2009, p. 45).

Em relação à atuação e ao acompanhamento dos casos de Dengue por parte da vigilância epidemiológica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Considerando um período não epidêmico, os casos suspeitos e não confirmados deixam de ser de notificação compulsória.
- ( ) As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de dengue e, também, fontes de dados para os serviços de vigilância.
- ( ) A Dengue é um agravo de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos devem ser notificados obrigatoriamente, mesmo aqueles não confirmados.
- ( ) Recomenda-se o período de outubro a maio para intensificação deste monitoramento, pois, de maneira geral no país, corresponde ao intervalo da sazonalidade de transmissão da doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) F V V V
- E) F V F V