

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

Na pesquisa das medidas de imitância acústica, a ausência do reflexo acústico estapediano contralateral e a presença do ipsilateral, bilateralmente, é encontrada em casos de

- A) simulação.
- B) perda auditiva coclear.
- C) paralisia do nervo facial.
- D) perda auditiva condutiva.
- E) distúrbios do tronco encefálico.

Questão 17 (Peso 0,50)

Em relação aos testes comportamentais para avaliação do processamento auditivo, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A lateralidade do indivíduo não influencia os resultados dos testes comportamentais.
- () Aspectos linguísticos cognitivos, como a memória e atenção, podem influenciar os resultados dos testes comportamentais.
- () A maturação do sistema nervoso central deve ser considerada para a interpretação dos resultados dos testes comportamentais.
- () A vantagem da orelha direita sobre a esquerda, observada em testes comportamentais, sugere alteração do processamento auditivo.
- () Para a avaliação do processamento auditivo, o fonoaudiólogo deve utilizar diferentes testes comportamentais com o intuito de avaliar as diversas habilidades auditivas e estruturas do sistema auditivo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F V V V F
- C) F F V F V
- D) V F V V F
- E) V V V F F

Questão 18 (Peso 0,50)

Sobre a anatomofisiologia da linguagem, é correto afirmar que

- A) na maioria das pessoas, as áreas da linguagem estão localizadas no hemisfério cerebral direito.
- B) o lobo frontal, especializado nas funções de linguagem, é o mais anterior, limitando-se com o temporal pelo sulco central e com o parietal pelo sulco lateral.
- C) a área de broca ocupa uma região do giro frontal superior, imediatamente em frente à área do controle cortical motor, responsável pelos órgãos periféricos da fala.
- D) a área motora da fala se localiza em regiões mais anteriores, com grande participação da região frontal, e a área sensorial em regiões mais posteriores, com atuação importante de regiões occipitais.
- E) para que a função da linguagem se realize de forma plena, faz-se necessário a integridade das áreas receptivas primárias do lobo temporal, parietal e occipital e as áreas pré-motoras, motora primária e a área de broca no hemisfério dominante.

Questão 19 (Peso 0,50)

Considerando o sistema de classificação das disfonias, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| (1) Disfonias orgânicas | () Nódulos vocais |
| (2) Disfonias organofuncionais | () Cistos saculares |
| (3) Disfonias funcionais primárias | () Inaptações vocais |
| (4) Disfonias funcionais secundárias | () Úlcera de contato |
| | () Uso incorreto da voz |
| | () Alterações psicogênicas |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 2 4 4
- B) 1 3 4 2 3 4
- C) 2 1 2 4 3 4
- D) 2 1 4 2 3 4
- E) 3 1 2 4 2 4

Questão 20 (Peso 0,50)

Sobre o desenvolvimento normal das funções estomatognáticas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A mastigação habitual, no ser humano, é bilateral simultânea. Assim, a mastigação unilateral pode ser considerada um processo anormal.
- () A deglutição, função que envia o bolo ou saliva da cavidade oral para a faringe e desta para o estômago, tem início na fase intrauterina.
- () Ao nascimento, a criança apresenta uma protrusão mandibular fisiológica que, com a amamentação, vai sendo corrigida, promovendo o correto posicionamento desta estrutura.
- () No padrão inicial normal de sucção, do nascimento aos seis meses de idade, os movimentos da língua ocorrem, predominantemente, para frente e para trás, simultâneos aos movimentos da mandíbula.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) F V F F
- D) V V F F
- E) V F V F

Questão 21 (Peso 0,75)

A tuba auditiva ou trompa de Eustáquio se estende da parede _____ da cavidade timpânica à _____. Normalmente, a porção cartilaginosa da tuba auditiva encontra-se _____ e _____ temporariamente, através da contração dos músculos tensor e levantador do véu palatino e do músculo salpingofaríngeo, com o intuito de equalizar a pressão do ar externo com a pressão do ar na orelha média.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) anterior / laringe / aberta / fecha-se
- B) anterior / laringe / colabada / abre-se
- C) anterior / faringe / colabada / abre-se
- D) posterior / faringe / colabada / abre-se
- E) posterior / laringe / colabada / fecha-se

Questão 22 (Peso 0,75)

Sobre os distúrbios da fala e linguagem, analise as assertivas a seguir.

De modo geral, o distúrbio fonológico é mais observado em meninos e o diagnóstico é feito, preferencialmente, entre quatro e oito anos

PORQUE

as crianças com distúrbio de fala e de linguagem possuem mais familiares com estas alterações do que as crianças sem queixas.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 23 (Peso 0,75)

O paciente com doença do refluxo gastroesofágico pode apresentar manifestações esofágicas e laringofaríngeas. As manifestações vocais mais comuns, nestes casos, incluem:

- A) rouquidão, fadiga vocal e quebras de sonoridade.
- B) soprosidade e quebras de sonoridade.
- C) soprosidade e fadiga vocal.
- D) aspereza e bitonalidade.
- E) astenia e bitonalidade.

Questão 24 (Peso 0,75)

Sobre a anatomia e a fisiologia relacionada à motricidade orofacial, é correto afirmar que

- A) a mastigação se inicia com a incisão, na qual o alimento é apreendido entre as bordas dos dentes incisivos, pela protrusão e abaixamento da mandíbula.
- B) a protrusão da mandíbula é realizada pela ação conjunta dos músculos pterigoideos laterais, pterigoideos mediais e feixes anteriores do músculo temporal.
- C) a mastigação inclui movimentos de lateralidade mandibular, realizados pelo músculo pterigoideo lateral, direcionando a mandíbula para o mesmo lado da contração.
- D) a fase esofágica da deglutição é inconsciente e involuntária e consiste na transferência do bolo alimentar da faringe para o esôfago por meio dos movimentos peristálticos.
- E) a fase oral preparatória da deglutição é inconsciente e voluntária e inicia-se com a apreensão dos alimentos. Durante essa fase, o bolo alimentar é misturado com a saliva e transformado em bolo homogêneo para que possa ser deglutido.

Questão 25 (Peso 0,75)

Sobre a reabilitação do paciente com paralisia facial periférica, é correto afirmar que

- A) o paciente com este tipo de acometimento passa por três fases: a fase flácida, a fase de desnervação e a fase de reinervação, a qual pode ser acompanhada de sequelas.
- B) o trabalho miofuncional, na fase de desnervação, tem como objetivos diminuir a contratura, melhorar a harmonia e simetria facial, aumentando a amplitude dos movimentos, e controlar as sincinesias.
- C) os exercícios isotônicos envolvem modificação da fibra muscular e são indicados para estimular a oxigenação muscular, a coordenação da musculatura e o aumento da amplitude dos movimentos.
- D) as sincinesias são movimentos associados, que ocorrem entre músculos originalmente independentes, do lado oposto ao afetado pela paralisia, como consequência dos desvios das fibras durante o crescimento axonal.
- E) os exercícios isométricos, geralmente recomendados na fase inicial da paralisia facial, são aqueles em que se desenvolve tensão com modificação do tamanho da fibra muscular, e são indicados para aumentar o tônus da musculatura.

Questão 26 (Peso 0,75)

A fissura labiopalatina (FLP) e a disfunção velofaríngea congênita estão associadas a várias alterações do processo alimentar. Considerando a intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos com FLP, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A postura para a alimentação deverá ser vertical para impedir o refluxo nasal e aspiração broncopulmonar.
- () Cabe ao fonoaudiólogo, a indicação e adaptação da placa de acrílico com o objetivo de separar as cavidades oral e nasal no processo alimentar.
- () O primeiro problema que o bebê com FLP enfrenta durante a amamentação é a dificuldade ou a impossibilidade de gerar pressão intraoral negativa.

A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F F V
- E) F V F

Questão 27 (Peso 0,75)

As disfonias funcionais primárias se beneficiam de abordagens terapêuticas, que favoreçam uma emissão equilibrada, como as técnicas do método de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) fala
- B) ativação vocal
- C) sons facilitadores
- D) competência glótica
- E) órgãos fonoarticulatórios

Questão 28 (Peso 0,75)

A dispraxia da fala é uma desordem da articulação que resulta da perda da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas. Sobre as principais características observadas em pacientes dispráxicos, é correto afirmar que

- A) a performance na fala espontânea é pior do que na repetição.
- B) geralmente, há discrepância entre a performance na fala automática e na fala espontânea, sendo a segunda mais prejudicada.
- C) a dificuldade de fala é acompanhada de fraqueza e lentidão significantes ou incoordenação da musculatura da fala nos movimentos reflexos ou automáticos.
- D) os erros articulatórios aumentam na mesma proporção que aumenta a complexidade articulatória. Assim, as consoantes são articuladas mais facilmente do que as vogais.
- E) os erros articulatórios aumentam de acordo com a complexidade do ajuste motor que a articulação exige, porém, zona e modo de articulação não interferem na produção da fala.

Questão 29 (Peso 0,75)

“A reabilitação das disfagias orofaríngeas envolve a modificação da fisiologia da deglutição, podendo ser necessária a utilização de estratégias compensatórias para redirecionar e melhorar a deglutição, evitando assim, a ocorrência de aspirações traqueais” (LOGEMANN, 1997).

Sobre as manobras posturais utilizadas para facilitar a eficiência e segurança da passagem do bolo alimentar da cavidade oral para a faringe e o esôfago, é correto afirmar que

- A) na manobra supraglótica, os pacientes são orientados a prender a respiração, deglutir e tossir.
- B) a rotação de cabeça para o lado melhor é indicada para pacientes que apresentam alterações musculares unilaterais.
- C) inclinar a cabeça para o lado com maior comprometimento direciona o bolo alimentar para o melhor lado pela ação da gravidade.
- D) a manobra de queixo para baixo é indicada para indivíduos com atraso na fase faríngea da deglutição e com fechamento laríngeo reduzido.
- E) a manobra de cabeça para o lado facilita o trânsito oral pela ação da gravidade e é indicada para pacientes que demonstram dificuldades em ejetar o bolo da cavidade oral para a faringe.

Questão 30 (Peso 0,75)

A teoria _____ considera que a produção da voz é um fenômeno resultante da elasticidade dos músculos laríngeos combinado com a força aerodinâmica da respiração.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) mioelástica
- B) aerodinâmica
- C) neurocilatória
- D) neurocronáxica
- E) mioelástica-aerodinâmica

Questão 31 (Peso 1,00)

Sobre o treinamento auditivo acusticamente controlado nos transtornos de processamento auditivo, é correto afirmar que

- A) os mesmos testes comportamentais empregados na avaliação do processamento auditivo devem ser utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado.
- B) os testes comportamentais utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado não devem ser empregados para avaliar a evolução da habilidade auditiva durante o processo de reabilitação.
- C) a reavaliação das habilidades auditivas deve ser realizada após cada sessão de treinamento auditivo acusticamente controlado e utilizar os mesmos procedimentos selecionados para a avaliação inicial do processamento auditivo.
- D) o treinamento auditivo acusticamente controlado é realizado em cabina acústica e consiste no treino das habilidades auditivas alteradas, através da aplicação repetida dos mesmos testes comportamentais utilizados na avaliação do processamento auditivo.
- E) no treinamento auditivo acusticamente controlado, deve-se utilizar todos os testes comportamentais disponíveis para a avaliação do processamento auditivo com o intuito de desenvolver as habilidades auditivas prejudicadas e aprimorar aquelas não identificadas como alteradas no processo de diagnóstico.

Questão 32 (Peso 1,00)

Sobre o implante coclear, analise as assertivas a seguir.

Os sistemas de frequência modulada (FM) são indicados para crianças usuárias de implante coclear, principalmente, em situações de aprendizagem

PORQUE

os sistemas FM possibilitam uma melhor percepção da fala em ambientes acusticamente desfavoráveis.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 33 (Peso 1,00)

Sobre o diagnóstico diferencial, analise as assertivas a seguir.

A identificação e o diagnóstico de Distúrbios Específico de Linguagem (DEL) vêm sendo realizados muito mais por critérios de exclusão

PORQUE

os indivíduos com DEL apresentam manifestações de linguagem heterogêneas, podendo, inclusive, variar na mesma criança.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 34 (Peso 1,00)

A encefalopatia crônica infantil não evolutiva (ECINE) é o termo utilizado para designar uma alteração neurológica causada por uma lesão permanente, que ocorre no cérebro em fase de desenvolvimento. Nos pacientes com ECINE, é possível observar manifestações consideradas de risco para alterações da deglutição.

Considerando as dificuldades esperadas para cada fase da deglutição nestes pacientes, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A fase faríngea da deglutição é iniciada de forma precoce pela diminuição da sensibilidade da faringe e dificuldade na programação motora.
- () Na fase oral da deglutição, ocorre incapacidade de controlar o alimento na boca, culminando em escape extraoral e dificuldade de vedamento labial.
- () O padrão de extensão cervical, característico de indivíduos com ECINE, pode dificultar o movimento adequado de elevação laríngea, favorecendo a aspiração traqueal durante a deglutição.
- () Na fase preparatória oral da deglutição, ocorre perda de reflexos orais, dificuldade na movimentação das partes anterior e dorsal da língua, com pobre amplitude lateral desta, e perda prematura do alimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) V V F F
- E) F F V V

Questão 35 (Peso 1,00)

O parâmetro acústico de medidas de frequência fundamental corresponde ao número de ciclos glóticos por segundos, e os valores normais para homens são de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) 80 a 150 Hz
- B) 50 a 150 Hz
- C) 150 a 200 Hz
- D) 150 a 250 Hz
- E) acima de 250 Hz

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

De acordo com as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva do Ministério da Saúde (2012), os neonatos ou lactentes com malformação de orelha, mesmo que unilateral, devem ser _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) encaminhados para diagnóstico otorrinolaringológico e audiológico diretamente
- B) encaminhados para reabilitação auditiva diretamente
- C) triados com Potencial Evocado de Tronco Encefálico e, em caso de falha, realizar o resteste em 15 dias
- D) triados com Emissões Otoacústicas Evocadas e, em casos de falha, realizar o resteste em 15 dias
- E) triados com Emissões Otoacústicas Evocadas e, em casos de falha, realizar o resteste com Potencial Evocado de Tronco Encefálico

Questão 37 (Peso 1,00)

Sobre o monitoramento de neonatos e lactentes com indicador de risco para deficiência auditiva (IRDA), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Todas as crianças com IRDA que passaram na triagem auditiva devem realizar monitoramento auditivo com avaliação audiológica na atenção especializada.
- () Os neonatos e lactentes com IRDA que falham na triagem auditiva devem realizar o monitoramento do desenvolvimento da audição e da linguagem na Atenção Básica.
- () Os neonatos e lactentes identificados com perda auditiva condutiva na avaliação audiológica realizada na atenção especializada devem ser encaminhados para os centros de reabilitação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) V F F
- D) F V F
- E) F V V

Questão 38 (Peso 1,00)

O recém-nascido a termo saudável apresenta reflexos neurológicos orofaríngeos multissinápticos já nas primeiras horas após o nascimento. Sobre os reflexos neurológicos fundamentais para a alimentação, é correto afirmar que

- A) no momento do nascimento, o reflexo de sucção é o único reflexo presente.
- B) a persistência dos reflexos além da idade esperada não representa prejuízos a atividades específicas como respiração e alimentação.
- C) o reflexo de tosse é menos efetivo do que o reflexo de gag, uma vez que a alimentação, nesta faixa etária, se constitui, exclusivamente, de líquidos.
- D) ao nascer, devem estar presentes os automatismos orais de busca, sucção, deglutição, mordida e o reflexo de gag.
- E) por volta dos 12 meses, a criança substitui os automatismos orais por respostas voluntárias em todas as fases da deglutição.

Questão 42 (Peso 1,00)

A nutrição enteral, intermitente ou contínua, através de sonda naso ou orogástrica, é indicada para recém-nascidos com _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) diarreia intratável
- B) obstrução intestinal
- C) hemorragias gastrointestinais
- D) cardiopatias congênitas graves
- E) incoordenação sucção-deglutição

Questão 43 (Peso 1,00)

Considerando o sistema gastrintestinal e seus desvios em neonatologia, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os hormônios gastrointestinais, liberados durante a sucção não nutritiva, estimulam o crescimento e maturação gastrintestinal em bebês prematuros.
- () O aleitamento misto pode não ser bem aceito pela mucosa intestinal em bebês prematuros, aumentando as chances de patologias mais sérias do sistema gastrintestinal.
- () Os bebês prematuros apresentam com frequência quadro de disfunção gastrintestinal decorrente do reduzido nível dos hormônios gastrina e somatostatina e conseqüente inibição da secreção gástrica e da mobilidade do sistema gastrintestinal.

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) V F F
- D) F V F
- E) F V V

Questão 44 (Peso 1,00)

O fonoaudiólogo que atua em ambiente hospitalar, sobretudo em unidade de terapia intensiva neonatal, deve adotar medidas de segurança extremamente rigorosas, uma vez que, os recém-nascidos (RN) têm mais suscetibilidade em adquirir infecções, tendo em vista fatores inerentes a própria imaturidade anatomofisiológica.

Sobre as medidas de prevenção e controle de infecção, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A transmissão por contato indireto ocorre por processamento inadequado de artigos e equipamentos, contaminação pelas mãos da equipe, de materiais, soluções e de substâncias para uso tópico.
- () Jaleco, gorro, máscara, luvas e óculos de proteção são equipamentos recomendados para todos os profissionais da área da saúde e, portanto, podem ser denominados de equipamentos de proteção coletiva.
- () A higienização das mãos é um dos principais meios de controle de processos infecciosos. Em situações em que o número de pias é insuficiente para realização da higienização, entre procedimentos em um mesmo paciente, é possível a utilização de álcool gel.
- () Para que ocorra uma infecção é necessário o contato com microrganismos patogênicos, um meio de transmissão e um hospedeiro. Logo, a transmissão por contato direto, ou seja, transmissão física de microrganismos é o único meio de transmissão de infecção que o fonoaudiólogo está exposto.
- () A imunização dos profissionais da área da saúde, a higienização das mãos, o uso de equipamentos de proteção individual, o manejo adequado de resíduos de serviços de saúde - descarte de perfurocortantes, o processamento de superfícies e o processamento de artigos - são consideradas medidas de precaução padrão.

A alternativa que contém a seqüência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F F
- B) V F V F V
- C) V F F V V
- D) F F V F V
- E) F F V V V

Questão 45 (Peso 1,00)

Em relação à lesão cerebral hipóxico-isquêmica em neonatos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os neonatos que sofrem lesão cerebral hipóxico-isquêmica mais cedo na gestação podem ser assintomáticos durante o período neonatal.
- () A lesão cerebral hipóxico-isquêmica resulta de uma hipoxemia ou isquemia, associada a um comprometimento da autoregulação cerebrovascular.
- () Os recém-nascidos a termo que sofrem lesão cerebral hipóxico-isquêmica intraparto suficiente para acarretar sequelas a longo prazo sempre demonstram evidências clínicas de encefalopatia aguda.
- () A localização e a extensão da lesão cerebral hipóxico-isquêmica perinatal são determinadas, principalmente, pela maturidade do cérebro e pela época, intensidade e duração do insulto hipóxico-isquêmico.
- () A encefalopatia leve decorrente da lesão cerebral hipóxico-isquêmica manifesta-se por letargia, estupor, hipotonia, movimentos espontâneos reduzidos, reflexos tendíneos abolidos e, em alguns casos, convulsões.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F F
- B) V F V V F
- C) V F F F V
- D) F F V F V
- E) F F V V F

Questão 46 (Peso 1,00)

Sobre o sistema cardiorrespiratório e seus desvios em neonatologia, analise as assertivas a seguir.

A Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico é uma cardiopatia cuja taxa de mortalidade, sem cirurgia, é de 98% até um ano de idade

PORQUE

o recém-nascido com Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico se torna sintomático apenas com um mês de vida, apresentando-se cinza-pálido com hipoperfusão periférica e, todos os pulsos fracos.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- C) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 47 (Peso 1,00)

A síndrome de angústia respiratória (SAR), antigamente conhecida como doença da membrana hialina, é uma causa comum de morbidade e mortalidade associada ao parto prematuro. Sobre a SAR, é correto afirmar que

- A) os padrões radiográficos na SAR são variáveis e refletem, com precisão, o grau de comprometimento respiratório.
- B) a evolução clínica depende da gravidade da SAR e não apresenta relação com o tamanho e maturidade do recém-nascido.
- C) os recém-nascidos com SAR apresentam, ao nascimento ou nas primeiras horas após o nascimento, sinais clínicos de dificuldade respiratória, como taquipnéia, gemência, retrações e cianose.
- D) o ruído de gemência típico de SAR é decorrente da tentativa do recém-nascido em manter o volume alveolar através do prolongamento da expiração e redução das pressões expiratórias exaladas contra a glote parcialmente fechada.
- E) na SAR não complicada, tipicamente encontrada em neonatos menos maduros, a recuperação se dá ao longo de vários dias, e, em geral, os bebês não precisam mais de oxigenioterapia ou suporte ventilatório após a primeira semana de vida.

Questão 48 (Peso 1,00)

Sobre o diagnóstico das doenças neuromusculares em neonatos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As doenças neuromusculares decorrem de disfunção do sistema motor em um nível entre o córtex motor e os músculos.
- () A maioria das doenças neuromusculares é hereditária e algumas podem ser assintomáticas no período neonatal.
- () As velocidades de condução nervosa e a eletromiografia podem estabelecer o nível de envolvimento do sistema motor e são técnicas muito utilizadas em neonatos, devido a fácil execução e interpretação dos dados nesta população.
- () Os exames laboratoriais não devem ser utilizados como triagem em recém-nascidos com doença neuromuscular, porque os níveis séricos de creatinofosfoquinase podem estar aumentados até dez vezes após um parto vaginal normal.
- () As técnicas de genética molecular contribuem para o diagnóstico das doenças neuromusculares e, portanto, os exames genéticos devem ser solicitados para todos os neonatos com suspeita de doenças neuromusculares, independente da avaliação clínica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V F
- B) V V V F F
- C) V V V V F
- D) F F V F V
- E) F F V V V

Questão 49 (Peso 1,00)

A capacidade de sugar e deglutir uma refeição de maneira coordenada e, então, processar os nutrientes para utilização corporal é uma das tarefas do desenvolvimento mais _____enfrentadas pelo neonato. O sucesso depende de um certo grau de maturidade neurológica, digestiva, absorviva e metabólica. O recém-nascido _____ é bastante maduro nesses aspectos. Contudo, a fisiologia do _____ é progressivamente mais _____à medida que a idade gestacional diminui.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) simples / a termo / pré-termo / madura
- B) simples / pré-termo / a termo / madura
- C) complexas / a termo / pré-termo / madura
- D) complexas / a termo / pré-termo / imatura
- E) complexas / pré-termo / a termo / imatura

Questão 50 (Peso 1,00)

Sobre a tomada de decisões em fonoaudiologia neonatal, analise as assertivas a seguir.

Não é rotina, na maioria dos hospitais, submeter recém-nascidos a exames objetivos, como a videofluoroscopia, para decidir sobre o início da alimentação por via oral

PORQUE

a avaliação clínica comportamental ou avaliação clínica oromotora vêm sendo utilizadas em maior escala para avaliar qual forma de alimentação e o tipo de intervenção necessária, norteadas, assim, o processo de reabilitação em recém-nascidos.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.