

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

A gravidez na adolescência pode acarretar problemas psicossociais, econômicos e complicações obstétricas, que comprometem a saúde materna e do neonato. Além da demanda de nutrientes da gestação ainda em desenvolvimento, tem-se todo o requerimento nutricional aumentado pelo crescimento e desenvolvimento fetal. A principal alteração de demanda nutricional em grávidas adolescentes é a necessidade _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) calórica: 38 a 50 Kcal/dia + 500 Kcal/dia no segundo e terceiro trimestres
- B) proteica: duas vezes a recomendação para gestantes mais velhas
- C) de vitaminas, em especial as vitaminas A, E e do complexo B
- D) hídrica: 50 mL/Kg/dia durante toda a gestação
- E) de minerais, principalmente cálcio e ferro

Questão 17 (Peso 0,50)

A alergia alimentar é caracterizada por reações imunológicas adversas que são desencadeadas por antígenos alimentares específicos e mediadas ou não por anticorpos IgE, resultando em uma variedade de manifestações intestinais ou sistêmicas. A _____ é o alérgeno alimentar mais comum na criança por seu alto consumo e potencial alergênico, sendo a causa mais comum de alergia alimentar nos primeiros anos de vida. A exclusão total de _____ é a única opção terapêutica. Estratégias nutricionais como a utilização de _____, que atenda(m) a todas as necessidades nutricionais é(são) indicada(s) para evitar carências nutricionais, déficit de crescimento e de desenvolvimento na criança. Atenção especial deve ser dada ao _____, cuja ingestão costuma ser insuficiente, tornando necessária a suplementação de acordo com a as recomendações diárias para a faixa etária e o sexo.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) soja / leite de soja e derivados / leite de castanhas / valor proteico
- B) lactose / leite de vaca e derivados / leite adicionado de lactase / cálcio
- C) proteína do leite de vaca / leite de vaca e derivados / fórmulas ou dietas hipoalergênicas / cálcio
- D) proteína do ovo / qualquer comida com vestígios de ovo / substitutos alimentares / ferro
- E) casca do camarão / crustáceo / outras fontes alimentares / valor proteico

Questão 18 (Peso 0,50)

A atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, publicada em 2017 pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), trouxe novidades em relação ao diagnóstico das dislipidemias. Na prática, os novos exames de colesterol indicarão os valores de referência, conforme o risco cardíaco do paciente.

Baseado nas recomendações atuais da SBC, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os parâmetros colesterol total, HDL, LDL e não HDL-c não sofrem influência do estado alimentar, portanto não é necessário jejum para a coleta do exame bioquímico.
- () Quanto aos triglicérides (TG), é necessário informar no exame se a coleta foi em jejum ou não. O valor desejável para TG com jejum é < 150mg/dL, sem jejum considera-se valor ideal < 175 mg/dL.
- () O valor de referência do colesterol total desejável foi reduzido de < 250 mg/dL para < 200 mg/dL. Pacientes com risco cardíaco muito elevado devem alcançar níveis plasmáticos de LDL colesterol < 60 mg/dL.
- () O uso de fitosteróis deve ser parte das mudanças de estilo de vida e está indicado para indivíduos com colesterol elevado. Os fitosteróis podem ser administrados incorporados a alimentos ou sob a forma de cápsulas, sendo sua eficácia semelhante. Efeitos benéficos podem ser observados a partir de três a quatro semanas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F F V
- C) V F V F
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 19 (Peso 0,50)

Paciente de 55 anos, sexo feminino, diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há cinco anos, atendida em consulta domiciliar pela equipe de nutrição, apresenta sinais de disfagia, dificuldade de mastigação e perda de 15% do peso corpóreo nos últimos três meses. A conduta nutricional mais adequada é _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) iniciar dieta enteral via sonda e suspender dieta oral
- B) solicitar nutrição parenteral domiciliar por conta da desnutrição grave
- C) adaptar a consistência da dieta oral à disfagia e solicitar fonoterapia
- D) dieta enteral via gastrostomia e manter estímulo oral sob acompanhamento do fonoaudiólogo
- E) associar suplemento nutricional oral hipercalórico e observar a evolução nutricional

Questão 20 (Peso 0,50)

A desnutrição altera de maneira importante a função e a constituição muscular. Paciente desnutrido apresenta perda preferencial de massa muscular constituída por fibras do _____ de resposta rápida. Já a função de contração muscular é muito mais prejudicada nas fibras do _____, como o diafragma, por exemplo. No músculo desnutrido, ocorre _____ da quantidade de água e cálcio, e _____ da quantidade de potássio.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) tipo I / tipo II de resposta lenta / redução / aumento
- B) tipo I / tipo II de resposta lenta / aumento / redução
- C) tipo II / tipo I de resposta lenta / redução / aumento
- D) tipo II / tipo I de resposta lenta / aumento / redução
- E) tipo II / tipo I de resposta rápida / aumento / manutenção

Questão 21 (Peso 0,75)

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) é o instrumento responsável por mapear a condição alimentar e nutricional de toda a população brasileira. Através das informações coletadas pelo SISVAN, o governo tem a possibilidade de localizar possíveis problemas de nutrição e colocar planos de ação para minimizar essas falhas.

Os métodos padronizados pelo SISVAN para avaliar o estado nutricional de adultos são:

- A) peso e circunferência da cintura.
- B) o IMC e a relação cintura quadril.
- C) perda de peso recente e exames laboratoriais.
- D) o IMC e a composição corporal avaliada por bioimpedância.
- E) peso, altura, somatório de quatro pregas e circunferências do braço e cintura.

Questão 22 (Peso 0,75)

Diabetes *mellitus* gestacional é o problema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência entre 3 e 25% das gestações, dependendo do grupo étnico, da população e do critério diagnóstico utilizado. Sua incidência está aumentando em paralelo com o aumento do Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) e da obesidade feminina.

Considerando os fatores de risco para diabetes gestacional, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Idade materna precoce.
- () Estatura maior ou igual a 1,8 m.
- () Síndrome de ovários policísticos.
- () Deposição central excessiva de gordura corporal.
- () Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V V
- B) V F F F F
- C) F F V V V
- D) F V F V F
- E) F V V F V

Questão 23 (Peso 0,75)

Criança de seis anos comparece ao consultório de nutrição acompanhada da mãe, com história de dor e dificuldade para defecar, apresentando, nos últimos 40 dias, fezes ressecadas e em pequeno volume associadas a desconforto abdominal, apesar do ritmo intestinal diário. Mãe relata redução do apetite nas últimas duas semanas. Ao inquérito alimentar, observa-se ingestão de aproximadamente 500mL de água, consumo esporádico de frutas (finais de semana), aversão a raízes, tubérculos e verduras.

Sobre o diagnóstico e o manejo nutricional no quadro acima descrito, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Trata-se de um quadro de constipação aguda, sem maior comprometimento nutricional.
- () O tratamento deve ser baseado na mudança dos hábitos alimentares, com aumento da hidratação e do consumo de fibras.
- () O nutricionista deve orientar o aumento da ingestão hídrica para alcançar cerca de 2,5 L/dia, considerando o total de água, inclusive, a contida nos alimentos.
- () Recomenda-se a oferta de 0,5g/kg/dia de fibra nessa faixa etária. O aumento das fibras deve, preferencialmente, ser obtido por meio dos alimentos. Caso não seja possível, deve-se considerar o uso de suplementos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) F V F V
- D) F V V F
- E) F F F V

Questão 24 (Peso 0,75)

Estudos mostram que o desuso do tubo digestivo favorece a atrofia intestinal progressiva, a quebra da integridade da mucosa intestinal e o achatamento das microvilosidades, com conseqüente translocação bacteriana e dificuldades para re-alimentação. A nutrição enteral precoce está associada a menor incidência de úlcera de estresse e de lesão trófica intestinal, menor produção sistêmica de citocinas inflamatórias e menor morbidade infecciosa em pacientes graves.

A nutrição enteral é considerada precoce nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) quando iniciada _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) imediatamente após a passagem da sonda
- B) entre 24 e 48 horas após a admissão na UTI
- C) dentro de cinco dias após a admissão na UTI
- D) assim que for desmamada a nutrição parenteral
- E) imediatamente após a estabilização hemodinâmica

Questão 25 (Peso 0,75)

O suporte nutricional do paciente grave é um dos maiores desafios clínicos dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A terapia nutricional nesta população deve diminuir as complicações relacionadas à hiperalimentação, reduzir as comorbidades, diminuir o catabolismo proteico, restaurar as funções orgânicas e metabólicas, bem como aumentar a expectativa e a qualidade de vida.

Em se tratando de pacientes obesos críticos, é correto afirmar que

- A) os pacientes obesos não se beneficiam da nutrição enteral precoce.
- B) a perda de peso não é recomendada durante a permanência na UTI.
- C) a oferta calórica deve garantir no mínimo 90% do valor calórico total aferido por calorimetria indireta.
- D) se recomenda oferta de proteína de 1,2g/kg/peso ideal/dia para portadores de IMC entre 30 e 40Kg/m² e 1,5g/kg/peso ideal/dia para portadores de IMC > 40 Kg/m².
- E) quando a regra prática for usada para estimar o gasto energético em repouso (GER), recomenda-se terapia dietética de 11 a 14Kcal/kg de peso atual/dia e 22 a 25Kcal/Kg de peso ideal/dia, quando o IMC>50Kg/m².

Questão 26 (Peso 0,75)

Para paciente com doenças pulmonares, a literatura atual não recomenda o uso de formulações enterais especializadas, com alto teor de _____ e baixo teor de _____ para reduzir o quociente respiratório. O alto teor de _____ pode exacerbar o processo inflamatório. A produção de CO₂ parece ser mais afetada pelo _____ do que pela distribuição de macronutrientes.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) calorias / líquidos / lipídios / perfil lipídico
- B) carboidratos / gordura / proteínas / perfil lipídico
- C) proteína / carboidratos / lipídios / excesso de calorias
- D) proteína / gordura / ácidos graxos ômega-6 / excesso de calorias
- E) gordura / carboidratos / ácidos graxos ômega-6 / excesso de calorias

Questão 27 (Peso 0,75)

Grandes traumas levam a alterações metabólicas marcantes, que contribuem para a criação de um estado de supressão imunológica, aumentando o risco de infecções e de falência orgânica.

Sobre as alterações metabólicas provocadas pelo trauma, é correto afirmar que

- A) com o objetivo de manter a volemia e a perfusão tecidual, ocorrem aumento da excreção de sódio e água, e retenção aumentada de potássio.
- B) ocorre mudança da relação entre os volumes dos compartimentos intracelular e extracelular, com a formação do chamado “terceiro espaço”.
- C) no trauma grave, ocorre redução importante do estímulo à lipólise, tendo, como consequência, o aumento dos níveis séricos de ácidos graxos livres e glicerol.
- D) a hipoglicemia é a consequência mais marcante, sendo decorrente das inúmeras reações orgânicas ao trauma, cujo objetivo é garantir substrato para órgãos nobres como o cérebro, miocárdio e para o processo cicatricial.
- E) as alterações no metabolismo de proteína estão associadas à proteólise reduzida e ao aumento da síntese proteica, levando ao comprometimento de inúmeras funções orgânicas como cicatrização, resposta inflamatória e defesa imunológica, além de alterações na função muscular, principalmente, motricidade e ventilação.

Questão 28 (Peso 0,75)

A sepse é uma síndrome inflamatória sistêmica grave, de origem infecciosa, que pode determinar disfunção ou falência de um ou mais órgãos, devido a sua intensa atividade inflamatória e ativação do complexo de coagulação, manifestando-se em níveis distintos de gravidade.

Considerando as recomendações para a nutrição do paciente séptico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A recomendação de proteína no curso da sepse é de 1,2-2 g proteína/kg/dia.
- () Por conta da resposta inflamatória exacerbada, especialistas recomendam o uso rotineiro de fórmulas imunomoduladoras em pacientes com sepse grave.
- () A necessidade calórica do paciente séptico deve ser baseada no gasto energético em repouso, avaliado por calorimetria indireta, que deve ser reavaliado a cada quatro dias.
- () Na fase inicial da sepse, deve ser oferecida nutrição enteral trófica, definida como 10-20 kcal/h ou até 500 kcal/dia. A evolução deve ser conforme tolerância, após 24-48 horas, para mais de 80% da necessidade calórica estimada na primeira semana.
- () No passado, acreditava-se que o uso de arginina representava uma ameaça para o paciente séptico criticamente enfermo, uma vez que podia aumentar a liberação de citocinas pró-inflamatórias e óxido nítrico. Trabalhos atuais, no entanto, demonstram que seu uso é seguro e confiável nessa população, reduzindo, inclusive, a mortalidade, levando à recomendação consensual do seu uso de maneira rotineira.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F F
- B) V V F V V
- C) V F V V F
- D) F V V F F
- E) F F V V V

Questão 29 (Peso 0,75)

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) possui elevada prevalência, várias formas de apresentação clínica e grande impacto econômico, além de reduzir a qualidade de vida. Apesar do excesso de peso (IMC > 25), do tabagismo, do consumo de álcool, café, doces e proteínas, do excesso alimentar, da postura inclinada, do estresse e da fadiga estarem associados à DRGE, não há informação consistente definindo que a resolução desses fatores é seguida de resolução ou melhora da DRGE. No entanto, são consideradas medidas efetivas na redução da exposição ácida esofágica a _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) dieta pobre em gordura
- B) redução do peso corpóreo, quando IMC > 25Kg
- C) suspensão temporária do exercício físico durante os sintomas exacerbados
- D) redução do teor de fibras para aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico
- E) elevação da cabeceira da cama e o deitar-se mais tardio após a alimentação noturna

Questão 30 (Peso 0,75)

A infecção pelo HIV ocasiona diversos efeitos sobre o estado nutricional do indivíduo em qualquer fase da doença. Sabe-se que a perda de massa magra está fortemente relacionada a maiores taxas de morbimortalidade e a pior prognóstico. Na avaliação nutricional, é importante distinguir a síndrome consumptiva e a lipodistrofia, entretanto ambas podem estar combinadas.

Sobre a terapia nutricional no portador de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/AIDS), é correto afirmar que

- A) a síndrome consumptiva é caracterizada pela perda de peso involuntária maior que 30%.
- B) a restrição de lactose apresenta eficácia no tratamento da diarreia secretora, característica da doença.
- C) na fase estável da doença, a necessidade proteica deve ser 1,5 g/kg peso atual/dia. Na fase aguda, a necessidade de proteínas aumenta para 2,5 g/kg de peso atual/dia.
- D) a necessidade energética para paciente assintomático é de 25-30 kcal/kg/dia. Em paciente sintomático com a doença propriamente dita, AIDS e CD4 inferior a 200 células, a necessidade é de 35 kcal/kg/dia.
- E) a lipodistrofia caracteriza-se por lipoatrofia na região da face, dos membros superiores e inferiores e acúmulo de gorduras na região do abdome, na região cervical e nas mamas, além de fatores metabólicos como aumento sérico de lipídeos, intolerância à glicose, aumento da resistência periférica à insulina e diabetes mellitus.

Questão 31 (Peso 1,00)

Nos últimos anos, os métodos de avaliação da composição corporal adquiriram grande relevância na avaliação do estado nutricional. Considerando os níveis de composição corporal disponíveis e os respectivos métodos de mensuração, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Nível celular | () Diluição traço. |
| (2) Nível atômico | () Análise de ativação de nêutrons e contagem corporal. |
| (3) Nível molecular | () Tomografia computadorizada e ressonância magnética. |
| (4) Sistema tecidual | () Bioimpedância, absorciômetro de dupla energia de raio X (DEXA) e ultrassom. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 4 3
- B) 1 3 2 4
- C) 2 4 1 3
- D) 3 2 1 4
- E) 4 1 3 2

Questão 32 (Peso 1,00)

O nutricionista deve fazer parte da equipe de atenção básica à saúde gestacional, seja na rede pública seja na rede privada, garantindo assistência nutricional de qualidade, individualizada, prevenindo ou tratando possíveis distúrbios e carências nutricionais específicas, contribuindo de maneira importante para a redução da incidência das Doenças Hipertensivas Específicas da Gestação (DHEG) e suas implicações clínicas.

Sobre a etiologia, o diagnóstico e o tratamento das DHEG, é correto afirmar que

- A) toda mulher obesa pode e deve perder peso durante a gestação, reduzindo assim riscos para o binômio mãe-feto.
- B) o ganho de peso durante a gravidez deve ser baseado no IMC pré-gestacional. Portadoras de sobrepeso devem ganhar de 5 a 7Kg/m².
- C) a restrição de sódio é muito mais efetiva na redução do edema e da pressão arterial durante a hipertensão gestacional do que a oferta proteica.
- D) as mulheres obesas têm duas vezes mais chance de desenvolver pré-eclâmpsia quando comparadas a mulheres com peso normal, por isso devem ser tratadas antes de engravidar.
- E) vários estudos evidenciaram o papel do cálcio no controle da hipertensão arterial em indivíduos adultos. Em gestantes, no entanto, não se observa associação entre a baixa ingestão de cálcio e/ou deficiência desse nutriente com maior risco de pré-eclâmpsia.

Questão 33 (Peso 1,00)

Sobre a terapia nutricional em pediatria, analise as assertivas a seguir.

O desmame precoce, através da oferta de alimentos num período crítico e específico do desenvolvimento, pode acarretar um efeito duradouro e persistente ao longo da vida, predispondo o indivíduo ao desenvolvimento de doenças crônicas como a obesidade, diabetes tipo II, hipertensão e doenças cardiovasculares

PORQUE

o aleitamento materno é considerado fator protetor contra a obesidade na infância. Ele representa uma das experiências nutricionais mais precoces do recém-nascido, dando continuidade à nutrição uterina. Sua composição única, com a presença de hormônios e fatores de crescimento, influencia o processo de *imprinting* metabólico, atuando na alteração do número e/ou tamanho dos adipócitos ou na indução do fenômeno de diferenciação metabólica.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 34 (Peso 1,00)

Sobre a terapia dietética em queimaduras, analise as assertivas a seguir.

Com relação à terapia nutricional do paciente com queimadura, a nutrição parenteral deve ser priorizada em detrimento da nutrição enteral

PORQUE

quando são comparados pacientes em uso de nutrição enteral com aqueles em uso de nutrição parenteral, os usuários de enteral tendem a receber uma porcentagem menor de energia.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas são falsas.
- B) a primeira é falsa e a segunda verdadeira.
- C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 35 (Peso 1,00)

A criação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF), em 2008, prevendo a formação de equipes de atenção básica onde o nutricionista está incluído, marcou a efetiva incorporação das ações de alimentação e nutrição nos programas e ações de atenção primária em saúde.

Sobre as atribuições do nutricionista junto ao NASF, segundo o Conselho Federal de Nutrição (CFN), analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Favorecer a inclusão social por meio da ampliação do acesso à informação sobre programas sociais e direitos relacionados à alimentação.
- Garantir que a população tenha acesso à alimentação adequada, levando em consideração a definição de segurança alimentar e nutricional.
- Realizar o diagnóstico da situação alimentar e nutricional da população com a identificação de áreas geográficas e segmentos de maior risco aos agravos nutricionais.
- Avaliar o estado nutricional da população por meio de medidas antropométricas simples como peso e altura e garantir orientação nutricional individualizada a nível ambulatorial ou domiciliar.
- Desenvolver ações de distintas naturezas para a promoção de práticas alimentares saudáveis em todas as fases do curso da vida e em resposta às principais demandas assistenciais quanto aos transtornos e aos distúrbios alimentares, estabelecendo estratégias conjuntas com diferentes setores e atuando nos espaços sociais da comunidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F V
- B) V V F V F
- C) V F F V V
- D) F V V F V
- E) F F V F F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

“O impacto das condições e estilos de vida na saúde das populações é um tema muito discutido atualmente. Os determinantes sociais em saúde têm estado no centro deste debate” (ASSIS et al, 2009. p. 93).

Em relação aos determinantes sociais de problemas de saúde da população infantil, é correto afirmar que

- A) atributos familiares, escolares, comunitários e do cenário sociopolítico em que vive a criança e sua família são fatores secundários nesse contexto.
- B) baixo estrato socioeconômico familiar e precário nível de escolaridade dos pais são determinantes sociais que influenciam negativamente na saúde infantil.
- C) os determinantes sociais ocupam uma função secundária durante a infância, a despeito da vulnerabilidade e da dependência observadas nesta fase da vida.
- D) os determinantes sociais de saúde da população infantil englobam temas como desnutrição e baixo peso ao nascer, mas não se relacionam a problemas perinatais graves.
- E) os determinantes sociais relacionados à população infantil desconsideram como fatores responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento infantil aqueles que perpassam os período pré-natal e perinatal.

Questão 37 (Peso 1,00)

“As desigualdades na organização da sociedade implicam que a liberdade para gozar de uma vida próspera e de boa saúde esteja distribuída de forma desigual dentro e entre sociedades. Essa desigualdade pode ser constatada nas condições vigentes na primeira infância e idade escolar [...]” (CARVALHO, 2013. p. 24).

Sobre a influência dos determinantes sociais de saúde relacionados à população infantil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- O desenvolvimento na primeira infância não tem influência nas possibilidades subsequentes da vida e saúde do indivíduo.
- Os programas de educação pré-escolar e as escolas podem ter um papel vital na construção das capacidades das crianças.
- A primeira infância é afetada de forma direta pelos riscos de obesidade, má nutrição, transtornos mentais, doenças cardiovasculares e criminalidade.
- A qualidade de vida na infância não demanda, necessariamente, ações intersetoriais, visto que o setor saúde é o principal responsável pelas ações que promovem o bem-estar das crianças.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 38 (Peso 1,00)

A Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2015).

_____, dentre outras, são diretrizes da PNAISC que devem ser observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltadas para crianças.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Acesso universal à saúde e intersetorialidade
- B) Promoção da saúde e humanização da atenção
- C) Equidade em saúde e monitoramento e avaliação
- D) Integralidade do cuidado e organização das ações e serviços na rede de atenção
- E) Gestão interfederativa das ações de saúde da criança e qualificação da força de trabalho do SUS

Questão 39 (Peso 1,00)

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, sendo resultado de uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (BRASIL, 2009).

Sobre o PSE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Promover a saúde e a cultura de paz é um dos objetivos do PSE.
- As políticas de saúde consideram o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde.
- A avaliação da saúde bucal e a atualização do calendário vacinal não são ações previstas pelo PSE, visto que tais ações demandam equipamentos específicos para sua realização.
- Os profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família não participam diretamente das ações previstas no PSE, cujas ações são assumidas pelas Equipes de Saúde da Família.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F F F V
- E) F V F V

Questão 40 (Peso 1,00)

“Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto e, posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser pactuada com a família a partir das necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de proteção” (BRASIL, 2012, p. 35).

Em relação às visitas domiciliares como estratégia de promoção da saúde de crianças no contexto da atenção primária, é correto afirmar que

- A) a primeira visita domiciliar feita ao recém-nascido e à puérpera deve ser realizada pelo Agente Comunitário de Saúde.
- B) em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança.
- C) a orientação à família sobre os cuidados com o bebê deve ser feita na Unidade de Saúde, onde a equipe dispõe dos recursos necessário para este fim.
- D) caso a criança tenha bom estado de saúde, os profissionais devem optar pelo acompanhamento ambulatorial da criança, após a primeira semana de vida.
- E) a identificação de sinais de depressão puerperal não pode ser realizada pela equipe de saúde da família durante a visita, pois tal situação exige diagnóstico especializado.

Questão 41 (Peso 1,00)

“Prevenir violência significa antecipar, intervir precocemente, evitar ou tornar impossível que o fenômeno aconteça ou se repita. Para lidar com a prevenção de violências e a promoção da saúde é preciso acreditar que prevenir é possível e crer no potencial de transformação” (BRASIL, 2015, p. 213).

Considerando o papel do profissional de saúde na prevenção da violência contra crianças, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () No caso de violência escolar, não deve haver interferência da equipe de saúde, já que tais atribuições não estão previstas no seu escopo de ações.
- () No primeiro ano de vida da criança, é fundamental que, a cada consulta ou visita, seja feito um reforço do vínculo afetivo da criança com os pais e os cuidadores.
- () O afeto fortalecido, o acompanhamento do bebê já no pré-natal, e o acompanhamento da saúde materno-infantil pelos profissionais de saúde são recursos protetores.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V F F

Questão 42 (Peso 1,00)

Ao longo dos anos, “o SUS aumentou a extensão e importância política e econômica de serviços e programas na área da saúde. [...] Ao desdobrar-se e operacionalizar-se em numerosas ações e iniciativas, torna-se alvo constante de questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade. Dessa forma, surge a necessidade da avaliação, como um dos instrumentos na busca por respostas” (FURTADO, 2015, p. 774).

Sobre a avaliação de programas e sistemas de saúde, é correto afirmar que

- A) a avaliação de programas e serviços de saúde tem ação direta sobre as instituições, mas não atua sobre a constituição de sujeitos e coletivos.
- B) para garantir validade ao processo de avaliação de um programa ou sistema de saúde, o método deve priorizar as abordagens quantitativas.
- C) o campo da avaliação em saúde no Brasil possui tipologia definida pelo Ministério da Saúde, que descentraliza o método a ser replicado em estados e municípios.
- D) a função primordial da avaliação de programas e serviços, assim como da área do planejamento em saúde, é produzir saúde, contribuindo para a tomada de decisão.
- E) para que tenha validade, a avaliação de um programa ou sistema de saúde preconiza a neutralidade e, portanto, deve adotar metodologias específicas e padronizadas.

Questão 43 (Peso 1,00)

A avaliação de programas e serviços de saúde compreende uma série de ações e procedimentos. É essencial que tais ações sigam um roteiro claro e consistente, sendo amplo o necessário para comportar os mais diferentes referenciais, concepções e propostas metodológicas. Dessa forma, se garante legitimidade ao processo avaliativo (FURTADO, 2015, p. 781).

Considerando a sequência correta para se realizar um processo avaliativo, numere em ordem cronológica de 1 a 7 as etapas a seguir:

- () utilizar os resultados
- () descrever o programa
- () comunicar os resultados
- () coletar e analisar os dados
- () definir as questões da avaliação
- () identificar os grupos de interesse
- () definir os propósitos da avaliação

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 7 2 5 4 6
- B) 3 6 7 5 2 4 1
- C) 5 2 4 1 6 3 2
- D) 7 3 6 5 4 1 2
- E) 7 1 6 2 3 4 5

Questão 44 (Peso 1,00)

“Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, conforme fluxo estabelecido em cada município. [...] Os casos suspeitos devem ser notificados e registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN).” (BRASIL, 2017, p. 59).

Em relação às ações de vigilância epidemiológica no acompanhamento dos casos de Chikungunya no Brasil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A febre de Chikungunya se constitui em agravo de Notificação Compulsória.
- () Os óbitos suspeitos são de notificação imediata e devem ser comunicados pelo profissional à Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas.
- () Os casos que evoluem para a fase crônica da doença não necessitam de acompanhamento em longo prazo, considerando que estão fora do risco de morte.
- () Ao realizar a notificação de Chikungunya pelos canais de comunicação disponíveis, o profissional e o serviço de saúde ficam isentos de realizar o registro SINAN.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 45 (Peso 1,00)

As decisões clínicas, sociais ou mesmo políticas relacionadas com a saúde das populações devem ser baseadas numa investigação científica rigorosa, de modo a maximizar os benefícios e minimizar os custos e agravos. Dessa forma, os estudos epidemiológicos assumem papel primordial na caracterização e definição do problema, bem como na tomada de decisões (LOPES, 2013, p. 140).

Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os estudos de coorte são considerados retrospectivos, buscando a comparação entre um grupo que apresenta o desfecho de interesse e outro que não apresenta tal desfecho.
- () Os estudos de caso-controle são considerados estudos longitudinais, nos quais um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma população é acompanhado durante certo período.
- () Os estudos ecológicos são chamados de estudos agregados e diferem de outros delineamentos por ter a unidade de análise representada por grupos e não por indivíduos.
- () Os estudos transversais permitem que, a partir de dados de uma amostra extraída num dado momento de uma população bem delimitada, seja possível estabelecer um perfil clínico de interesse, delimitando parâmetros e construindo hipóteses.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F F V F

Questão 46 (Peso 1,00)

“As medidas de saúde coletiva contemplam duas categorias de índices: os índices de prevalência que descrevem o que existe numa população [...] e as medidas de incidência, que descrevem o que ocorre nessa população” (LIMA et al, 2013. p. 29).

Em relação aos tipos de medidas em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As taxas são medidas secundárias geradas pelo quociente entre medidas primárias de variáveis independentes.
- () Os índices de prevalência detalham a situação da saúde, ao passo que as medidas de incidência detalham as condições e a qualidade de vida.
- () Os coeficientes são medidas de risco aplicadas a cálculos de estimativas e projeções de incidência e prevalência em populações de interesse.
- () Índice é um termo genérico e apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde, incluindo todos os termos numéricos que trazem a noção de grandezas existentes e incidentes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V
- B) F F V V
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V V V F

Questão 47 (Peso 1,00)

“As investigações epidemiológicas têm por objetivo fornecer medidas precisas da ocorrência das doenças [...]. No entanto, há muitas possibilidades de erro nessas medidas. Os epidemiologistas têm tentado minimizar esses erros e estimar os impactos daqueles que não podem ser eliminados.” (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖ, 2010. p. 52).

Em relação aos erros que podem ocorrer nas investigações epidemiológicas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O erro aleatório ocorre quando o valor medido na amostra do estudo diverge do verdadeiro valor da população, devido ao acaso.
- () Pode-se afirmar que um estudo com um pequeno erro sistemático tem alta precisão, já que esta não é afetada pelo tamanho da amostra.
- () O erro de amostragem decorre, geralmente, da falta de representatividade da amostra, que não contempla toda a variabilidade da população.
- () O viés de seleção ocorre quando as características das pessoas selecionadas para o estudo são idênticas em relação àquelas que não foram selecionadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F F
- E) F F F V

Questão 48 (Peso 1,00)

“As políticas públicas de saúde correspondem a todas as ações de governo que regulam e organizam as funções públicas do Estado para o ordenamento setorial” (WARGAS, 2004. p. 11).

Sobre os objetivos, princípios e diretrizes constitucionais que orientam o processo de formulação de políticas de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A rede de ações e serviços tem caráter regionalizado e hierarquizado, primando pela centralização político-administrativa.
- () A participação da comunidade assume papel secundário na formulação de políticas de saúde, na medida em que cabe ao Estado esta função.
- () A Constituição estabelece que compete ao poder público organizar sua atuação nas áreas de saúde, previdência e assistência social no âmbito da Seguridade Social.
- () As ações e serviços de saúde executados por instituições privadas não estão sujeitas à fiscalização e ao controle do poder público por possuírem regulamentação própria.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F
- B) F V F V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

Questão 49 (Peso 1,00)

A vigilância epidemiológica exerce papel fundamental no acompanhamento dos casos relacionados à infecção pelo vírus Zika, incluindo a tomada de decisão por parte dos gestores e o planejamento adequado das ações de intervenção.

Em relação à notificação dos casos de infecção pelo vírus Zika, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Todo recém-nascido com desproporção craniofacial deve ser notificado como caso suspeito de síndrome congênita em até 48 horas de vida.
- () A partir da oitava semana de gestação até o nascimento, deve ser notificado todo feto que tenha exame de imagem com presença de calcificações cerebrais.
- () Caso haja um evento de aborto espontâneo até a 22ª semana de gestação, é dispensável a notificação do caso como óbito suspeito de síndrome congênita.
- () Todo óbito neonatal precoce, ocorrido até o sétimo dia de vida, deve ser notificado como óbito suspeito de síndrome congênita, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F F V
- C) F V V F
- D) V F V F
- E) V V F V

Questão 50 (Peso 1,00)

A dengue é uma doença viral aguda e de rápida disseminação. A notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença na área, e a curva endêmica (BRASIL, 2009, p. 45).

Em relação à atuação e ao acompanhamento dos casos de Dengue por parte da vigilância epidemiológica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Considerando um período não epidêmico, os casos suspeitos e não confirmados deixam de ser de notificação compulsória.
- () As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de dengue e, também, fontes de dados para os serviços de vigilância.
- () A Dengue é um agravo de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos devem ser notificados obrigatoriamente, mesmo aqueles não confirmados.
- () Recomenda-se o período de outubro a maio para intensificação deste monitoramento, pois, de maneira geral no país, corresponde ao intervalo da sazonalidade de transmissão da doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) F V V V
- E) F V F V