

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)**

**Questão 01 (Peso 0,50)**

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- ( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- ( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 02 (Peso 0,50)**

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

**Questão 03 (Peso 0,50)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

**Questão 04 (Peso 0,50)**

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

**Questão 05 (Peso 0,50)**

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

**Questão 06 (Peso 0,75)**

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- ( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- ( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

**Questão 07 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- ( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- ( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- ( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 08 (Peso 0,75)**

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

**Questão 09 (Peso 0,75)**

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

**Questão 10 (Peso 0,75)**

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

**Questão 11 (Peso 0,75)**

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). \_\_\_\_\_ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

**Questão 12 (Peso 0,75)**

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Questão 13 (Peso 0,75)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

**Questão 14 (Peso 0,75)**

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

**Questão 15 (Peso 0,75)**

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar \_\_\_\_\_ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial \_\_\_\_\_ dos casos \_\_\_\_\_ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as \_\_\_\_\_. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)**

**Questão 16 (Peso 0,50)**

Na pesquisa das medidas de imitância acústica, a ausência do reflexo acústico estapediano contralateral e a presença do ipsilateral, bilateralmente, é encontrada em casos de

- A) simulação.
- B) perda auditiva coclear.
- C) paralisia do nervo facial.
- D) perda auditiva condutiva.
- E) distúrbios do tronco encefálico.

**Questão 17 (Peso 0,50)**

Em relação aos testes comportamentais para avaliação do processamento auditivo, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A lateralidade do indivíduo não influencia os resultados dos testes comportamentais.
- ( ) Aspectos linguísticos cognitivos, como a memória e atenção, podem influenciar os resultados dos testes comportamentais.
- ( ) A maturação do sistema nervoso central deve ser considerada para a interpretação dos resultados dos testes comportamentais.
- ( ) A vantagem da orelha direita sobre a esquerda, observada em testes comportamentais, sugere alteração do processamento auditivo.
- ( ) Para a avaliação do processamento auditivo, o fonoaudiólogo deve utilizar diferentes testes comportamentais com o intuito de avaliar as diversas habilidades auditivas e estruturas do sistema auditivo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F V V V F
- C) F F V F V
- D) V F V V F
- E) V V V F F

**Questão 18 (Peso 0,50)**

Sobre a anatomofisiologia da linguagem, é correto afirmar que

- A) na maioria das pessoas, as áreas da linguagem estão localizadas no hemisfério cerebral direito.
- B) o lobo frontal, especializado nas funções de linguagem, é o mais anterior, limitando-se com o temporal pelo sulco central e com o parietal pelo sulco lateral.
- C) a área de Broca ocupa uma região do giro frontal superior, imediatamente em frente à área do controle cortical motor, responsável pelos órgãos periféricos da fala.
- D) a área motora da fala se localiza em regiões mais anteriores, com grande participação da região frontal, e a área sensorial em regiões mais posteriores, com atuação importante de regiões occipitais.
- E) para que a função da linguagem se realize de forma plena, faz-se necessário a integridade das áreas receptivas primárias do lobo temporal, parietal e occipital e as áreas pré-motoras, motora primária e a área de Broca no hemisfério dominante.

**Questão 19 (Peso 0,50)**

Considerando o sistema de classificação das disfonias, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| (1) Disfonias orgânicas              | ( ) Nódulos vocais          |
| (2) Disfonias organofuncionais       | ( ) Cistos saculares        |
| (3) Disfonias funcionais primárias   | ( ) Inaptações vocais       |
| (4) Disfonias funcionais secundárias | ( ) Úlcera de contato       |
|                                      | ( ) Uso incorreto da voz    |
|                                      | ( ) Alterações psicogênicas |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 2 4 4
- B) 1 3 4 2 3 4
- C) 2 1 2 4 3 4
- D) 2 1 4 2 3 4
- E) 3 1 2 4 2 4

**Questão 20 (Peso 0,50)**

Sobre o desenvolvimento normal das funções estomatognáticas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A mastigação habitual, no ser humano, é bilateral simultânea. Assim, a mastigação unilateral pode ser considerada um processo anormal.
- ( ) A deglutição, função que envia o bolo ou saliva da cavidade oral para a faringe e desta para o estômago, tem início na fase intrauterina.
- ( ) Ao nascimento, a criança apresenta uma protrusão mandibular fisiológica que, com a amamentação, vai sendo corrigida, promovendo o correto posicionamento desta estrutura.
- ( ) No padrão inicial normal de sucção, do nascimento aos seis meses de idade, os movimentos da língua ocorrem, predominantemente, para frente e para trás, simultâneos aos movimentos da mandíbula.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F V V
- C) F V F F
- D) V V F F
- E) V F V F

**Questão 21 (Peso 0,75)**

A tuba auditiva ou trompa de Eustáquio se estende da parede \_\_\_\_\_ da cavidade timpânica à \_\_\_\_\_. Normalmente, a porção cartilaginosa da tuba auditiva encontra-se \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ temporariamente, através da contração dos músculos tensor e levantador do véu palatino e do músculo salpingofaríngeo, com o intuito de equalizar a pressão do ar externo com a pressão do ar na orelha média.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) anterior / laringe / aberta / fecha-se
- B) anterior / laringe / colabada / abre-se
- C) anterior / faringe / colabada / abre-se
- D) posterior / faringe / colabada / abre-se
- E) posterior / laringe / colabada / fecha-se

**Questão 22 (Peso 0,75)**

**Sobre os distúrbios da fala e linguagem, analise as assertivas a seguir.**

De modo geral, o distúrbio fonológico é mais observado em meninos e o diagnóstico é feito, preferencialmente, entre quatro e oito anos

**PORQUE**

as crianças com distúrbio de fala e de linguagem possuem mais familiares com estas alterações do que as crianças sem queixas.

**Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que**

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 23 (Peso 0,75)**

O paciente com doença do refluxo gastroesofágico pode apresentar manifestações esofágicas e laringofaríngeas. As manifestações vocais mais comuns, nestes casos, incluem:

- A) rouquidão, fadiga vocal e quebras de sonoridade.
- B) soprosidade e quebras de sonoridade.
- C) soprosidade e fadiga vocal.
- D) aspereza e bitonalidade.
- E) astenia e bitonalidade.

**Questão 24 (Peso 0,75)**

Sobre a anatomia e a fisiologia relacionada à motricidade orofacial, é correto afirmar que

- A) a mastigação se inicia com a incisão, na qual o alimento é apreendido entre as bordas dos dentes incisivos, pela protrusão e abaixamento da mandíbula.
- B) a protrusão da mandíbula é realizada pela ação conjunta dos músculos pterigoideos laterais, pterigoideos mediais e feixes anteriores do músculo temporal.
- C) a mastigação inclui movimentos de lateralidade mandibular, realizados pelo músculo pterigoideo lateral, direcionando a mandíbula para o mesmo lado da contração.
- D) a fase esofágica da deglutição é inconsciente e involuntária e consiste na transferência do bolo alimentar da faringe para o esôfago por meio dos movimentos peristálticos.
- E) a fase oral preparatória da deglutição é inconsciente e voluntária e inicia-se com a apreensão dos alimentos. Durante essa fase, o bolo alimentar é misturado com a saliva e transformado em bolo homogêneo para que possa ser deglutido.

**Questão 25 (Peso 0,75)**

Sobre a reabilitação do paciente com paralisia facial periférica, é correto afirmar que

- A) o paciente com este tipo de acometimento passa por três fases: a fase flácida, a fase de desnervação e a fase de reinervação, a qual pode ser acompanhada de sequelas.
- B) o trabalho miofuncional, na fase de desnervação, tem como objetivos diminuir a contratatura, melhorar a harmonia e simetria facial, aumentando a amplitude dos movimentos, e controlar as sincinesias.
- C) os exercícios isotônicos envolvem modificação da fibra muscular e são indicados para estimular a oxigenação muscular, a coordenação da musculatura e o aumento da amplitude dos movimentos.
- D) as sincinesias são movimentos associados, que ocorrem entre músculos originalmente independentes, do lado oposto ao afetado pela paralisia, como consequência dos desvios das fibras durante o crescimento axonal.
- E) os exercícios isométricos, geralmente recomendados na fase inicial da paralisia facial, são aqueles em que se desenvolve tensão com modificação do tamanho da fibra muscular, e são indicados para aumentar o tônus da musculatura.

**Questão 26 (Peso 0,75)**

A fissura labiopalatina (FLP) e a disfunção velofaríngea congênita estão associadas a várias alterações do processo alimentar. Considerando a intervenção fonoaudiológica em recém-nascidos com FLP, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A postura para a alimentação deverá ser vertical para impedir o refluxo nasal e aspiração broncopulmonar.
- ( ) Cabe ao fonoaudiólogo, a indicação e adaptação da placa de acrílico com o objetivo de separar as cavidades oral e nasal no processo alimentar.
- ( ) O primeiro problema que o bebê com FLP enfrenta durante a amamentação é a dificuldade ou a impossibilidade de gerar pressão intraoral negativa.

A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 27 (Peso 0,75)**

As disfonias funcionais primárias se beneficiam de abordagens terapêuticas, que favoreçam uma emissão equilibrada, como as técnicas do método de \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) fala
- B) ativação vocal
- C) sons facilitadores
- D) competência glótica
- E) órgãos fonoarticulatórios

**Questão 28 (Peso 0,75)**

A dispraxia da fala é uma desordem da articulação que resulta da perda da capacidade de organizar o posicionamento da musculatura da fala e de sequencializar os movimentos na produção espontânea de fonemas ou de uma sequência de fonemas. Sobre as principais características observadas em pacientes dispráxicos, é correto afirmar que

- A) a performance na fala espontânea é pior do que na repetição.
- B) geralmente, há discrepância entre a performance na fala automática e na fala espontânea, sendo a segunda mais prejudicada.
- C) a dificuldade de fala é acompanhada de fraqueza e lentidão significantes ou incoordenação da musculatura da fala nos movimentos reflexos ou automáticos.
- D) os erros articulatórios aumentam na mesma proporção que aumenta a complexidade articulatória. Assim, as consoantes são articuladas mais facilmente do que as vogais.
- E) os erros articulatórios aumentam de acordo com a complexidade do ajuste motor que a articulação exige, porém, zona e modo de articulação não interferem na produção da fala.

**Questão 29 (Peso 0,75)**

“A reabilitação das disfagias orofaríngeas envolve a modificação da fisiologia da deglutição, podendo ser necessária a utilização de estratégias compensatórias para redirecionar e melhorar a deglutição, evitando assim, a ocorrência de aspirações traqueais” (LOGEMANN, 1997).

Sobre as manobras posturais utilizadas para facilitar a eficiência e segurança da passagem do bolo alimentar da cavidade oral para a faringe e o esôfago, é correto afirmar que

- A) na manobra supraglótica, os pacientes são orientados a prender a respiração, deglutir e tossir.
- B) a rotação de cabeça para o lado melhor é indicada para pacientes que apresentam alterações musculares unilaterais.
- C) inclinar a cabeça para o lado com maior comprometimento direciona o bolo alimentar para o melhor lado pela ação da gravidade.
- D) a manobra de queixo para baixo é indicada para indivíduos com atraso na fase faríngea da deglutição e com fechamento laríngeo reduzido.
- E) a manobra de cabeça para o lado facilita o trânsito oral pela ação da gravidade e é indicada para pacientes que demonstram dificuldades em ejetar o bolo da cavidade oral para a faringe.

**Questão 30 (Peso 0,75)**

A teoria \_\_\_\_\_ considera que a produção da voz é um fenômeno resultante da elasticidade dos músculos laríngeos combinado com a força aerodinâmica da respiração.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) mioelástica
- B) aerodinâmica
- C) neurocilatória
- D) neurocronáxica
- E) mioelástica-aerodinâmica

**Questão 31 (Peso 1,00)**

Sobre o treinamento auditivo acusticamente controlado nos transtornos de processamento auditivo, é correto afirmar que

- A) os mesmos testes comportamentais empregados na avaliação do processamento auditivo devem ser utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado.
- B) os testes comportamentais utilizados para o treinamento auditivo acusticamente controlado não devem ser empregados para avaliar a evolução da habilidade auditiva durante o processo de reabilitação.
- C) a reavaliação das habilidades auditivas deve ser realizada após cada sessão de treinamento auditivo acusticamente controlado e utilizar os mesmos procedimentos selecionados para a avaliação inicial do processamento auditivo.
- D) o treinamento auditivo acusticamente controlado é realizado em cabina acústica e consiste no treino das habilidades auditivas alteradas, através da aplicação repetida dos mesmos testes comportamentais utilizados na avaliação do processamento auditivo.
- E) no treinamento auditivo acusticamente controlado, deve-se utilizar todos os testes comportamentais disponíveis para a avaliação do processamento auditivo com o intuito de desenvolver as habilidades auditivas prejudicadas e aprimorar aquelas não identificadas como alteradas no processo de diagnóstico.

**Questão 32 (Peso 1,00)**

**Sobre o implante coclear, analise as assertivas a seguir.**

Os sistemas de frequência modulada (FM) são indicados para crianças usuárias de implante coclear, principalmente, em situações de aprendizagem

**PORQUE**

os sistemas FM possibilitam uma melhor percepção da fala em ambientes acusticamente desfavoráveis.

**Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que**

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 33 (Peso 1,00)**

**Sobre o diagnóstico diferencial, analise as assertivas a seguir.**

A identificação e o diagnóstico de Distúrbios Específico de Linguagem (DEL) vêm sendo realizados muito mais por critérios de exclusão

**PORQUE**

os indivíduos com DEL apresentam manifestações de linguagem heterogêneas, podendo, inclusive, variar na mesma criança.

**Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que**

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 34 (Peso 1,00)**

A encefalopatia crônica infantil não evolutiva (ECINE) é o termo utilizado para designar uma alteração neurológica causada por uma lesão permanente, que ocorre no cérebro em fase de desenvolvimento. Nos pacientes com ECINE, é possível observar manifestações consideradas de risco para alterações da deglutição.

Considerando as dificuldades esperadas para cada fase da deglutição nestes pacientes, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A fase faríngea da deglutição é iniciada de forma precoce pela diminuição da sensibilidade da faringe e dificuldade na programação motora.
- ( ) Na fase oral da deglutição, ocorre incapacidade de controlar o alimento na boca, culminando em escape extraoral e dificuldade de vedamento labial.
- ( ) O padrão de extensão cervical, característico de indivíduos com ECINE, pode dificultar o movimento adequado de elevação laríngea, favorecendo a aspiração traqueal durante a deglutição.
- ( ) Na fase preparatória oral da deglutição, ocorre perda de reflexos orais, dificuldade na movimentação das partes anterior e dorsal da língua, com pobre amplitude lateral desta, e perda prematura do alimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) V V F F
- E) F F V V

**Questão 35 (Peso 1,00)**

O parâmetro acústico de medidas de frequência fundamental corresponde ao número de ciclos glóticos por segundos, e os valores normais para homens são de \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) 80 a 150 Hz
- B) 50 a 150 Hz
- C) 150 a 200 Hz
- D) 150 a 250 Hz
- E) acima de 250 Hz

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)**

**Questão 36 (Peso 1,00)**

“O impacto das condições e estilos de vida na saúde das populações é um tema muito discutido atualmente. Os determinantes sociais em saúde têm estado no centro deste debate” (ASSIS et al, 2009. p. 93).

Em relação aos determinantes sociais de problemas de saúde da população infantil, é correto afirmar que

- A) atributos familiares, escolares, comunitários e do cenário sociopolítico em que vive a criança e sua família são fatores secundários nesse contexto.
- B) baixo estrato socioeconômico familiar e precário nível de escolaridade dos pais são determinantes sociais que influenciam negativamente na saúde infantil.
- C) os determinantes sociais ocupam uma função secundária durante a infância, a despeito da vulnerabilidade e da dependência observadas nesta fase da vida.
- D) os determinantes sociais de saúde da população infantil englobam temas como desnutrição e baixo peso ao nascer, mas não se relacionam a problemas perinatais graves.
- E) os determinantes sociais relacionados à população infantil desconsideram como fatores responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento infantil aqueles que perpassam os período pré-natal e perinatal.

**Questão 37 (Peso 1,00)**

“As desigualdades na organização da sociedade implicam que a liberdade para gozar de uma vida próspera e de boa saúde esteja distribuída de forma desigual dentro e entre sociedades. Essa desigualdade pode ser constatada nas condições vigentes na primeira infância e idade escolar [...]” (CARVALHO, 2013. p. 24).

Sobre a influência dos determinantes sociais de saúde relacionados à população infantil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O desenvolvimento na primeira infância não tem influência nas possibilidades subsequentes da vida e saúde do indivíduo.
- ( ) Os programas de educação pré-escolar e as escolas podem ter um papel vital na construção das capacidades das crianças.
- ( ) A primeira infância é afetada de forma direta pelos riscos de obesidade, má nutrição, transtornos mentais, doenças cardiovasculares e criminalidade.
- ( ) A qualidade de vida na infância não demanda, necessariamente, ações intersetoriais, visto que o setor saúde é o principal responsável pelas ações que promovem o bem-estar das crianças.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

**Questão 38 (Peso 1,00)**

A Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015, do Ministério da Saúde, instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2015).

\_\_\_\_\_, dentre outras, são diretrizes da PNAISC que devem ser observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltadas para crianças.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Acesso universal à saúde e intersetorialidade
- B) Promoção da saúde e humanização da atenção
- C) Equidade em saúde e monitoramento e avaliação
- D) Integralidade do cuidado e organização das ações e serviços na rede de atenção
- E) Gestão interfederativa das ações de saúde da criança e qualificação da força de trabalho do SUS

**Questão 39 (Peso 1,00)**

O Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, sendo resultado de uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (BRASIL, 2009).

Sobre o PSE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Promover a saúde e a cultura de paz é um dos objetivos do PSE.
- ( ) As políticas de saúde consideram o espaço escolar como espaço privilegiado para práticas promotoras da saúde, preventivas e de educação para saúde.
- ( ) A avaliação da saúde bucal e a atualização do calendário vacinal não são ações previstas pelo PSE, visto que tais ações demandam equipamentos específicos para sua realização.
- ( ) Os profissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família não participam diretamente das ações previstas no PSE, cujas ações são assumidas pelas Equipes de Saúde da Família.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F F F V
- E) F V F V

**Questão 40 (Peso 1,00)**

“Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na primeira semana pós-parto e, posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser pactuada com a família a partir das necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de proteção” (BRASIL, 2012, p. 35).

Em relação às visitas domiciliares como estratégia de promoção da saúde de crianças no contexto da atenção primária, é correto afirmar que

- A) a primeira visita domiciliar feita ao recém-nascido e à puérpera deve ser realizada pelo Agente Comunitário de Saúde.
- B) em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança.
- C) a orientação à família sobre os cuidados com o bebê deve ser feita na Unidade de Saúde, onde a equipe dispõe dos recursos necessário para este fim.
- D) caso a criança tenha bom estado de saúde, os profissionais devem optar pelo acompanhamento ambulatorial da criança, após a primeira semana de vida.
- E) a identificação de sinais de depressão puerperal não pode ser realizada pela equipe de saúde da família durante a visita, pois tal situação exige diagnóstico especializado.

**Questão 41 (Peso 1,00)**

“Prevenir violência significa antecipar, intervir precocemente, evitar ou tornar impossível que o fenômeno aconteça ou se repita. Para lidar com a prevenção de violências e a promoção da saúde é preciso acreditar que prevenir é possível e crer no potencial de transformação” (BRASIL, 2015, p. 213).

Considerando o papel do profissional de saúde na prevenção da violência contra crianças, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) No caso de violência escolar, não deve haver interferência da equipe de saúde, já que tais atribuições não estão previstas no seu escopo de ações.
- ( ) No primeiro ano de vida da criança, é fundamental que, a cada consulta ou visita, seja feito um reforço do vínculo afetivo da criança com os pais e os cuidadores.
- ( ) O afeto fortalecido, o acompanhamento do bebê já no pré-natal, e o acompanhamento da saúde materno-infantil pelos profissionais de saúde são recursos protetores.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) F V F
- D) V F V
- E) V F F

**Questão 42 (Peso 1,00)**

Ao longo dos anos, “o SUS aumentou a extensão e importância política e econômica de serviços e programas na área da saúde. [...] Ao desdobrar-se e operacionalizar-se em numerosas ações e iniciativas, torna-se alvo constante de questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade. Dessa forma, surge a necessidade da avaliação, como um dos instrumentos na busca por respostas” (FURTADO, 2015, p. 774).

Sobre a avaliação de programas e sistemas de saúde, é correto afirmar que

- A) a avaliação de programas e serviços de saúde tem ação direta sobre as instituições, mas não atua sobre a constituição de sujeitos e coletivos.
- B) para garantir validade ao processo de avaliação de um programa ou sistema de saúde, o método deve priorizar as abordagens quantitativas.
- C) o campo da avaliação em saúde no Brasil possui tipologia definida pelo Ministério da Saúde, que descentraliza o método a ser replicado em estados e municípios.
- D) a função primordial da avaliação de programas e serviços, assim como da área do planejamento em saúde, é produzir saúde, contribuindo para a tomada de decisão.
- E) para que tenha validade, a avaliação de um programa ou sistema de saúde preconiza a neutralidade e, portanto, deve adotar metodologias específicas e padronizadas.

**Questão 43 (Peso 1,00)**

A avaliação de programas e serviços de saúde compreende uma série de ações e procedimentos. É essencial que tais ações sigam um roteiro claro e consistente, sendo amplo o necessário para comportar os mais diferentes referenciais, concepções e propostas metodológicas. Dessa forma, se garante legitimidade ao processo avaliativo (FURTADO, 2015, p. 781).

Considerando a sequência correta para se realizar um processo avaliativo, numere em ordem cronológica de 1 a 7 as etapas a seguir:

- ( ) utilizar os resultados
- ( ) descrever o programa
- ( ) comunicar os resultados
- ( ) coletar e analisar os dados
- ( ) definir as questões da avaliação
- ( ) identificar os grupos de interesse
- ( ) definir os propósitos da avaliação

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 7 2 5 4 6
- B) 3 6 7 5 2 4 1
- C) 5 2 4 1 6 3 2
- D) 7 3 6 5 4 1 2
- E) 7 1 6 2 3 4 5

**Questão 44 (Peso 1,00)**

“Todo caso suspeito de Chikungunya deve ser notificado ao serviço de vigilância epidemiológica, conforme fluxo estabelecido em cada município. [...] Os casos suspeitos devem ser notificados e registrados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN).” (BRASIL, 2017, p. 59).

Em relação às ações de vigilância epidemiológica no acompanhamento dos casos de Chikungunya no Brasil, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A febre de Chikungunya se constitui em agravo de Notificação Compulsória.
- ( ) Os óbitos suspeitos são de notificação imediata e devem ser comunicados pelo profissional à Secretaria Municipal de Saúde em até 24 horas.
- ( ) Os casos que evoluem para a fase crônica da doença não necessitam de acompanhamento em longo prazo, considerando que estão fora do risco de morte.
- ( ) Ao realizar a notificação de Chikungunya pelos canais de comunicação disponíveis, o profissional e o serviço de saúde ficam isentos de realizar o registro SINAN.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 45 (Peso 1,00)**

As decisões clínicas, sociais ou mesmo políticas relacionadas com a saúde das populações devem ser baseadas numa investigação científica rigorosa, de modo a maximizar os benefícios e minimizar os custos e agravos. Dessa forma, os estudos epidemiológicos assumem papel primordial na caracterização e definição do problema, bem como na tomada de decisões (LOPES, 2013, p. 140).

Em relação aos tipos de estudos epidemiológicos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Os estudos de coorte são considerados retrospectivos, buscando a comparação entre um grupo que apresenta o desfecho de interesse e outro que não apresenta tal desfecho.
- ( ) Os estudos de caso-controle são considerados estudos longitudinais, nos quais um grupo de indivíduos pertencentes a uma mesma população é acompanhado durante certo período.
- ( ) Os estudos ecológicos são chamados de estudos agregados e diferem de outros delineamentos por ter a unidade de análise representada por grupos e não por indivíduos.
- ( ) Os estudos transversais permitem que, a partir de dados de uma amostra extraída num dado momento de uma população bem delimitada, seja possível estabelecer um perfil clínico de interesse, delimitando parâmetros e construindo hipóteses.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F F V F

**Questão 46 (Peso 1,00)**

“As medidas de saúde coletiva contemplam duas categorias de índices: os índices de prevalência que descrevem o que existe numa população [...] e as medidas de incidência, que descrevem o que ocorre nessa população” (LIMA et al, 2013. p. 29).

Em relação aos tipos de medidas em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) As taxas são medidas secundárias geradas pelo quociente entre medidas primárias de variáveis independentes.
- ( ) Os índices de prevalência detalham a situação da saúde, ao passo que as medidas de incidência detalham as condições e a qualidade de vida.
- ( ) Os coeficientes são medidas de risco aplicadas a cálculos de estimativas e projeções de incidência e prevalência em populações de interesse.
- ( ) Índice é um termo genérico e apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde, incluindo todos os termos numéricos que trazem a noção de grandezas existentes e incidentes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V
- B) F F V V
- C) F V F V
- D) V V F F
- E) V V V F

**Questão 47 (Peso 1,00)**

“As investigações epidemiológicas têm por objetivo fornecer medidas precisas da ocorrência das doenças [...]. No entanto, há muitas possibilidades de erro nessas medidas. Os epidemiologistas têm tentado minimizar esses erros e estimar os impactos daqueles que não podem ser eliminados.” (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖ, 2010. p. 52).

Em relação aos erros que podem ocorrer nas investigações epidemiológicas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O erro aleatório ocorre quando o valor medido na amostra do estudo diverge do verdadeiro valor da população, devido ao acaso.
- ( ) Pode-se afirmar que um estudo com um pequeno erro sistemático tem alta precisão, já que esta não é afetada pelo tamanho da amostra.
- ( ) O erro de amostragem decorre, geralmente, da falta de representatividade da amostra, que não contempla toda a variabilidade da população.
- ( ) O viés de seleção ocorre quando as características das pessoas selecionadas para o estudo são idênticas em relação àquelas que não foram selecionadas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F F
- E) F F F V

**Questão 48 (Peso 1,00)**

“As políticas públicas de saúde correspondem a todas as ações de governo que regulam e organizam as funções públicas do Estado para o ordenamento setorial” (WARGAS, 2004. p. 11).

Sobre os objetivos, princípios e diretrizes constitucionais que orientam o processo de formulação de políticas de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A rede de ações e serviços tem caráter regionalizado e hierarquizado, primando pela centralização político-administrativa.
- ( ) A participação da comunidade assume papel secundário na formulação de políticas de saúde, na medida em que cabe ao Estado esta função.
- ( ) A Constituição estabelece que compete ao poder público organizar sua atuação nas áreas de saúde, previdência e assistência social no âmbito da Seguridade Social.
- ( ) As ações e serviços de saúde executados por instituições privadas não estão sujeitas à fiscalização e ao controle do poder público por possuírem regulamentação própria.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F
- B) F V F V
- C) V F V F
- D) V V F F
- E) V F F V

**Questão 49 (Peso 1,00)**

A vigilância epidemiológica exerce papel fundamental no acompanhamento dos casos relacionados à infecção pelo vírus Zika, incluindo a tomada de decisão por parte dos gestores e o planejamento adequado das ações de intervenção.

Em relação à notificação dos casos de infecção pelo vírus Zika, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Todo recém-nascido com desproporção craniofacial deve ser notificado como caso suspeito de síndrome congênita em até 48 horas de vida.
- ( ) A partir da oitava semana de gestação até o nascimento, deve ser notificado todo feto que tenha exame de imagem com presença de calcificações cerebrais.
- ( ) Caso haja um evento de aborto espontâneo até a 22ª semana de gestação, é dispensável a notificação do caso como óbito suspeito de síndrome congênita.
- ( ) Todo óbito neonatal precoce, ocorrido até o sétimo dia de vida, deve ser notificado como óbito suspeito de síndrome congênita, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F F V
- C) F V V F
- D) V F V F
- E) V V F V

**Questão 50 (Peso 1,00)**

A dengue é uma doença viral aguda e de rápida disseminação. A notificação oportuna dos casos é medida essencial para que a vigilância seja capaz de acompanhar o padrão de transmissão da doença na área, e a curva endêmica (BRASIL, 2009, p. 45).

Em relação à atuação e ao acompanhamento dos casos de Dengue por parte da vigilância epidemiológica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Considerando um período não epidêmico, os casos suspeitos e não confirmados deixam de ser de notificação compulsória.
- ( ) As unidades de saúde são as principais fontes de detecção dos casos suspeitos de dengue e, também, fontes de dados para os serviços de vigilância.
- ( ) A Dengue é um agravo de notificação compulsória e, portanto, todos os casos suspeitos devem ser notificados obrigatoriamente, mesmo aqueles não confirmados.
- ( ) Recomenda-se o período de outubro a maio para intensificação deste monitoramento, pois, de maneira geral no país, corresponde ao intervalo da sazonalidade de transmissão da doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F F V F
- D) F V V V
- E) F V F V