

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência na instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A atuação do psicólogo em um hospital pode ocorrer nos níveis psicoterapêutico, psicoprofilático e psicopedagógico.
- () O nível psicodiagnóstico de atuação trata da atenção primária, ou seja, o objetivo é, exclusivamente, a prevenção de doenças.
- () O nível de atuação que envolve as intervenções psicoterápicas em si, com aplicação de técnicas e de procedimentos específicos, recebe o nome de psicoterapêutico.
- () O nível de atuação psicopedagógica no hospital trata de fornecer as devidas informações ao paciente sobre fatores de risco e de proteção, sobre o estado geral de saúde, procedimentos, diagnósticos e prognósticos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) V F F F
- D) F V V F
- E) F F V V

Questão 17 (Peso 0,50)

Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência psicoterápica no *setting* terapêutico da instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O cliente hospitalizado não deve ser abordado pelo psicólogo em seu próprio leito, pois sequer tem claro qual o papel do psicólogo naquele momento de sua hospitalização e até mesmo de sua vida.
- () Independente da abordagem teórica, os objetivos principais da psicoterapia são levar o paciente ao autoconhecimento, ao autocrescimento e à cura de determinados sintomas, inclusive, no contexto hospitalar.
- () Os clientes hospitalizados encaminhados à psicoterapia reservam a si o direito de rejeitar tal encaminhamento, e a opção do cliente de receber ou não esse tipo de intervenção deve ser soberana e deliberar a prática do psicólogo.
- () atendimentos psicológicos devem ser evitados em enfermarias para que não sejam interrompidos pela equipe, seja para prescrição médica em determinados horários, para aplicação de injeções, seja, ainda, para limpeza e assepsia hospitalar, por exemplo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 18 (Peso 0,50)

_____ é o atendimento psicológico que “[...] pressupõe a necessidade de manter profissionais de psicologia [...] à disposição de uma dada comunidade ou instituição por períodos determinados ou ininterruptos” (MAHFOUD, 2012 apud COMIN, 2015, p. 163)

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Clínica Peripatética
- B) Plantão Psicológico
- C) Sobreaviso Psicoterápico
- D) Acompanhamento Terapêutico
- E) Programa de Intensificação de Cuidados

Questão 19 (Peso 0,50)

Com relação à diferença entre a relação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Na relação transdisciplinar, as ações são definidas e estabelecidas em conjunto.
- () A relação interdisciplinar exige uma flexibilidade epistemológica que permita transcender os limites de atuação do núcleo em direção ao campo mais vasto.
- () Na relação multidisciplinar, diversos profissionais atendem a um único paciente de forma independente, com olhar somente para sua especificidade de atuação.
- () A relação interdisciplinar acontece quando alguns profissionais discutem entre si a situação de um paciente sobre características comuns a mais de uma especialidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V F
- E) F V F F

Questão 20 (Peso 0,50)

Em uma conjuntura de hospitalização, _____ torna-se de essencial relevância, não apenas porque o paciente já deve ter sido submetido a várias entrevistas diagnósticas, como também porque o seu estado mental ou, mesmo, uma possível impregnação por medicamentos pode torná-lo menos acessível ou motivado para o tipo de exame que está sendo sugerido. Então, a entrevista inicial e _____ para a administração de instrumentos, exatamente por se tratar em geral de um processo diagnóstico multidisciplinar, praticamente, podem se superpor, porque não há necessidade de mobilizar tanto o paciente com perguntas, cujas respostas já constam nos prontuários, e porque os objetivos da avaliação já estão bem claros e definidos.

A alternativa que preenche, corretamente, ambas as lacunas do trecho acima é

- A) o rapport
- B) a congruência
- C) a atitude ética
- D) a intuição profissional
- E) a consideração positiva incondicional

Questão 21 (Peso 0,75)

Com relação à atuação do psicólogo frente à hospitalização de adultos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () No atendimento ao paciente adulto hospitalizado, o psicólogo intensivista permite que o paciente tenha uma livre expressão de seus sentimentos, medos e desejos, propiciando uma elaboração do processo de adoecimento.
- () Lidar com a mudança de comportamento decorrente de tratamentos invasivos e das intervenções que aumentam a sobrevida, bem como do sofrimento daí advindo, constitui um exemplo de situação que requer orientação da Psicologia Intensiva junto aos pacientes adultos.
- () A atuação do psicólogo junto a pacientes adultos na UTI se justifica na necessidade de suporte psicoterápico que o paciente necessita, devido à possibilidade de apresentar uma série de distúrbios/transtornos psíquicos, relacionados ou não ao processo de adoecimento e à própria internação na UTI.
- () Muitas vezes observa-se, nos psicólogos que atuam junto a adultos hospitalizados em UTI, um raro uso de mecanismos de defesa devido ao desgaste emocional intenso, à responsabilidade, ao cansaço e às difíceis relações estabelecidas nas equipes multiprofissionais, atestando um possível distanciamento emocional e embotamento afetivo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V V F
- C) V F V V
- D) F F F V
- E) F V V F

Questão 22 (Peso 0,75)

Quando o adolescente é hospitalizado, depara-se, frequentemente, com uma situação completamente nova e desconhecida, tendo que se submeter a tratamentos, exames e procedimentos muitas vezes invasivos e/ou dolorosos.

Sobre o atendimento psicológico ao adolescente hospitalizado, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O desenvolvimento do paciente hospitalizado pode ficar comprometido pelas experiências que ele se vê obrigado a enfrentar.
- () O adolescente hospitalizado defronta-se com seu novo status de doente e passa a ocupar um espaço que o despersonaliza, longe dos seus pertences e de sua identidade.
- () A experiência mais difícil frente ao adoecimento se refere ao afastamento das pessoas significativas e queridas à criança e ao adolescente, gerando sentimento de abandono.
- () A separação da figura materna no processo de hospitalização, invariavelmente, acarreta diversos problemas, dentre os quais: depressão, ansiedade, psicose, atraso no desenvolvimento, agitação psicomotora, bruxismo e falta de colaboração no tratamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F F
- C) V F V F
- D) F V V V
- E) F F V V

Questão 23 (Peso 0,75)

Com relação à atuação do psicólogo hospitalar frente ao paciente pediátrico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Quando as crianças são hospitalizadas, passam por quatro fases: revolta, negativismo, apatia e aceitação.
- () Na fase do negativismo, a criança se rebela com o internamento e os procedimentos invasivos, passando a se negar a colaborar.
- () A fase da apatia só é convertida em aceitação a partir do processo de formação de vínculos com a equipe a partir da aquiescência dos cuidados oferecidos.
- () A despersonalização atinge a criança hospitalizada quando se espera que ela se comporte de maneira submissa às regras do hospital, incluindo seus horários para dormir, comer e receber visitas, além de se disponibilizar a procedimentos diversos quando a equipe ordena.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V F V V
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V F F

Questão 24 (Peso 0,75)

Dentre os aspectos avaliados na consulta psicológica do paciente internado, _____ é um acontecimento de difícil assimilação por parte do sujeito e que por isso mesmo deflagra ou ajuda a deflagrar o processo de adoecimento.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o retorno do recalçado
- B) a transferência traumática
- C) o estresse pós-traumático
- D) o ganho secundário reverso
- E) a situação vital desencadeante

Questão 25 (Peso 0,75)

Com relação ao atendimento psicológico hospitalar aos familiares dos pacientes hospitalizados, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Junto à família, o psicólogo hospitalar deve evitar dar ensejo ao medo da perda do paciente para não gerar uma iatrogenia.
- () O psicólogo hospitalar atua com a possibilidade de auxílio na reorganização egóica do todo familiar do paciente frente ao sofrimento atual.
- () A atuação do psicólogo hospitalar junto à família visa a minorar a elaboração de fantasias, medos e angústias próprios de um momento como este.
- () Cabe ao psicólogo hospitalar, a detecção de focos de ansiedade e de dúvidas no grupo familiar, levando a sua diminuição ou extinção, promovendo a uma aproximação do grupo familiar frente à equipe de saúde, facilitando a comunicação e contribuindo para o tratamento do paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 26 (Peso 0,75)

Com relação ao que é avaliado nas etapas da interconsulta psicológica, analise as opções e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Técnicas a serem utilizadas em psicoterapia breve.
- () Compreensão geral dos aspectos clínicos do paciente.
- () Expectativas da equipe em relação à atuação do psicólogo.
- () Medidas de proteção e de segurança necessárias para o atendimento ao paciente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F V V V
- E) F F V F

Questão 27 (Peso 0,75)

Com relação à atuação do psicólogo intensivista, é correto afirmar que

- A) as intervenções psicológicas em UTI podem ser realizadas apenas com o paciente e a família, se houver autorização dos responsáveis legais para tanto.
- B) as intervenções psicológicas mais utilizadas são psicodiagnóstico, orientação, psicoterapia, rapport e entrevista motivacional. Dependendo do caso e da especialidade da UTI, outros objetivos podem existir.
- C) a ação do psicólogo na UTI se deve ao apoio psicoterapêutico que a família demanda devido aos transtornos psicossociais que podem vir a causar, relacionados ou não ao processo do adoecimento e do internamento na UTI.
- D) na UTI, devido aos riscos envolvidos, o psicólogo evita que o paciente tenha uma expressão livre de seus sentimentos, medos ou desejos, proporcionando-lhe uma elaboração do processo do adoecimento, apenas, após a saída da unidade.
- E) lidar com a aflição, a dor e a mudança de comportamento em decorrência de tratamentos invasivos e com as intervenções, que visam a aumentar a sobrevida, constitui um exemplo de situação que requer orientação da Psicologia Intensiva.

Questão 28 (Peso 0,75)

Com relação à atuação do psicólogo nas unidades de urgência, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O psicólogo não deve esquecer que é um catalisador dos processos emocionais surgidos dentro da realidade institucional da unidade de urgência.
- () O psicólogo coopera com a equipe trabalhando na preparação do paciente, auxiliando-o a controlar a ansiedade e fornecendo informação adequada e suficiente.
- () Auxiliar na criação de um clima de confiança entre profissionais e paciente, permitindo ao paciente a verbalização dos medos suscitados pelas perspectivas de tratamento são atuações possíveis ao psicólogo na unidade de urgência.
- () Quando o paciente da unidade de urgência descrever suas dores, incômodos, almejando reabilitação e reestruturação de vida, devido à instabilidade do setting em questão, cabe imediatamente ao psicólogo o dever ético deontológico de solicitar formalmente à família e ao serviço social da unidade o encaminhamento externo do mesmo para uma psicoterapia após a intervenção em caráter de urgência.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V V
- C) V V V F
- D) F V F F
- E) F V V F

Questão 29 (Peso 0,75)

As _____, do ponto de vista psicológico, caracterizam-se por uma _____, na qual o sujeito não encontra meios de fazer valer a _____, como forma de enfrentamento, estando mergulhado nesse mar de sensações cruas e intensas.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) demandas emergentes / imprevisibilidade / socialização
- B) psicoterapias breves / conveniente celeridade / transferência
- C) situações de emergência / inundação do real no simbólico / simbolização
- D) unidades de pronto-atendimento / pressão constante / estratégia de coping
- E) regressões psicodinâmicas / situação de intenso estresse / racionalidade basal

Questão 30 (Peso 0,75)

Com relação ao Mini-Exame de Estado Mental, é correto afirmar que

- A) requer, geralmente, de 60 a 90 minutos para ser administrado.
- B) fornece uma avaliação qualitativa do desempenho e da capacidade cognitiva do paciente.
- C) é útil na avaliação quantitativa da gravidade do prejuízo cognitivo e na documentação em série de alterações cognitivas.
- D) serve para identificar subtipos de episódios psicóticos desencadeados pelo contexto de despersonalização da hospitalização.
- E) o entrevistador é instruído a submeter o paciente a uma situação intencional de frustração, com vistas a avaliar suas reações frente à pressão, enquanto faz uma série de 11 perguntas.

Questão 31 (Peso 1,00)

Com relação ao atendimento psicológico hospitalar em ambulatório, _____ constitui-se como um instrumento metodológico empregado pelo profissional para compreender e aprimorar a assistência ao paciente no hospital geral, através do diagnóstico e do tratamento de transtornos psicológicos, problemas interpessoais e dilemas institucionais envolvendo o paciente, sua família e a equipe de saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o acolhimento inicial
- B) a psicoterapia breve
- C) a análise institucional
- D) a contrarreferência clínica
- E) a interconsulta psicológica

Questão 32 (Peso 1,00)

Sobre as etapas do acolhimento nas unidades de urgência, é correto afirmar que

- A) cabe, primordialmente, ao psicólogo, orientar sobre os benefícios do tratamento e as complicações que podem ocorrer, e flexibilizar o horário da visita quando houver necessidade.
- B) a Fase de Apoio caracteriza-se pelas orientações à família sobre o que está acontecendo com o paciente, usando-se palavras de fácil compreensão e enfatizando que tudo está sendo feito para manter a sua saúde.
- C) oferecer apoio e conforto ao paciente e à família são as principais funções da Fase de Vínculo, orientando a família sobre as condições do paciente antes da visita, identificando as necessidades de informação, e amparo do paciente e da família, buscando ajudá-los a satisfazer tais necessidades.
- D) a Fase de Acesso consiste em receber o paciente, prestando os cuidados necessários, proporcionando segurança ao paciente. Faz-se necessário adequar o ambiente de forma que os familiares tenham conforto enquanto aguardam informações, confortando-os e esclarecendo as regras e rotinas da instituição.
- E) iniciar a educação em saúde desde a internação, ao incentivar paciente e familiares a questionarem sobre suas dúvidas, possibilitando estabelecer uma relação de confiança, na qual o paciente e a família sintam-se seguros e possam expressar suas dúvidas, medos e angústias são atribuições prioritárias do enfermeiro da unidade, portanto o profissional de psicologia deve abster-se de atuar neste mister.

Questão 33 (Peso 1,00)

Na _____, o sofrimento se tornou insuportável para o sujeito, impossível de ser expresso em _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) simbolização / mecanismos de defesa
- B) urgência subjetiva / palavras e imagens
- C) angústia de castração / fantasias oníricas
- D) situação de emergência / alguns minutos
- E) internação hospitalar / situação de institucionalização

Questão 34 (Peso 1,00)

_____ caracteriza indivíduos ambiciosos, competitivos, impacientes, que necessitam aparentar ser fortes. São indivíduos que procuram fazer mais e mais em menos tempo. Apresentam correlação estatística importante com coronariopatia, pois seu padrão de personalidade favorece a emergência da doença.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Personalidade Tipo A
- B) Personalidade Tipo B
- C) Personalidade Tipo C
- D) Personalidade Anancástica
- E) Transtorno de Personalidade Borderline

Questão 35 (Peso 1,00)

A intensidade, forma e duração da resposta do paciente à cirurgia oncológica está relacionada com sua _____, com o modo como foi preparado (_____) e como foi conduzido, e o comportamento de seus familiares e dos profissionais de saúde. Isto determina sua _____ e _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) metástase / cuidados paliativos / aceitação / ortotanásia
- B) enfermidade / empatia / convalescência / retorno às atividades
- C) personalidade / psicoprofilaxia / desadaptação afetiva / luto corporal
- D) recuperação / instrumentação cirúrgica / conduta anestesiológica / nível de consciência
- E) atividade de vida diária / acompanhamento terapêutico / estratégia de enfrentamento / coping

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

Considerando um bebê a termo e com desenvolvimento neuropsicomotor adequado, é esperado que ele sustente a cabeça a partir de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) 1 mês
- B) 3 meses
- C) 6 meses
- D) 10 meses
- E) 11 meses

Questão 37 (Peso 1,00)

Nas crianças, alguns automatismos infantis (denominados reflexos primitivos) aparecem durante a gestação, costumam ser evidentes ao nascer e desaparecem em idades definidas.

O reflexo _____ desaparece entre os seis e oito meses de vida e é obtido através do exame neurológico de lactentes por meio do toque da sola do pé na base dos artelhos e tem como resposta o encurvamento dos artelhos.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) de Moro
- B) de Landau
- C) fundamental
- D) da preensão plantar
- E) da preensão palmar

Questão 38 (Peso 1,00)

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de mortalidade e morbidade no Brasil e no mundo. Em relação as definições acerca do AVC, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e **F** as falsas.

- () A hemorragia subaracnóidea (HSA) decorre, principalmente, da ruptura de aneurismas saculares intracranianos.
- () O conceito clássico de acidente isquêmico transitório (AIT) se caracteriza por um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e reversível, secundário a uma doença vascular isquêmica, com duração menor que 48 horas.
- () A hemorragia intraparenquimatosa decorre, predominantemente, do rompimento de arteríolas penetrantes, secundário à degeneração da parede vascular, ocasionada, na grande maioria dos casos, por hipertensão arterial crônica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F V
- C) V F F
- D) V V F
- E) V F V

Questão 39 (Peso 1,00)

Um paciente do sexo masculino de 65 anos, vítima de um acidente vascular encefálico isquêmico (AVCi) em artéria cerebral média esquerda, tem como sequela uma afasia de expressão. Durante investigação, foram realizados um Doppler de carótidas, que acusou uma placa aterosclerótica de 30% em bulbo de artéria carótida direita, e um eletrocardiograma, que indicou uma fibrilação atrial crônica.

O subtipo etiológico mais provável do AVCi desse paciente é

- A) cardioembólico.
- B) dissecação arterial.
- C) secundário à trombofilia.
- D) oclusão de pequenas artérias.
- E) aterosclerótico de grandes vasos

Questão 40 (Peso 1,00)

O acidente vascular isquêmico deve ser suspeitado clinicamente sempre que ocorra um déficit neurológico focal de instalação súbita ou rapidamente progressiva. Os sintomas apresentados irão diferir a depender da circulação arterial acometida. Considerando os sintomas característicos da circulação arterial acometida, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|--------------------------------|-----|--|
| (1) Artéria Basilar | () | Alteração de campo visual. |
| (2) Artéria Cerebral Média | () | Afasia e fraqueza com predomínio braquiofacial. |
| (3) Artéria Cerebral Anterior | () | Sinais de frontalização e fraqueza com predomínio crural. |
| (4) Artéria Cerebral Posterior | () | Rebaixamento de nível de consciência e alteração dos nervos cranianos. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 4 3
- B) 2 1 3 4
- C) 3 1 4 2
- D) 4 1 2 3
- E) 4 2 3 1

Questão 41 (Peso 1,00)

Alterações estruturais e funcionais começam a ocorrer após um(a) _____. Surge um(a) _____ propriamente dito(a), no(a) qual o dano funcional e estrutural é irreversível, e uma região funcionalmente comprometida, porém estruturalmente viável, denominada _____.

Considerando a fisiopatologia do acidente vascular cerebral, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) agressão isquêmica / zona de penumbra isquêmica / infarto cerebral
- B) agressão isquêmica / infarto cerebral / zona de penumbra isquêmica
- C) infarto cerebral / agressão isquêmica / zona de penumbra isquêmica
- D) agressão hemorrágica / infarto cerebral / zona de penumbra hemorrágica
- E) agressão hemorrágica / zona de hemorragia/ zona de penumbra hemorrágica

Questão 42 (Peso 1,00)

Sobre o exame neurológico, é correto afirmar que

- A) a marcha "em tesoura" está presente em pacientes com vestibulopatia.
- B) a hipertonia espástica está presente em pacientes com doença de Parkinson e outras síndromes Parkinsonianas.
- C) a dismetria e a disdiadococinesia estão presentes na avaliação da coordenação em pacientes com patologias cerebelares.
- D) o sinal de Babinsk está presente em pacientes com acometimento do neurônio motor periférico (síndrome do segundo neurônio motor).
- E) uma característica do exame neurológico de um paciente portador de uma paralisia facial periférica (ex: Paralisia de Bell) é a fraqueza da musculatura dos 2/3 inferiores da hemiface.

Questão 43 (Peso 1,00)

A miastenia gravis (MG) é uma doença _____ que afeta a junção neuromuscular na porção _____ e se caracteriza, clinicamente, por uma fraqueza muscular do tipo _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) autoimune / pré-sináptica / súbita
- B) autoimune / pré-sináptica / flutuante
- C) autoimune / pós-sináptica / flutuante
- D) degenerativa / pré-sináptica / progressiva
- E) degenerativa / pós-sináptica / progressiva

Questão 44 (Peso 1,00)

Dentre as escalas de avaliação funcional do paciente neurológico, a escala de Rankin é muito utilizada devido a sua praticidade e fácil reprodutibilidade.

Imagine que você está avaliando um paciente de 65 anos, vítima de um acidente vascular isquêmico, e que, no momento, se apresenta com algumas sequelas, requerendo alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência (pode usar bengala ou andador).

A classificação desse paciente, de acordo com a escala funcional de Rankin, é

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Questão 45 (Peso 1,00)

A avaliação funcional do paciente com AVC deve ser _____ e contextualizada, a partir _____ e do trabalho em parceria com a família e/ou cuidadores, permitindo o diagnóstico funcional mais acurado e melhor prognóstico, principalmente quando estes agentes estão consonantes. Para identificação do nível de acometimento destas funções, é estritamente necessário que a avaliação da pessoa que sofreu um ou mais eventos de AVC seja feita por equipe _____, e que os vários aspectos possivelmente comprometidos sejam abordados da forma mais sinérgica e completa possível. (BRASIL, 2013).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) coletiva / dos potenciais / multidisciplinar
- B) individualizada / dos potenciais / multidisciplinar
- C) individualizada / das deficiências / multidisciplinar
- D) coletiva / das deficiências / de médicos e fisioterapeutas
- E) individualizada / dos potenciais / de fonoaudiólogos e fisioterapeutas

Questão 46 (Peso 1,00)

“O posicionamento terapêutico é uma forma de intervenção que permite o desenvolvimento de respostas adaptativas semelhantes àquelas apresentadas por recém-nascidos a termo (RNT) saudáveis. Tem como objetivo promover a regulação do estado neurocomportamental e autorregulação, proporcionar suporte postural e de movimento, facilitar a participação das crianças nas experiências sensorio motoras normais, otimizar o desenvolvimento musculoesquelético e o alinhamento biomecânico” (SARMENTO 2011, p.356).

Considerando as particularidades de cada tipo de posicionamento, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| (1) Posição prono | () | Reduz a pressão intracraniana e favorece a sincronia toracoabdominal. |
| (2) Posição supino | () | Aumenta o tempo de sono profundo e diminui a frequência cardíaca e respiratória. |
| (3) Decúbito lateral | () | Facilita o esvaziamento gástrico e favorece o alcance da linha média e do comportamento mão-boca. |
| | () | Diminui a incidência para a síndrome da morte súbita e ocasiona assimetria na região occipital. |
| | () | Favorece a rotação da cabeça, preferencialmente, para o lado direito e permite movimentação ampla de MMSS e MMII. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 1 3 2 2
- B) 1 2 3 2 1
- C) 2 1 1 3 2
- D) 2 2 3 1 2
- E) 3 1 2 2 1

Questão 47 (Peso 1,00)

Com base na classificação de risco em emergências neurológicas, _____ é uma situação de nível **Vermelho** com prioridade zero (emergência), portanto com necessidade de atendimento imediato.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima

- A) crise convulsiva (inclusive pós-crise)
- B) crise de cefaleia com diagnóstico de enxaqueca
- C) trauma cranioencefálico leve (Glasgow entre 13 e 15)
- D) cefaleia intensa de início súbito ou rapidamente progressiva
- E) politraumatizado com Glasgow entre 13 e 15 sem alterações de sinais vitais

Questão 48 (Peso 1,00)

As células da glia compõem o sistema nervoso central e periférico e ocupam os espaços entre os neurônios. Sobre a anatomia e a fisiologia das células da glia, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os astrócitos possuem função de sustentação e isolamento dos neurônios.
- () Cada célula de Schwann forma a bainha de mielina de um internódulo neuronal.
- () As células satélites nutrem e protegem os neurônios e estão localizadas no sistema nervoso central.
- () Os oligodendrócitos formam a bainha de mielina criando uma barreira de baixa resistência ao fluxo de íons para o meio extracelular.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F
- B) F V F F
- C) V F V V
- D) V F F V
- E) V V F V

Questão 49 (Peso 1,00)

A avaliação funcional adequada da criança internada na unidade de Terapia Intensiva Pediátrica permite a programação adequada da assistência. Alguns instrumentos são rotineiramente utilizados nessa avaliação.

Correlacione os testes às suas características de aplicabilidade e numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|--|--|
| (1) Teste de triagem de Denver II | () Avalia crianças de seis meses a sete anos e seis meses nos domínios mobilidade, autocuidado e função social. |
| (2) Teste de esforço cardiopulmonar (TECP) | () Avalia crianças de um a 42 meses nos domínios: cognitivo, motor, linguístico, socioemocional e comportamento adaptativo. |
| (3) Inventário portage operacionalizado (IPO) | () Avalia crianças de zero a seis anos nos domínios: cognição, socialização, autocuidado, linguagem e desenvolvimento motor. |
| (4) Escala Bayley de desenvolvimento infantil | () Avalia crianças de zero a seis anos, sendo bastante utilizado devido a rápida aplicação e facilidade de compreensão e execução. |
| (5) Inventário de avaliação pediátrica da disfunção (PEDI) | () Define mecanismos relacionados à baixa capacidade funcional, correlacionando-os com alterações nos sistemas cardiovascular, pulmonar e musculoesquelético. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 4 5
- B) 3 2 1 5 4
- C) 4 1 5 3 2
- D) 5 4 3 1 2
- E) 5 3 4 2 1

Questão 50 (Peso 1,00)

O desenvolvimento estrutural do cérebro é orientado pelas experiências vividas, e a hospitalização é uma agente importante no comprometimento da independência funcional. Dessa forma, a assistência fisioterapêutica numa Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica deve tomar como base o desenvolvimento normal da criança para que consiga detectar atrasos e variações da normalidade.

Tomando como base os marcos do desenvolvimento no primeiro ano de vida, é correto afirmar que a criança

- A) no décimo segundo mês, já pode apresentar marcha com balanço recíproco de MMSS.
- B) no quinto mês, já leva os pés à boca, senta sem apoio e passa os objetos de uma mão para a outra.
- C) no décimo mês, é capaz de andar sem suporte em MMSS e de engatinhar com algum objeto na mão.
- D) no oitavo mês apresenta movimento de pinça, pode começar a engatinhar e, estando sentada, roda o tronco.
- E) no terceiro mês de vida, apresenta déficit na contração abdominal, sorriso espontâneo e as mãos já devem estar na linha média.