

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

As práticas em enfermagem são permeadas por tecnologias. As do tipo leve, por exemplo, são relativas ao cuidado mais próximo do usuário, utilizando a escuta como ferramenta de comunicação e são consagradas por melhores resultados prognósticos.

Considerando as tecnologias leves, _____ é a característica mais próxima da humanização do cuidado, sobretudo, na atenção primária em saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) a estrutura física da unidade básica de saúde
- B) o conjunto de equipamentos utilizados pela equipe de enfermagem
- C) o vínculo firmado entre o profissional de enfermagem e os usuários
- D) a Rede de Atenção, composta pela principal porta de entrada – a Estratégia de Saúde da Família,
- E) a integralidade da atenção, um dos princípios do Sistema Único de Saúde, associada ao processo de enfermagem, centrado na clínica e no modelo de cuidado curativista,

Questão 17 (Peso 0,50)

Durante a verificação dos sinais vitais, permitida mediante valores registrados em monitor multiparamétrico, em uma enfermaria de clínica médica, o enfermeiro deve _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) calcular a média da temperatura
- B) registrar apenas a pressão arterial para os pacientes hipertensos
- C) zerar a cabeceira do paciente para medir a frequência respiratória, se for uma pessoa em dispneia
- D) atentar para a proximidade entre os valores de pulso e de frequência cardíaca para não haver dúvidas
- E) calcular os valores de pressão da artéria pulmonar, se o paciente não estiver em uso de cateter de pressão arterial invasiva

Questão 18 (Peso 0,50)

“Um plano de contingência é essencialmente voltado para ações preventivas, preditivas e reativas. Apresenta uma estrutura estratégica e operativa que ajudará a controlar uma situação de emergência e a minimizar as suas consequências negativas. Ele propõe uma série de procedimentos alternativos ao funcionamento normal de uma organização, sempre que alguma das suas funções usuais se vê prejudicada por uma contingência interna ou externa” (MARTINS, 2017, p. 1). No caso do serviço hospitalar de urgência, algumas inconformidades podem acontecer, sendo agravante o fato de estar cuidando de pessoas com problemas de saúde diversos. O que torna, de todo modo, indispensável o cuidado com as ocorrências de eventuais inconformidades em todo o ambiente hospitalar.

Considerando que o Enfermeiro responsável pela gestão de uma unidade de urgência e emergência hospitalar esteja elaborando um Plano de Contingência para esta unidade, ele deve observar que _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) o atendimento pré-hospitalar não gera contingências
- B) a reserva de aparelhos de uso no cuidado é uma prioridade
- C) os recursos humanos de enfermagem não geram contingências
- D) a área administrativa tem baixo impacto na contingência interna
- E) as contingências tecnologias e energia elétrica são menos prioritárias

Questão 19 (Peso 0,50)

A falência terapêutica em pessoas com hanseníase é um evento que pode acontecer, em situações específicas. Neste tipo de falência, o paciente não apresenta sinais de melhora clínica durante tratamento regular e adequadamente indicado com doses de medicamentos em tempo correto.

Para o devido controle da hanseníase, se o paciente já estiver em alta do tratamento, a notificação de casos de falência terapêutica deve ser feita utilizando a opção _____ como modo de entrada.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) recidiva
- B) resistentes
- C) outros reingressos
- D) incapacitantes medicamentosos
- E) pós-alta por recidiva com resistência terapêutica

Questão 20 (Peso 0,50)

Considerando as características das vias comuns de administração de medicamentos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Via intravenosa () Adequada para administração de veículos oleosos.
- (2) Via subcutânea () Inadequada para administração de grandes volumes.
- (3) Via intramuscular () Inadequada para administração de substâncias pouco hidrossolúveis.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2
- B) 1 2 3
- C) 2 1 3
- D) 3 1 2
- E) 3 2 1

Questão 21 (Peso 0,75)

“O tratamento diretamente observado constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos, porém sem mudanças no esquema terapêutico: o profissional treinado passa observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura” (BRASIL, 2011, p. 28).

Considerando as modalidades de supervisão do tratamento diretamente observado da tuberculose, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os Agentes Comunitários de Saúde não podem fazer tal supervisão.
- () Os horários e os dias são definidos pelos profissionais de saúde na supervisão domiciliar.
- () A supervisão pode ser delegada aos responsáveis legais treinados, nos casos excepcionais.
- () Essa supervisão não pode acontecer em ambiente hospitalar, por conta da transmissão cruzada.

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) F V F F
- D) F F V F
- E) F F F V

Questão 22 (Peso 0,75)

“A situação atual apresentada no último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado dia 31/10/2017, ainda apresenta números significativos de casos de sífilis na população. Vários fatores do comportamento sexual dos brasileiros devem ser observados e, apesar das ações governamentais, temos um problema de saúde pública importante e com números que expressam desafios”.

Disponível em: <<http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/o-desafio-da-sifilis>>. Acesso em: 14 nov. 2017.

Considerando os objetivos do Programa Nacional de DST/AIDS, os desafios para o combate a essa doença, frente ao papel do Estado, estão concentrados _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) em medidas mais eficazes, prioritariamente, nos tratamentos de pessoas com sífilis secundária
- B) na adoção de políticas públicas capazes de atuar nos determinantes sociais de saúde e da doença
- C) na promoção de políticas prioritárias para controle e combate mais eficiente da sífilis, sobretudo, nas classificações secundária e terciária
- D) em atuar estritamente no combate à sífilis congênita, sobretudo, em maternidades públicas, cuja clientela é usuária exclusiva do Sistema Único de Saúde (SUS)
- E) em ações governamentais nos três níveis: municipal, estadual e federal, fazendo com que as ações planejadas pelos municípios, em nível local, estejam sob as do Ministério da Saúde

Questão 23 (Peso 0,75)

O advento das vacinas e o seu aprimoramento com passar dos anos, acompanhada de inovações importantes têm gerado inúmeros benefícios para a humanidade. E o que chama a atenção é o fato de ter, no Brasil, uma procura por vacinas entre as diversas classes sociais, o que tem se configurado como uma política de tendência universalizante no quesito acesso.

Considerando o calendário vacinal do grupo-alvo crianças, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A vacina Rotavírus é administrada, em três doses, com reforço aos nove meses.
- () A vacina BCG é administrada ao nascer e em dose única, e não precisa de reforço.
- () A primeira dose da vacina Hepatite B é administrada ao nascer, com as demais doses aos três e seis meses depois da primeira.
- () As primeiras doses das vacinas pentavalente e influenza são administradas ao nascer, em seguida, são intervaladas a cada dois meses até completar a terceira dose aos seis meses.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V V F V
- C) F F V V
- D) F F F F
- E) F V F F

Questão 24 (Peso 0,75)

O Ministério da Saúde anunciou mudança para o esquema vacinal para combate à febre amarela, sendo de fato uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a qual qualifica a nova medida como segura e que protege as pessoas do vírus.

Sobre o esquema vacinal dessa vacina para um adulto não viajante para o exterior, é correto afirmar que

- A) a segunda dose é administrada aos 20 anos.
- B) os reforços são realizados a cada cinco anos.
- C) as doses se assemelhavam às da vacina Hib.
- D) a dose única é a recomendação atualizada neste esquema.
- E) os idosos acima de 65 anos não têm indicação, por causar anafilaxia.

Questão 25 (Peso 0,75)

Quando o foco do cuidado é a prevenção de infecções em pessoas submetidas à cirurgia, algumas ações não podem ser negligenciadas, sobretudo, a lavagem das mãos, que é uma estratégia simples, não cara, com grande impacto, sendo, por isto, muito difundida pelos órgãos internacionais e nacionais da área de controle de infecções em serviços de saúde.

Sobre a lavagem das mãos como estratégia para prevenção e controle de infecção hospitalar, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Deve-se lavar as mãos, obrigatoriamente, antes de tocar no paciente.
- É prescindível lavar as mãos após retirar luvas utilizadas no curativo de ferida operatória.
- É facultado lavar as mãos, quando o profissional for tocar superfícies inanimadas no leito.
- É necessário usar álcool em gel a 98,7% e sabão, simultaneamente, para dar maior segurança ao profissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V V F
- C) V V F F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 26 (Peso 0,75)

A hipertensão arterial (HA) é um grave problema de saúde pública, em nível global, à medida que diminui a sobrevida e aumenta a mortalidade e a morbidade.

Sobre os objetivos da investigação clínico-laboratorial da HA, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Diagnosticar a hipertensão secundária.
- Dispensar a identificação dos fatores de risco para doenças cardiovasculares.
- Estratificar o risco cardiovascular, exclusivamente, naqueles com acidente vascular.
- Avaliar as lesões de órgãos-alvo (rins, cérebro, coração, etc.) e a presença de doença cardiovascular.
- Recomendar mudanças de hábitos alimentares e do estilo de vida, estritamente, naqueles com suspeita de desenvolver acidente vascular encefálico.
- Ratificar diagnóstico, após mensurar a pressão arterial em momentos de educação em saúde, quais sejam, feiras de saúde, eventos em comunidades, eventos festivos etc.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F V
- B) V V V F V F
- C) V V V V F F
- D) F V V F V V
- E) F F V V F V

Questão 27 (Peso 0,75)

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é um método que organiza o trabalho profissional da enfermagem, atentando para os aspectos recursos humanos, tecnologias da atenção à saúde e processos assistenciais, tornando possível a operacionalização do cuidado de enfermagem.

Sobre as formas de sistematizar a assistência de enfermagem, é correto afirmar que

- A) os protocolos clínicos não estão contemplados.
- B) a escala diária de enfermagem não requer tal sistematização.
- C) os fluxos instituídos contribuem para o aspecto logístico do cuidado.
- D) a segurança clínica é pouco contemplada, por ser muito relacionada com a conduta interdisciplinar do cuidado.
- E) o cuidado transdisciplinar é o maior desafio, por conta de a enfermagem ser limitada em, por exemplo, prescrever medicamentos e solicitar exames.

Questão 28 (Peso 0,75)

“As doenças cerebrovasculares estão no segundo lugar no topo de doenças que mais acometem vítimas com óbitos no mundo, perdendo a posição apenas para as doenças cardiovasculares. As pesquisas indicam que esta posição tende a se manter até o ano de 2030”. Sabe-se que o atendimento rápido e preciso pode contribuir para redução do número de complicações e morbidades.

Disponível em: <<http://www.redebrasilavc.org.br/para-profissionais-de-saude/manual-de-rotinas/>>. Acesso em: 17 dez. 2017.

Considerando que o enfermeiro esteja diante de atendimento com vítima acompanhada por cuidadora domiciliar, apresentando confusão mental, crise convulsiva, desvio de rima labial, perda da força e do equilíbrio, os cuidados de enfermagem incluem _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) investigação do último sintoma apresentado
- B) aplicação da escala de coma de Ramsay para ver consciência
- C) verificação da pressão, se iniciar esmolol prescrito pelo médico
- D) acompanhamento da pressão arterial, aceitando a diastólica em até 180 mmHg
- E) início de endarterectomia, por estar em suspeita diagnóstica de estenose carotídea

Questão 29 (Peso 0,75)

A resolução COFEN nº 358/2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. Considerando as etapas do processo de enfermagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

Com relação às etapas do Processo de Enfermagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|---------------------|---|
| (1) Avaliação | () Realização das ações ou intervenções determinadas no planejamento de enfermagem. |
| (2) Diagnóstico | () Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados, que culmina com a tomada de decisão. |
| (3) Planejamento | () Determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações e intervenções de enfermagem que serão realizadas. |
| (4) Implementação | () Verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença. |
| (5) Coleta de dados | () Utiliza-se métodos e técnicas variadas com o objetivo de obter informações sobre a pessoa, família ou coletividade em um dado momento do processo saúde-doença. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 5 3 4
- B) 1 5 4 2 3
- C) 4 3 5 1 2
- D) 4 1 3 5 2
- E) 4 2 3 1 5

Questão 30 (Peso 0,75)

As dislipidemias em pessoas portadoras de Diabetes são muito estudadas pelas Sociedades de Endocrinologia e Metabologia e de Cardiologia, que determinam novos parâmetros para o controle dessas doenças, quando há riscos para aquelas cardiovasculares. O risco cardiovascular _____, por exemplo, inclui pacientes com diabetes, que não tiveram eventos vasculares ou que não têm doença aterosclerótica avançada, mas que têm evidência de aterosclerose subclínica.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) alto
- B) baixo
- C) muito alto
- D) muito baixo
- E) intermediário

Questão 31 (Peso 1,00)

As penicilinas são muito usadas nos tratamentos de diversas doenças, sendo sua apresentação em Unidade Internacionais (UI).

Considerando a situação hipotética em que uma criança tem, prescrito por médico, o uso de 400 UI a cada oito horas, é correto afirmar que

- A) por ser medicamento liofilizado, a diluição deve ser em 10 ml para ser administrado em via subcutânea.
- B) para ampolas com o medicamento liofilizado com 1.000.000 UI, formando 10 ml do composto, o administrado é 4/250 ml por dia.
- C) ao diluir o medicamento em 8 ml de água destilada, considerando ampola com 5.000.000 UI, o administrado é 0,040 ml por dia.
- D) para frascos com o medicamento liofilizado com 1.000.000 UI, formando 10 ml do composto, o administrado é 0,004 ml por dose.
- E) ao diluir o medicamento em 8 ml de água destilada, considerando ampola com 5.000.000 UI, o administrado é 2/225 ml em duas doses.

Questão 32 (Peso 1,00)

Em pessoas submetidas à ventilação mecânica invasiva, o uso de tubo oro/nasotraqueal ou uma traqueostomia é indispensável.

Considerando os cuidados de enfermagem para pacientes com tubo orotraqueal, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O tubo seletivo quer dizer que está em via esofágica.
- () A posição incorreta do tubo impede que seja dado banho no momento.
- () A higiene oral é importante para evitar infecções do trato respiratório inferior.
- () Uma forma de saber se o tubo está mal posicionado é fazendo ausculta pulmonar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F V V V

Questão 33 (Peso 1,00)

Úlceras por pressão (UPP) causam danos consideráveis aos pacientes, dificultando o processo de recuperação funcional, frequentemente causando dor e levando ao desenvolvimento de infecções graves. Também têm sido associadas às internações prolongadas, à sepse e à mortalidade.

Disponível em: <<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/ulcera-por-pressao>>. Acesso em: 12 nov. 2017.

Sobre o estadiamento das UPP, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- (1) Estágio I () Eritema não branqueável.
- (2) Estágio II () Perda total da espessura da pele.
- (3) Estágio III () Perda parcial da espessura da pele.
- (4) Estágio IV () Perda total da espessura dos tecidos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 4
- B) 2 3 1 4
- C) 3 1 2 4
- D) 4 3 1 2
- E) 4 2 1 3

Questão 34 (Peso 1,00)

“A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o comportamento da doença ou agravo selecionado como alvo das ações, para que as medidas de intervenção pertinentes possam ser desencadeadas com oportunidade e eficácia.” (BRASIL, 2009, p.18).

Sobre as funções da vigilância epidemiológica, é correto afirmar que

- A) a investigação epidemiológica de campo é um método de trabalho utilizado, exclusivamente, em casos de doenças transmissíveis.
- B) a partir do processamento dos dados, deverá ser realizada a análise dos mesmos, transformando-os em informação capaz de orientar a adoção das medidas de controle.
- C) a coleta de dados deve ocorrer ao nível da atenção básica, sendo que a força e o valor da informação dependem da qualidade e fidedignidade com que a mesma é gerada.
- D) as recomendações para a aplicação de medidas de prevenção e controle devem partir das esferas mais altas do sistema de saúde, considerando ser o SUS uma rede hierarquizada.
- E) a instituição de ações de vigilância epidemiológica não implica, necessariamente, que as informações obtidas venham a ser utilizadas para a adoção de medidas específicas.

Questão 35 (Peso 1,00)

“A manutenção da tuberculose como um problema de saúde pública faz com que novas respostas sejam pensadas no sentido de promover a equidade, garantindo o acesso aos pacientes, visando não apenas o seu atendimento e bem-estar, mas, em sentido mais amplo, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) em suas diretrizes” (BRASIL, 2011, p. 168).

Dessa forma, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose compreende diversas estratégias, visando garantir a integralidade da atenção, através de ações que envolvem as três esferas de governo.

Em relação à linha de cuidado em tuberculose pulmonar, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Prevê o fornecimento gratuito e ininterrupto de medicação específica.
- () É dever do laboratório municipal garantir a realização de baciloscopia, visando o diagnóstico e o acompanhamento dos casos.
- () Privilegia a centralização das medidas de controle para a gestão estadual, por se tratar de um grave problema de saúde pública.
- () A pessoa com tuberculose pode apresentar-se em qualquer unidade de saúde, mesmo em unidades que não incluam, em sua rotina de atendimento, pacientes com a doença.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V F F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

A intubação orotraqueal através da laringoscopia direta é, geralmente, muito utilizada, sobretudo, quando há suspeita de lesão na coluna cervical.

Sobre os cuidados com a intubação orotraqueal, é correto afirmar que

- A) não é indicado o uso de relaxante muscular.
- B) deve ser mantido o fio-guia utilizado para uma boa fixação.
- C) dispensa explicação ao paciente por ser um procedimento de urgência.
- D) é recomendado pré-oxigenar o paciente antes de tentar fazer a intubação.
- E) o procedimento de aferição de pressão arterial é suficiente para começar a intubação.

Questão 37 (Peso 1,00)

Os cuidados com a via respiratória artificial podem estar indicados para pessoas com traumatismo oral ou facial, tumores, secreções respiratórias abundantes, angústia respiratória, perda da consciência com maiores repercussões respiratórias e ventilação mecânica.

Para pessoas em uso de traqueostomia, por conta da ventilação mecânica prolongada, os cuidados de enfermagem devem envolver _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) a desinfecção da cânula até o cuff
- B) a avaliação das condições da ostomia
- C) a remoção dos pontos de fixação após passagem da cânula
- D) a atenção quanto à cânula interna, se em uso, procedendo a troca por outra, quando feita de metal
- E) a atenção quanto ao balonete, quando estiver presente na cânula, mantendo-o com ar à pressão de 55 mmHg

Questão 38 (Peso 1,00)

“As práticas de precauções e isolamento vêm sendo utilizadas há muitos anos como uma estratégia para a prevenção e o controle de doenças transmissíveis. Historicamente, o destaque vem sendo dado às barreiras mecânicas, químicas e ambientais, com o intuito de interromper a cadeia epidemiológica no ambiente hospitalar” (SILVA et al, 2016, p.2).

Considerando a situação de uma pessoa hospitalizada com infecção apenas na ferida sacral por bactéria multirresistente, a precaução recomendada é _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) aérea
- B) de contato
- C) de gotícula
- D) intermitente
- E) de aerossol

Questão 39 (Peso 1,00)

O bloqueio atrioventricular total é determinante para necessidade de introduzir um marca-passo. Tal procedimento requer participação do profissional enfermeiro no preparo para inserção do dispositivo – que é feito por um médico – além de cuidado no decorrer do uso, por longo tempo de vida do paciente.

Sobre os possíveis diagnósticos de enfermagem associados ao processo que envolve o uso de marca-passo, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Distúrbio da imagem corporal.
- () Risco de lesão relacionado com hemotórax.
- () Risco de lesão relacionado com pneumotórax.
- () Dor aguda relacionada com a incisão cirúrgica, sobretudo, quando realizada punção em veia poplítea.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F F
- C) V F F F
- D) F F F V
- E) F F V V

Questão 40 (Peso 1,00)

“A Síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA), com mortalidade em até 60%, consiste em uma insuficiência respiratória aguda e grave, produzida por edema pulmonar inflamatório, com grande aumento da permeabilidade da membrana alvéolo-capilar pulmonar” (NOBEL, 2016, p. 743).

Sobre os cuidados de enfermagem para uma pessoa com diagnóstico de SDRA, o enfermeiro deve ter especial atenção _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) no momento da ventilação em posição prona
- B) na verificação dos valores de ventilação, sendo indicada alta frequência ventilatória
- C) ao registrar os valores de oximetria apresentados pelo paciente, em que se admite saturação de oxigênio (SaO₂) de até 80%
- D) na administração de medicamentos prescritos, como os glicocorticosteroides, os quais não são indicados para tratar fibrose na SDRA tardia
- E) na posição da cabeceira do leito, mantendo-a a 15 graus, além da inclinação lateral esquerda. Tudo isso por conta do maior comprometimento pulmonar

Questão 41 (Peso 1,00)

Uma lesão renal grave cronicada é suficiente para condenar uma pessoa a fazer hemodiálise até que consiga um transplante. Isto faz com que ocorram restrições alimentares e sociais, e afeta a qualidade de vida.

Sobre os cuidados de enfermagem na minimização de riscos para pessoas com lesão renal crônica, é recomendado _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) realizar balanço hídrico apenas para os casos críticos e agudos
- B) realizar balanço hídrico, se há somente uma insuficiência intermitente
- C) controlar os eletrólitos de forma imprescindível, observando sinais e sintomas
- D) adequar o uso de medicamentos, sobretudo os nefrotóxicos, não sendo a mesma conduta para as diluições
- E) controlar a ingesta de líquido, registrando entrada e saída, e calcular o balanço hídrico pela razão entre a ingesta e a eliminação

Questão 42 (Peso 1,00)

Os divertículos podem ocorrer em qualquer local do intestino delgado ou do cólon, porém são observados mais comumente no cólon sigmoide – pelo menos 95% (SMETZER et al, 2011, p. 1082).

Considerando as complicações potenciais da doença diverticulite, o enfermeiro precisa ter maior atenção à _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) gastrite
- B) entoidéite
- C) calpingite
- D) peritonite
- E) colecistite

Questão 43 (Peso 1,00)

O Sr. C.A.O, 70 anos, está na sala de recuperação pós-anestésica depois que foi submetido a uma cirurgia cardíaca demorada e com indicação médica de monitorização rigorosa pelo monitor cardíaco. Após manter certa estabilidade, ele pode retornar para internamento na enfermaria.

Considerando a situação hipotética acima e os cuidados de enfermagem em cirurgia cardíaca, é correto afirmar que

- A) a onda P não pode ser visualizada no traçado cardiográfico.
- B) o enfermeiro precisa priorizar as imagens congeladas desse monitor.
- C) a presença de onda P, no traçado cardiográfico, requer maiores cuidados.
- D) a taquicardia, a bradicardia e o desvio de ramo são visíveis na tela do monitor.
- E) no monitor, só é possível verificar e monitorar a pressão arterial, a frequência cardíaca, o pulso e a saturação de O₂.

Questão 44 (Peso 1,00)

“Um dos fatores que contribuem para a ocorrência de erros de medicação em crianças, em especial o erro de dose, advém da complexidade dos cálculos que necessitam ser realizados considerando-se idade, peso, estatura e condições clínicas da criança, uma vez que as características de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas diferem nas diferentes fases da vida [...]” (HARADA et al., 2012, p. 640). Tais erros constituem um dos eventos adversos que podem ser evitados, mediante adoção de medidas congruentes com as diretrizes de segurança do paciente.

Considerando as especificidades relativas à segurança do paciente pediátrico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A ‘regra dos 30 minutos’ também se aplica às doses de ataque.
- () Os cálculos definidos na prescrição médica são passíveis de discussão para necessárias adequações.
- () A administração de medicamentos prescritos através de meios eletrônicos não pode ocorrer em situações de necessidades iminentes.
- () A diferenciação na cor dos rótulos das ampolas de compostos para reposição de sódio e de potássio não evita eventos adversos, se indicados para administração no mesmo soro basal.

A alternativa contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V V F
- E) F V F F

Questão 45 (Peso 1,00)

Sobre os erros de medicação, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os *Erros de Medicação* podem estar relacionados aos procedimentos e sistemas da prática profissional, os quais incluem: prescrição, rotulagem, dispensação, distribuição, administração e adesão do paciente.
- () Os *Problemas Relacionados a Medicamentos* incluem também os *Erros de Medicação*, os quais podem ser definidos como: quaisquer erros que ocorram durante o processo de prescrição e utilização do medicamento.
- () Um *Quase Erro*, segundo autores brasileiros, refere-se à ocorrência de um erro na prescrição, dispensação ou administração de medicamentos a nível hospitalar, que causa ao paciente apenas desconforto passageiro e que não demanda alterações em seu processo de alta médica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F V V
- E) F V F

Questão 46 (Peso 1,00)

As intoxicações exógenas agudas têm causas e origens diversas. As condutas iniciais, de modo geral, variam desde a observação até o uso de carvão ativado e dos antídotos.

Sobre essas condutas iniciais em situações específicas, é correto afirmar que

- A) o envenenamento por antibióticos requer lavagem gástrica.
- B) a criança que ingere creme de barbear tem de ser entubada e feita lavagem do conteúdo gástrico com antídoto.
- C) a ingestão de 100 comprimidos de carbamazepina exige que se faça uso de carvão ativado, e não se deve evitar o vômito espontâneo.
- D) a ingestão de todos os comprimidos de uma cartela de anticoncepcionais orais de uma única vez exige que se faça uso de carvão via sonda.
- E) a criança de dois anos, que ingere massa de modelar de marca não especificada, precisa fazer uso de antídoto contra hidrocarboneto alcano de cadeia longa e ramificada.

Questão 47 (Peso 1,00)

Sobre as reações adversas a medicamentos (RAM), analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Reações produzidas por dose excessiva relativa são exemplos de RAM do tipo previsíveis.
- () As reações de hipersensibilidade são exemplo de reações do tipo previsíveis e dependentes da dose.
- () As RAM do tipo imprevisíveis são inesperadas em relação às propriedades farmacológicas do medicamento administrado, independentemente da dose, e ocorrem apenas em indivíduos susceptíveis.
- () As RAM do tipo previsíveis resultam de uma ação ou de um efeito farmacológico exagerado, dependem da dose empregada, e ocorrem depois da administração de um medicamento em dose terapêutica habitual.
- () A Organização Mundial da Saúde (OMS) define as RAM como qualquer resposta prejudicial, desejável ou não, e intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação de funções fisiológicas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F F V V F
- C) F F F V V
- D) V F V V V
- E) V F V V F

Questão 48 (Peso 1,00)

No Brasil, quatro tipos de acidente ofídicos (envenenamento causado pela inoculação de toxinas, através das presas de serpentes) são considerados de interesse em saúde: botrópico, crotálico, laquético e elapídico. Destes, o acidente botrópico, causado por serpentes dos gêneros *Bothrops* e *Bothrocophias* (jararaca, jararacuçu, urutu, cruzeira, caissaca), é o de maior importância e distribuição dentre os acidentes ofídicos no país. Os antivenenos (soros) disponíveis para este acidente são o soro antibotrópico (SAB), soro antibotrópico e antilaquético (SABL) e soro antibotrópico e anticrotálico (SABC).

Em relação ao tratamento utilizado nos acidentes botrópicos, é correto afirmar que

- A) o SABC deve ser utilizado em situação de falta do SAB.
- B) o SABL deve ser utilizado, prioritariamente, em qualquer situação.
- C) o SAB deve ser utilizado apenas em último caso, ou seja, na indisponibilidade dos demais soros.
- D) o número de ampolas do soro indicado deve ser o mesmo independente da gravidade do acidente e das manifestações clínicas.
- E) devido ao risco de reações adversas precoces ou tardias, devem ser realizados testes de sensibilidade cutânea previamente.

Questão 49 (Peso 1,00)

Ao iniciar o plantão em uma unidade hospitalar referência em traumatologia, o enfermeiro priorizou cuidado a uma pessoa com lesão aguda na medula espinhal muito grave e com dispneia.

Considerando os possíveis diagnósticos de enfermagem para o caso mencionado acima, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Confortável eliminação traqueobrônquica.
- () Risco de integridade da pele muito prejudicada.
- () Padrão respiratório eficaz relacionado com fraqueza muscular.
- () Constipação intestinal relacionada com a presença de intestino atônico.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F F
- C) F F F V
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 50 (Peso 1,00)

Sobre as interações medicamentosas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O efeito anticoagulante da varfarina pode ser aumentado com o uso simultâneo do ácido valpróico, devido a uma interação envolvendo a ligação às proteínas plasmáticas.
- () O aumento da suscetibilidade à intoxicação por paracetamol após dosagem excessiva, quando ingerido juntamente com etanol, ocorre devido a uma interação envolvendo a absorção do paracetamol.
- () O aumento do risco de hemorragias, devido à administração concomitante de ácido acetilsalicílico e heparina, ocorre devido a uma interação envolvendo a ação terapêutica dos dois fármacos.
- () O aumento da biodisponibilidade de fármacos básicos como o triazolam causado pelo uso concomitante com a ranitidina é um exemplo de interação envolvendo o metabolismo do benzodiazepínico.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F