

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de saúde, individuais e coletivas”.

Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
- () O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e riscos à saúde.
- () O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas demandas dos usuários.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V F V
- C) V V F
- D) F F V
- E) F V F

Questão 02 (Peso 0,50)

Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.

A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é

- A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
- B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
- C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
- D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
- E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.

Questão 03 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL, 2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que

- A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo de vida.
- B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para implementação da política.
- C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a promoção do desenvolvimento sustentável.
- D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a importância das ações educativas em saúde.
- E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão de temas ligados à alimentação saudável.

Questão 04 (Peso 0,50)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) da Conferência de Saúde
- B) do Fundo Estadual de Saúde
- C) da Agência Nacional de Saúde
- D) da Comissão Intergestores Tripartite
- E) dos respectivos Conselhos de Saúde

Questão 05 (Peso 0,50)

Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em 2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação de casos.

Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que

- A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
- B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
- C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente para uso posterior.
- D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
- E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.

Questão 06 (Peso 0,75)

Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
- () O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços de saúde.
- () O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V
- B) F F V
- C) V F V
- D) V V F
- E) V F F

Questão 07 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela organização econômica do país.
- () A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as ofertas de exames de diagnóstico.
- () A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente federativo em seu âmbito administrativo.
- () A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 08 (Peso 0,75)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3). Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que

- A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
- B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
- C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa privada.
- D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo estabelecimento.
- E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras em seu território.

Questão 09 (Peso 0,75)

Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências de saúde (BRASIL, 2013, p.12).

Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que

- A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
- B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
- C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
- D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
- E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.

Questão 10 (Peso 0,75)

A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional. Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e serviços públicos de saúde é:

- A) atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
- B) vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- C) educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
- D) saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
- E) merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar, através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). _____ é uma das diretrizes da PNH, relacionada ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Cogestão
- B) Ambiência
- C) Acolhimento
- D) Clínica ampliada
- E) Defesa dos direitos dos usuários

Questão 12 (Peso 0,75)

O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.

Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em saúde:

- A) Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
- B) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
- C) Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
- D) Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
- E) Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as Regiões de Saúde, é correto afirmar que

- A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de Saúde.
- C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde interestaduais.
- D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do Ministério da Saúde.
- E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.

Questão 14 (Peso 0,75)

O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual interagem diversos tipos de tecnologias [...]” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).

Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.

A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é

- A) Acolhimento
- B) Ações educativas
- C) Produção de vínculo
- D) Saberes da clínica psicanalítica
- E) Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)

Para que a vigilância seja capaz de acompanhar _____ da dengue na área e sua curva endêmica, é medida essencial _____ dos casos _____ à Vigilância Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância são as _____. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos dados.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
- B) o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
- C) a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
- D) o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
- E) o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

“As principais doenças bucais são a cárie dentária e a doença periodontal; juntas, são as primeiras responsáveis pelas perdas dentárias na população. Mas, ao contrário do que se possa pensar, não é normal ter essas doenças; elas podem ser prevenidas e seu desenvolvimento está intimamente ligado às condições socioeconômicas e culturais das populações e, principalmente, refletem as desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde” (SÃO PAULO, 2009, p. 23).

Sobre a cárie dental, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A doença cárie é multifatorial.
- () A doença cárie não depende da formação do biofilme.
- () A doença cárie não possui relação com a perda da unidade dental.
- () A doença cárie depende, exclusivamente, dos carboidratos consumidos à noite.
- () A doença cárie depende de quatro fatores básicos: hospedeiro, microrganismo, substrato e tempo. Fatores essenciais para sua instalação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F F F V V
- C) V V F F F
- D) V F V V F
- E) V F F F V

Questão 17 (Peso 0,50)

O câncer da boca poderia ser evitado na maior parte dos casos. A principal estratégia é baseada na prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a doença. A prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de _____. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição solar, seja esta de natureza ocupacional ou não. Na prevenção secundária, o Cirurgião-Dentista tem uma contribuição muito relevante pelo seu conhecimento e técnica do exame intrabucal. As lesões mais comuns de câncer bucal são de origem _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) tabaco e álcool / epitelial
- B) tabaco e álcool / endotelial
- C) alimentos gordurosos / epitelial
- D) tabaco e alimentos gordurosos / epitelial
- E) álcool e alimentos gordurosos / endotelial

Questão 18 (Peso 0,50)

Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o Cirurgião-Dentista esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja atrasos desnecessários no encaminhamento para o tratamento oncológico, que possam comprometer a morbidade e a mortalidade dos pacientes.

Em relação ao câncer de boca, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As mulheres são mais acometidas pelo câncer de boca do que os homens.
- () Entre os homens, o câncer de boca trata-se do segundo maior risco de ocorrência.
- () Não há relação entre o consumo de frutas e verduras e a ocorrência de câncer de boca.
- () Tabaco e álcool são fatores de risco menos importantes que o consumo pobre de frutas e verduras.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V V
- D) F F V F
- E) F V F F

Questão 19 (Peso 0,50)

As oclusopatias têm ocorrência mundial e podem afetar quatro sistemas simultaneamente: dentes, ossos, músculos e nervos. A disposição dos dentes nos arcos dentários, a forma e o volume dos ossos maxilares, bem como a maneira pela qual se articulam os músculos e as articulações envolvidas, não permanecem estáticas durante toda a vida, mudando continuamente.

Sobre as oclusopatias, é correto afirmar que

- A) sofrem influência do meio ambiente.
- B) não sofrem influência do envelhecimento.
- C) não são causadas por fatores hereditários.
- D) não estão relacionadas aos processos de crescimento.
- E) não são influenciadas por tratamentos dentários, desgastes e processos patológicos.

Questão 20 (Peso 0,50)

A fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. As formas brandas são caracterizadas por _____ ou manchas branco-giz que surgem _____ ou nas pontas de cúspides.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) finas linhas/ na dentina
- B) finas linhas/ no esmalte
- C) pontos amarelados/ no esmalte
- D) pontos amarelados/ no vestibular
- E) pontos amarelados e arredondados/ na dentina

Questão 21 (Peso 0,75)

O diagnóstico da doença cárie é estabelecido através de um exame criterioso, que se inicia na avaliação dos fatores etiológicos biológicos e socioeconômicos, seguidos pela detecção e caracterização das lesões de cárie quanto a sua atividade e profundidade.

Quanto às estratégias de diagnóstico da doença cárie, é correto afirmar que

- A) o afastamento imediato com elásticos separadores permite ao clínico estabelecer um diagnóstico correto com inspeção direta de lesões proximais.
- B) o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade na detecção de lesões de cárie nas superfícies proximais em esmalte de dentes decíduos.
- C) o DIAGNOdent é um método de fluorescência induzida pela luz, que auxilia a detecção das lesões de cárie pelas diferenças nas propriedades de fluorescência do dente e do tecido cariado.
- D) o método mais comumente utilizado para detecção de cárie é o exame visual, que deve ser realizado após limpeza dos dentes, secagem cuidadosa e com o auxílio de exploradores e sondas pontiagudas para realizar o exame tátil das lesões.
- E) a transluminação por fibra óptica utiliza luz branca de alta intensidade, permitindo que o esmalte e a dentina com lesões de cárie apareçam como sombra. É um método que apresenta alta confiabilidade e que pode ser utilizado para todas as superfícies, em especial para as superfícies proximais.

Questão 22 (Peso 0,75)

As oclusopatias são caracterizadas como anomalias do _____, afetando, principalmente, os _____ no período da infância e da adolescência, os quais podem produzir desde desvios estéticos nos dentes e/ou face até distúrbios funcionais na _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos maxilares / oclusão
- B) sistema estomatognático / músculos e ossos maxilares / cabeça da ATM
- C) crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos mandibulares / oclusão
- D) sistema estomatognático / músculos e ossos mandibulares / cabeça da ATM
- E) crescimento e desenvolvimento / ossos da cabeça e pescoço / cabeça da ATM

Questão 23 (Peso 0,75)

As doenças dermatológicas são representadas não somente pelas numerosas doenças primárias que afetam a pele, mas, também, pelas manifestações cutâneas comuns de doenças mais profundas, viscerais e sistêmicas, que podem envolver as mucosas do corpo, inclusive a mucosa oral.

Sobre as manifestações sistêmicas que provocam lesões orais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|------------------------|--|
| (1) Líquen plano | () É uma patologia autoimune caracterizada pela formação de bolhas intraepiteliais na pele e nas mucosas, que se rompem pelo menor trauma, evoluindo para ulcerações dolorosas e de fácil infecção. |
| (2) Pênfigo vulgar | () É uma desordem ulcerativa e bolhosa, de etiopatogênese incerta, caracterizada por erupção cutânea, seguida ou não de envolvimento oral, podendo, ocasionalmente, envolver a boca de maneira isolada. |
| (3) Eritema multiforme | () É uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas, que se manifesta na cavidade oral com grande frequência, antes ou depois das aparições epidérmicas. Essas lesões são caracterizadas pelas estrias de Wickham e apresentam-se sob várias formas clínicas, principalmente, a reticular e a erosiva. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3
- B) 2 1 3
- C) 2 3 1
- D) 3 1 2
- E) 3 2 1

Questão 24 (Peso 0,75)

O conhecimento das técnicas de raspagem dental, aplainamento radicular e dos instrumentais utilizados para esse propósito são de fundamental importância para o tratamento e a manutenção da saúde do periodonto.

Considerando as técnicas para o tratamento das doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) as curetas universais mais utilizadas são as curetas Mc.Call e de Gracey. Ambas apresentam dois cortes com ângulo de conexão entre 90° e 100°.
- B) as limas mais utilizadas são as de Hirschfeld e as de Dunlop. A primeira serve para instrumentar as paredes dentais de bolsas periodontais com profundidades maiores que 6 mm e as segundas para instrumentar as partes mais apicais.
- C) o encontro da face coronária com o dente determina a formação do ângulo de trabalho que varia de acordo com o instrumento a ser utilizado. Por exemplo, para as curetas Pádua Lima e Pádua Lima/Francisco utiliza-se angulação que varia entre 35° e 45°.
- D) as curetas denominadas de Goldman #2 e #3 apresentam distintas indicações. A primeira é indicada para uso em dentes anteriores e pré-molares, enquanto a cureta de Goldman #3 é indicada para as faces vestibulares e linguais de dentes posteriores e anteriores.
- E) a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica são medidas clínicas obtidas com o auxílio de sondas milimetradas. A sonda deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente, sendo a sonda milimetrada de Goldman-Fox especialmente indicada para região de furcas.

Questão 25 (Peso 0,75)

O uso de protetores bucais, durante a prática de esportes de contato, tem sido cada vez mais divulgado como uma importante medida contra o traumatismo dentoalveolar. Os protetores bucais devem ser, preferencialmente, personalizados, confeccionados com placas siliconizadas plastificadas e prensadas sob um modelo de gesso da arcada superior do paciente. Além disso, os protetores bucais devem estender-se até o fundo do vestibulo na região vestibular e até ___ mm além da coroa clínica na região palatal e apresentar espessura _____ e término em bisel.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é

- A) 5 / irregular
- B) 2 / uniforme
- C) 10 / uniforme
- D) 8 / maior na região anterior
- E) 3 / maior na região anterior

Questão 26 (Peso 0,75)

Estudos têm demonstrado a efetividade de programas de controle da placa bacteriana sobre a saúde periodontal. Assim, o paciente, além de receber informações sobre o processo da doença, alternativas de tratamento, potencial das complicações e expectativas dos resultados, deve estar ciente da sua responsabilidade no tratamento.

Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que

- A) a estomatite aftosa recorrente é uma condição idiopática, antígeno dependente, que se manifesta na cavidade bucal pelo aparecimento de úlceras, que afetam, preferencialmente, a mucosa móvel.
- B) o abscesso periodontal agudo é resultante da impactação alimentar, principalmente, na região interproximal, devido ao inadequado restabelecimento do ponto de contato em restaurações classe II.
- C) a gengivite ulcerativa necrosante é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival, caracterizada por ulceração, perda de inserção, necrose gengival e destruição das papilas interdentais.
- D) a pericoronarite não é passível de controle através da higiene oral com tufo e clorexidina. O tratamento deve ser realizado com a total eliminação dos tecidos envolvidos e, até mesmo, com a extração do dente antagonista nos casos de pericoronarite traumática.
- E) o abscesso periodontal crônico é caracterizado por dor irradiada e pulsátil de formação edematosa flutuante e circunscrita. Observa-se começo súbito, mobilidade aumentada, dificuldade à mastigação, sendo sensível à percussão horizontal, além de febre, mal-estar geral e enfartamento ganglionar. Histologicamente, há modificações vasculares como vasodilatação, edema e infiltração leucocitária.

Questão 27 (Peso 0,75)

A infância é uma fase crucial da vida para formar um cidadão que possa cuidar de si próprio. No que se refere às ações de promoção, prevenção e assistência direcionadas à saúde da gestante e da criança sabe-se que o profissional de saúde tem um papel importante como educador ativo.

Considerando a doença cárie na infância, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A água fluoretada e o uso de dentifrícios fluoretados são considerados os meios mais efetivos para o controle da cárie dentária na infância.
- () A realização da higiene bucal da criança, logo após as refeições, com o estômago cheio, reduz a absorção do fluoreto inadvertidamente ingerido. Essa conduta deve ser considerada na recomendação do uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância.
- () A cárie dentária em crianças pré-escolares pode ocorrer em todas as superfícies de todos os dentes. Considerando crianças na faixa etária entre um e três anos, os molares decíduos são, normalmente, os primeiros dentes a serem atingidos pela lesão de cárie.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F
- B) V V F
- C) V F V
- D) F V F
- E) F V V

Questão 28 (Peso 0,75)

Sobre traumatismo alvéolo dentário, é correto afirmar que

- A) em fraturas envolvendo somente o esmalte, não é necessário o tratamento endodôntico.
- B) a classificação mais utilizada para os traumatismos dentoalveolares é a de Obwergeiser.
- C) a reabsorção interna inflamatória promove a substituição do tecido pulpar normal por osso trabecular.
- D) nas fraturas de terço médio e apical, não se realizam contenção rígida, exceto em casos de mobilidade.
- E) os dentes mandibulares anteriores estão, normalmente, mais expostos a traumatismos e deslocamentos.

Questão 29 (Peso 0,75)

Sobre as fraturas orbitais, é correto afirmar que

- A) o tubérculo de Whitnall encontra-se 2 cm abaixo da sutura frontozigomática.
- B) a parede óssea medial da órbita é composta pela maxila, lacrimal, frontal e etmoide.
- C) as radiografias de seios da face promovem visualização adequada das paredes orbitárias.
- D) a distância média entre a fissura supraorbital até o canal ótico, em seu aspecto superior, é de 32 mm.
- E) os pacientes com encarceramento da cápsula de Tenon devem ser submetidos a reparo urgente dentro de 12h.

Questão 30 (Peso 0,75)

Sobre o tratamento dos dentes retidos ou impactados, é correto afirmar que

- A) todos os dentes inclusos são considerados impactados.
- B) o trismo é considerado como uma complicação rara após exodontias de terceiros molares.
- C) os pacientes praticantes de esportes de contato não devem ser submetidos a exodontia de dentes inclusos para evitar fraturas.
- D) os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática deverão realizar exodontia de terceiros molares impactados entre três e cinco meses antes da cirurgia.
- E) os pacientes com terceiros molares impactados, cobertos por osso, sem comunicação com a cavidade bucal, sem sinais patológicos e acima de 40 anos não devem ser submetidos a exodontia.

Questão 31 (Peso 1,00)

O trauma dentário, em especial quando acomete os dentes anteriores, marca as pessoas independentemente da idade, gênero e nível socioeconômico. Um exame minucioso e a obtenção de radiografias são de fundamental importância para o diagnóstico do tipo de fratura e o adequado planejamento do tratamento.

Sobre o tratamento no trauma dentário, é correto afirmar que

- A) nos casos de fratura dental com invasão dos espaços biológicos, deve-se sempre considerar a realização de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia associada à fase restauradora.
- B) quando ocorrer exposição pulpar, a polpa exposta será coberta por uma camada de fibrina. Essa área inflamada acomete cerca de 1 a 2 mm mesmo após uma semana de ocorrida a exposição.
- C) o tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são fatores que influenciam o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes fraturados. As fraturas de esmalte/dentina são classificadas em transversais, mistas, apicais e longitudinais.
- D) em dentes desvitalizados, fraturados ou com indicação de tratamento endodôntico, deve-se considerar o uso de retentores intraradiculares, uma vez que estes contribuem para retenção da restauração e para o aumento da resistência do remanescente.
- E) a colagem do fragmento dental é uma alternativa viável e conservadora, especialmente, para dentes anteriores. Quando o fragmento dental apresenta múltiplos pedaços, estes devem ser unidos e colados ao remanescente dental.

Questão 32 (Peso 1,00)

Os anestésicos locais são fármacos amplamente utilizados na prática clínica do cirurgião dentista. São constituídos por um grupo lipofílico, que permite a passagem da molécula pela membrana da célula nervosa, e um grupo hidrofílico, que interage com as estruturas das células. Considerando que os anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração do seu efeito, numere a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| (1) Agente de curta ação (por até 30 minutos) | () Mepivacaína a 3% |
| (2) Agente de longa duração (por até 8 horas) | () Articaina a 4% com epinefrina |
| (3) Agente de duração intermediária (por até 60 minutos) | () Prilocaina a 4% com felipressina |
| | () Bupivacaína a 0,5% com epinefrina |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 2
- B) 1 3 3 2
- C) 2 3 1 3
- D) 3 1 3 2
- E) 3 1 2 2

Questão 33 (Peso 1,00)

O uso de antibióticos, muitas vezes desnecessário, como terapêutica medicamentosa condicionou a chamada resistência microbiana, promovendo a seleção de cepas não mais suscetíveis à ação dos agentes de uso corrente. Ciente disto, cada vez mais, se faz necessário o conhecimento destes fármacos, dos critérios que orientam a escolha e a forma de uso, assim como dos agentes causais prevalentes em infecções odontológicas.

Sobre a terapêutica medicamentosa utilizada na odontologia, é correto afirmar que

- A) a intolerância gastrointestinal, náuseas, diarreia, fotossensibilidade, hepatotoxicidade, assim como a intolerância a bebidas alcoólicas são considerados efeitos adversos do metronidazol.
- B) as penicilinas possuem ação bactericida e constituem um dos mais importantes grupos de antimicrobianos na odontologia, em especial, devido à sua ação contra pseudomonas em infecções odontogênicas.
- C) a penicilina V é o antibiótico de primeira escolha para infecções endodônticas. Alternativamente à penicilina V, pode-se prescrever a cefalexina, o metronidazol, o itraconazol e os macrolídeos para tratamento dessas infecções.
- D) os macrolídeos apresentam atividade primariamente bacteriostática, mas podem apresentar ação bactericida a depender da concentração plasmática e tecidual atingida, assim como do tipo de microorganismo envolvido.
- E) na periodontite, observa-se o aumento da complexidade da flora com predomínio de bacilos anaeróbicos Gram-negativos e espiroquetas. Por outro lado, abscessos periodontais e infecções endodônticas caracterizam-se por flora polimicrobiana em que *P. gingivalis*, *Actinobacillus actinomycetemcomitans* e *Capnocytophaga sp* são os agentes isolados predominantes.

Questão 34 (Peso 1,00)

Dentre as manifestações sistêmicas, o pênfigo e o penfigóide apresentam quatro variantes clínicas e patológicas: vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso.

Sobre as variantes clínicas do pênfigo e do penfigóide, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O penfigóide bolhoso é uma patologia crônica autoimune subepitelial, sendo menos frequente em indivíduos idosos entre a quinta e sexta década.
- () O pênfigo eritematoso pode ser considerado como uma variante do pênfigo foliáceo. Apresenta-se, clinicamente, como bolhas profundas e formação de crostas e exsudação sobre o couro cabeludo e a face
- () O pênfigo vegetante é uma variante do vulgar e, em geral, não se apresenta com vesículas ou bolhas, mas sim grandes placas úmidas, verrucosas, vegetantes e salpicadas de pústulas (microabscessos intraepiteliais).
- () O pênfigo vulgar é o mais comum com cerca de 80% dos casos. As bolhas são superficiais (acima da camada basal), rompem-se com facilidade deixando erosões ou úlceras hemorrágicas, exsudativas e crostosas, que não cicatrizam espontaneamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V F F

Questão 35 (Peso 1,00)

A principal razão para a limitada ocorrência de urgência no consultório dentário é o alicerce da educação odontológica, que prepara os profissionais para identificar os problemas potenciais e intervir de forma preventiva.

Sobre as urgências em odontologia, é correto afirmar que

- A) a aplicação de diazepam (5-10 mg) ou midazolam (2-6 mg) faz parte do tratamento nos casos de reações de toxicidade moderada aos anestésicos locais.
- B) o aumento da taxa e da profundidade das respirações, a xerostomia e a tetania são manifestações respiratórias da síndrome de hiperventilação.
- C) a hipertensão, o infarto do miocárdio e reações de hipersensibilidade constituem as três situações de emergência mais comuns que ocorrem nos pacientes antes, durante ou logo após o tratamento dentário.
- D) quando um paciente diabético relata a sensação de sinais ou sintomas da hipoglicemia durante o tratamento odontológico, deve-se interromper o procedimento e permitir que o paciente consuma carboidratos de alto teor calórico.
- E) a causa mais comum de perda temporária da consciência no consultório dentário é a síncope vasovagal, causada pelo acúmulo de sangue na periferia, pois este não é mobilizado com rapidez suficiente para prevenir isquemia cerebral, quando um paciente assume rapidamente a posição vertical.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

A região cervical pode ser dividida para o estudo anatômico em pescoço e nuca. A nuca é a parte posterior da região cervical, entende-se desde a cabeça até o dorso, confluindo com esse pelo músculo _____. O pescoço pode ser dividido em duas regiões _____, uma esquerda e outra direita, traçando uma linha mediana imaginária sobre a linha média na face anterior do pescoço

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) trapézio / anterolaterais
- B) digástrico / anterolaterais
- C) miloídeo / anteroposteriores
- D) digástrico / anteroposteriores
- E) miloídeo / anteroposteriores

Questão 37 (Peso 1,00)

A região anterior do pescoço é denominada de Trígono Anterior do Pescoço, pois a mesma possui um formato triangular. O Trígono Anterior do Pescoço é delimitado pela margem do _____ esternocleidomastóideo, pela margem _____ da mandíbula e pela linha mediana _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) anterior m. / inferior / anterior
- B) posterior m. / inferior / anterior
- C) anterior m. / superior / anterior
- D) posterior m. / superior / anterior
- E) posterior m. / superior / posterior

Questão 38 (Peso 1,00)

Sobre as neoplasias do complexo bucomaxilofacial, é correto afirmar que

- A) o tumor odontogênico epitelial calcificante é também conhecido como tumor de Gorlin.
- B) os padrões histopatológicos mais comuns do ameloblastoma sólido são folicular e acantomatoso.
- C) os tumores do epitélio odontogênico são compostos somente por epitélio odontogênico e discreta composição ectomesênquima.
- D) o fibroma ameloblástico, o fibrossarcoma ameloblástico e o odontoma composto são considerados tumores odontogênicos mistos.
- E) o fibro-odontoma ameloblástico, radiograficamente, apresenta um padrão radiolúcido, unilocular, sem presença de material radiopaco em seu interior.

Questão 39 (Peso 1,00)

Sobre os cistos do complexo bucomaxilofacial, é correto afirmar que

- A) o cisto dentígero, radiograficamente, pode ser dividido em três tipos.
- B) são exemplos de cistos de desenvolvimento: cisto dentígero, cisto de erupção e cisto residual.
- C) são exemplos de cistos inflamatórios: peripapical, cisto de bifurcação vestibular e cisto periodontal lateral.
- D) o cisto gengival (cisto alveolar do recém-nascido) é considerado um cisto inflamatório dentro da classificação dos cistos odontogênicos.
- E) o tumor odontogênico queraticisto é considerado uma neoplasia benigna dos maxilares devido ao seu comportamento e às características histopatológicas.

Questão 40 (Peso 1,00)

A cavidade bucal é o "habitat" natural de grande quantidade de bactérias, que se mantêm em equilíbrio, considerando-se, neste caso, as espécies residentes e as transitórias. Das manifestações bucais observadas na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (SIDA/HIV), destacam-se as infecções fúngicas e virais, não se podendo esquecer as de origem bacteriana que, muitas vezes, não parecem tão claras, mas também merecem ser pesquisadas. A participação de bactérias deve ser ainda melhor avaliada, principalmente, tendo em vista os problemas periodontais.

Sobre os problemas periodontais relacionados ao HIV, é correto afirmar que

- A) não foram identificadas diferenças significantes na microbiota subgengival entre grupos de risco independente da infecção por HIV.
- B) há uma elevada participação das bactérias Gram-positivas nas ulcerações ditas "aftoides", que são observadas com frequência em indivíduos infectados pelo HIV.
- C) a microbiota supragengival pode incluir não só os micro-organismos incomuns, mas apresenta, em certos nichos, bacilos entéricos, outras espécies de estafilococos e até fungos, refletindo respostas imunológicas alteradas.
- D) alguns pacientes homossexuais masculinos, que apresentam células T4 reduzidas e relação T4/T8 normal, apresentam alta prevalência de gengivite necrosante aguda (GUNA) em comparação a pacientes sadios.
- E) os estudos bacteriológicos têm demonstrado que, em alterações sistêmicas graves, se observa a ocorrência de espécies bacterianas comuns na microbiota local como ocorre em pacientes com HIV, leucêmicos ou mesmo submetidos à quimioterapia mielossupressora.

Questão 41 (Peso 1,00)

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) atinge o sistema imunológico do indivíduo, tornando-o susceptível ao desenvolvimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas. As lesões bucais estão fortemente associadas à infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), sendo que os portadores apresentam, geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na cavidade bucal.

Sobre as manifestações bucais em pacientes que vivem com HIV, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Grupo III abrange lesões, possivelmente, associadas com infecção pelo HIV, como, por exemplo, osteomielite, distúrbios neurológicos, sinusite, carcinoma epidermóide, entre outras.
- () O Grupo I consiste de lesões orais, que não estão comumente associadas com infecção pelo HIV, como, por exemplo, candidíase, leucoplasia pilosa, gengivite úlcernecrosante aguda (GUNA) e sarcoma de Kaposi.
- () O Grupo II enquadra as doenças de decorrência mais comum, tais como: ulcerações atípicas, doenças de glândulas salivares, infecções virais por citomegalovírus (CMV) e vírus herpes, papiloma vírus e varicela-zoster.
- () As lesões orais associadas com a infecção pelo vírus HIV podem ser fúngicas, bacterianas e virais, além de processos neoplásicos e lesões de natureza desconhecida. Elas também podem ser agrupadas em três grupos, de acordo com a sua intensidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F
- B) V V V F
- C) V F V V
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 42 (Peso 1,00)

A Candidose/Candidíase é a doença fúngica mais comum na boca, causada por micro-organismos dimórficos do gênero *Cândida* (*C. Albicans*, *C. Tropicalis*, *C. Krusei*, são os agentes principais).

Sobre a Candidose/Candidíase, é correto afirmar que

- A) o uso de antibióticos (principalmente em tempo prolongado) nem sempre causa alteração na microbiota normal da cavidade oral.
- B) a diminuição da saliva não interfere na proliferação dos microrganismos, logo não pode ser considerada um fator causal da candidíase.
- C) a imunossupressão não pode ser considerada um fator predisponente da candidíase, uma vez que indivíduos saudáveis também podem ser acometidos.
- D) o uso de antibióticos (principalmente em tempo prolongado) causa uma alteração na microbiota normal da cavidade oral, contudo não tende a ocorrer uma proliferação de bactérias.
- E) o uso dos antibióticos (principalmente em tempo prolongado) causam uma alteração na microbiota normal da cavidade oral, ou seja, alguns microrganismos, que não são afetados pelo medicamento, tendem a proliferar e se sobrepor a outros. Isso acaba favorecendo o desenvolvimento da candidose.

Questão 43 (Peso 1,00)

A incorporação de tecnologias apropriadas para o controle de infecção e biossegurança nos serviços odontológicos, assim como a educação permanente das Equipes de Saúde Bucal são ações fundamentais para promover a melhoria da assistência à saúde.

Sobre a biossegurança em odontologia, é correto afirmar que

- A) a esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes por meio de processos químicos (autoclave) ou físicos (soluções de ácido peracético a 0,2%).
- B) o uso de equipamento de proteção individual (EPI) é indicado durante o atendimento ao paciente e no reprocessamento dos artigos, sendo dispensável durante os procedimentos de limpeza do ambiente.
- C) a higienização das mãos com água e sabonete líquido, quando realizada com técnica correta, pode reduzir a população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de infecção. O simples ato de lavar as mãos é considerado a ação isolada mais importante para a prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde.
- D) os equipamentos odontológicos e periféricos estão sujeitos à contaminação, sendo fundamental realizar a limpeza e a desinfecção com água e sabão neutro. Além disso, deve-se recobrir estas superfícies com campos de algodão esterilizados para procedimentos cirúrgicos e aplicar barreiras impermeáveis durante a realização de procedimentos clínicos.
- E) o processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e biológico. No monitoramento físico, avalia-se o ciclo de esterilização, pela mudança de cor, na presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado (indicador de processo, teste Bowie-Dick, de parâmetro simples, multiparamétrico, integrador e emuladores).

Questão 44 (Peso 1,00)

O paciente com comprometimento cardiovascular deve ser avaliado minuciosamente, tanto pelo profissional que realizará o procedimento odontológico quanto pelo médico. Assim, há a necessidade do odontólogo ampliar sua visão profissional, adquirindo informações e habilidades relevantes que lhe permita executar uma abordagem preventiva e terapêutica durante o atendimento de indivíduos portadores de cardiopatias.

Sobre a avaliação do comprometimento cardiovascular do paciente no consultório odontológico, é correto afirmar que

- A) a cardiopatia isquêmica não causa alterações do ritmo cardíaco.
- B) a angina, muitas vezes, é desencadeada pelo estresse emocional ou pelo exercício físico, sendo aliviada pelo repouso.
- C) a arritmia é o resultado da incapacidade do coração em fornecer oxigênio para as atividades metabólicas do organismo.
- D) a insuficiência cardíaca congestiva se relaciona a um distúrbio no ritmo normal do coração e, quando significativa, aumenta o risco de angina e infarto do miocárdio.
- E) a bradicardia caracteriza-se por uma frequência de pulso menor que 50 batimentos por minuto em adultos em repouso, necessitando ser investigada antes do início do tratamento.

Questão 45 (Peso 1,00)

Dentre as doenças cardiovasculares mais prevalentes, encontra-se a *angina pectoris*, que se caracteriza por uma hipóxia temporária do músculo cardíaco. Ocorre em 60% dos pacientes com estenose aórtica, e, em metade desses casos, há associação com coronariopatia obstrutiva.

Sobre o atendimento odontológico em pacientes portadores de *angina pectoris*, é correto afirmar que

- A) sua duração varia de dois a cinco minutos.
- B) existe apenas dois tipos de *angina*: a estável e a instável.
- C) não há relação entre a *angina pectoris* e a utilização de anestésicos, sendo livre o seu uso e quantidade.
- D) sua importância para a odontologia reside no fato de que qualquer situação geradora de medo ou ansiedade pode desencadear o quadro.
- E) caso o paciente apresente uma crise no momento do atendimento, o dentista deve apenas administrar oxigênio ao paciente, repetindo cinco minutos após, se necessário.

Questão 46 (Peso 1,00)

As lesões pré-cancerosas são definidas como um tecido morfológicamente alterado, em que o câncer é mais provável de ocorrer. Sua contraparte, aparentemente normal, enquanto uma condição pré-cancerosa é definida como um estado generalizado associado a um risco significativamente aumentado de câncer.

Considerando as características das lesões orais pré-cancerosas, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) leucoplasia | () Lesão macular ou em placa, de coloração vermelha. |
| (2) eritroplasia | () Lesão, predominantemente, branca, que pode se apresentar lisa, rugosa ou verrucosa. |
| (3) queilite actínica | () Lesão de etiologia desconhecida, havendo uma resposta imune com agressão ao epitélio de revestimento. |
| (4) líquen plano oral | () Lesão que afeta o lábio inferior em 95% dos casos e se manifesta por ressecamento, erosões e perda do limite do lábio. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 4
- B) 1 4 3 2
- C) 2 1 4 3
- D) 4 3 2 1
- E) 4 2 3 1

Questão 47 (Peso 1,00)

A endocardite bacteriana é uma infecção severa das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais do coração. Advém de uma série de condições clínicas predisponentes que provocaram danos às válvulas cardíacas, os quais podem resultar de patologias como febre reumática, lesões valvulares adquiridas, superfícies cardíacas ásperas, produzidas pelo jato de sangue que passa por meio de lesões cardíacas congênitas, próteses nas válvulas cardíacas e, até mesmo endocardite bacteriana anterior.

Sobre a endocardite bacteriana e o manejo odontológico, é correto afirmar que

- A) sempre e independente do procedimento odontológico, deve ser realizada profilaxia com antibióticos em pacientes com endocardite bacteriana.
- B) os riscos de uma bacteremia de origem bucal parecem não estar relacionados à extensão do traumatismo aos tecidos moles causado pelo procedimento, e ao grau da doença inflamatória local preexistente.
- C) a profilaxia antibiótica deve ser realizada duas horas antes do procedimento com 2g de amoxicilina como protocolo principal, salvo para os casos de alergia medicamentosa, nos quais deve ser utilizada a clindamicina de 600 mg.
- D) nunca foi comprovado bacteremias transitórias após exodontia, gengivectomia, raspagem periodontal, profilaxia, escovação e manipulação endodôntica, e, sim, após as restaurações com comprometimento pulpar.
- E) as intervenções odontológicas constituem uma das causas principais de bacteremia transitória. As bactérias presentes na circulação sanguínea podem colonizar válvulas danificadas ou anormais, e o endocárdio ou o endotélio próximo a defeitos anatômicos, resultando em endocardite bacteriana.

Questão 48 (Peso 1,00)

As lesões orais potencialmente malignas apresentam prevalências diferentes na população, muitas vezes associadas com diferenças ambientais e comportamentais, que influenciam a exposição aos fatores etiológicos.

Com relação às lesões orais potencialmente malignas, é correto afirmar que

- A) a leucoplasia oral apresenta predileção pelo palato e rebordo alveolar.
- B) dentre as lesões orais pré-cancerosas, podem ser citadas como mais comuns a leucoplasia, a eritroplasia, a queilite actínica e o líquen plano oral.
- C) os sítios mais acometidos por lesões potencialmente malignas são o lábio superior e o palato.
- D) a exposição crônica à radiação ultravioleta não é considerada uma das causas de câncer bucal.
- E) muitos dos agentes associados ao desenvolvimento do câncer de boca relacionam-se, exclusivamente, ao tabagismo.

Questão 49 (Peso 1,00)

A cavidade bucal e as estruturas adjacentes podem sediar diversas lesões associadas às doenças autoimunes. É importante, para o clínico, o conhecimento da etiologia e da forma inicial das mesmas (NEVILLE, 2004).

As dermatoses autoimunes são patologias que envolvem formação de _____ direcionados(as) contra alguns elementos teciduais, particularmente, da _____, da mesma forma que podem assumir um âmbito sistêmico.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) anticorpos antinúcleo / pele ou superfícies das mucosas
- B) autoanticorpos / pele ou superfícies das mucosas
- C) bolhas subepiteliais / membrana basal
- D) bolhas intradérmicas / epiderme
- E) bolhas intraepiteliais / epiderme

Questão 50 (Peso 1,00)

A hemostasia envolve reações que impedem a perda de sangue, restauram a integridade vascular, e mantém condições fisiológicas que preservam a vida. O entendimento do sistema hemostático requer o conhecimento de um mecanismo complexo, controlado pelo endotélio vascular, micropartículas derivadas de diversos tipos de células, plaquetas, vias da coagulação sanguínea e fibrinólise.

Sobre a hemostasia, é correto afirmar que

- A) esse processo não compreende interações complexas entre os vasos sanguíneos, plaquetas, proteínas da coagulação e o sistema fibrinolítico.
- B) em seu estado normal, a superfície endotelial exerce uma função antioxidante relaxante, que favorece a dilatação vascular e contribui para manutenção da fluidez do sangue.
- C) o endotélio vascular é um tecido localizado entre o lúmen vascular e os constituintes da parede do vaso, capaz de liberar apenas uma das substâncias envolvidas no tônus vascular local e na coagulação sanguínea.
- D) as células endoteliais sintetizam moléculas que desempenham o papel de reguladoras do fluxo sanguíneo e inibidoras da ativação e agregação das plaquetas. Entre elas pode-se citar: glicosaminoglicanas (Heparan sulfato); prostaciclina (PGI₂); prostaglandina; óxido nítrico (NO), que atua de forma sinérgica com a PGI₂, e ectonucleotidases (ecto-ADPase).
- E) o endotélio sofre uma reprogramação bioquímica, que induz à produção de um potente vasoconstritor (endotelina z), levando à formação de uma superfície pró-coagulante, quando a célula sofre uma lesão celular. Neste caso, as células endoteliais secretam o fator tecidual (FT) e o fator de von Willebrand (FvW), que atuam no processo da coagulação sanguínea.