

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013).

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que

- A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao mesmo tempo.
- B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter universal nem está fundamentada em conclusões sólidas.
- C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível.
- D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo.
- E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais.

Questão 02 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _____ se refere à identificação de potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é

- A) da equidade
- B) da autonomia
- C) da integralidade
- D) do empoderamento
- E) da participação social

Questão 03 (Peso 0,50)

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada

- A) virulência.
- B) patogenicidade.
- C) teratogenicidade.
- D) transmissibilidade.
- E) persistência do agente biológico no ambiente.

Questão 04 (Peso 0,50)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que

- A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 05 (Peso 0,50)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual.

Questão 06 (Peso 0,75)

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente em todos os espaços de produção de saúde.

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que

- A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores.
- B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda que menos resolutivo.
- C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do SUS, exceto no âmbito da gestão.
- D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores.
- E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado.

Questão 07 (Peso 0,75)

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8).

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que

- A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou científico.
- B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas.
- C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.
- D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a especificidade dos conhecimentos desta área.
- E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, embora não seja considerada uma prática social.

Questão 08 (Peso 0,75)

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das “[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011).

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela qual ela pode gerenciar sua própria vontade.
- () Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo assim, anula-se a ideia de equidade em saúde.
- () O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria.
- () Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 09 (Peso 0,75)

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, portanto, melhor planejar as ações em saúde.

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que

- A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são avaliados pelos indicadores de processo.
- B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos e da estrutura organizacional do serviço de saúde.
- C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais.
- D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado.
- E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade.

Questão 10 (Peso 0,75)

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes modelos de Vigilância em Saúde.

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que

- A) o modelo sanitaria demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção com qualidade, efetividade e equidade à população.
- B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde.
- C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde.
- D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos.
- E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias.
- () A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde.
- () A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle.
- () A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 12 (Peso 0,75)

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010).

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas.
- () As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação.
- () A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança.
- () Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 0,75)

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde” (ONA, 2014).

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que

- A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma escolha da organização de saúde.
- B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à qualidade dos serviços ofertados à população.
- C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do qual é emitido um certificado para a instituição avaliada.
- D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas.
- E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso.

Questão 14 (Peso 0,75)

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde (RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4).

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- () Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares.
- () A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados.
- () A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 15 (Peso 0,75)

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” (BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015).

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares.
- () A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação.
- () Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde.
- () Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

O reflexo acústico funciona como um mecanismo de proteção da orelha interna mediante uma estimulação intensa e apresenta uma via aferente única e uma via eferente bilateral, representadas respectivamente, pelos _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) nervo facial e nervo trigêmeo
- B) nervo trigêmeo e nervo facial
- C) nervo vestibulo-coclear e nervo facial
- D) nervo vestibulo-coclear e núcleo coclear ventral
- E) nervo vestibulo-coclear e complexo olivar superior

Questão 17 (Peso 0,50)

Os potenciais auditivos evocados (PEAs) avaliam a atividade neuroelétrica na via auditiva, desde o nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico. Estes potenciais podem ser classificados de acordo com a latência em curtos, médios ou tardios. O PEA de curta latência mais utilizado clinicamente, devido a sua reprodutibilidade e geradores bem definidos, é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) (MATAS; MAGLIARO, 2015).

Considerando as aplicações, a realização do exame e a interpretação dos resultados do PEATE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A amplitude e a latência das ondas do PEATE diminuem de acordo com a redução na intensidade do estímulo teste.
- () O limiar eletrofisiológico corresponde ao menor valor de intensidade de estímulo em que se observa a presença da onda V.
- () A análise do tempo de latência das ondas do PEATE, realizado na intensidade de 80 dBNA, permite definir o tipo e grau da perda auditiva.
- () Para a análise dos traçados do PEATE de neonatos e lactentes, deve-se considerar o efeito de maturação da via auditiva sobre a latência, a amplitude e a morfologia das ondas.
- () Na avaliação da integridade da via auditiva, utiliza-se, frequentemente, o estímulo clique, geralmente em torno de 80dB, e analisa-se as latências absolutas e os interpicos das ondas I, III e V.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F V
- B) V V F V F
- C) V F V V F
- D) F F V V V
- E) F V F V V

Questão 18 (Peso 0,50)

Baixo desempenho na avaliação comportamental do processamento auditivo nos testes de fala com ruído branco e dicótico de dissílabos alternados (SSW) revelam, respectivamente, dificuldade nas habilidades auditivas de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) fechamento e figura-fundo
- B) localização e figura-fundo
- C) figura-fundo e fechamento
- D) resolução temporal e fechamento
- E) figura-fundo e resolução temporal

Questão 19 (Peso 0,50)

Considerando os componentes e as características do aparelho de amplificação sonora individual (AASI), numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|------------------|--|
| (1) Ganho | () Apresenta relação com o ganho do AASI. |
| (2) Receptor | () Transforma o sinal elétrico em onda sonora. |
| (3) Microfone | () Transforma a onda sonora em energia elétrica. |
| (4) Amplificador | () Apresenta relação com o amplificador e com o receptor do AASI. |
| (5) Saída máxima | () Consiste na diferença em decibéis entre o som que entra no microfone e o que é liberado no receptor. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 5 2 3 4 2
- B) 4 2 3 5 1
- C) 3 5 2 4 1
- D) 2 1 4 3 5
- E) 1 4 5 2 3

Questão 20 (Peso 0,50)

De acordo com Ferre e Bellis (2004), os transtornos do processamento auditivo central podem ser classificados em três subperfis primários (decodificação auditiva, prosódia e integração) e dois secundários (associação e organização de resposta), considerando a correlação entre os achados na avaliação do processamento auditivo e os processos neurofisiológicos comportamentais, cognitivos e acadêmicos, bem como as manifestações na comunicação.

Sobre os indivíduos com transtorno do processamento auditivo classificado como associação, é correto afirmar que

- A) apresentam inabilidade em aplicar as regras da língua.
- B) mostram dificuldade na nomeação e na imitação de padrões temporais.
- C) revelam maior dificuldade de discriminação de sons em ambientes ruidosos.
- D) o local da disfunção é o córtex auditivo primário do hemisfério dominante para a linguagem.
- E) mostram dificuldade em tarefas que exijam transferência inter-hemisférica por disfunção no corpo caloso.

Questão 21 (Peso 0,75)

Desde o final do século XX, a introdução de técnicas de neuroimagem, como a tomografia por emissão de pósitrons e a ressonância magnética funcional, tem levado os estudos a um modelo funcional de organização da linguagem no cérebro.

Sobre esse modelo, é correto afirmar que

- A) a região da ínsula não participa do processamento cerebral da linguagem.
- B) a região frontal inferior esquerda participa do processo de compreensão verbal.
- C) somente a área de Wernicke participa da compreensão da linguagem em contexto.
- D) as áreas 39, 40 e 41 de Brodmann não participam do processamento da linguagem.
- E) o giro fusiforme está envolvido em processos periféricos de processamento da escrita.

Questão 22 (Peso 0,75)

Sobre as consequências do traumatismo cranioencefálico (TCE) sobre a linguagem, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A presença de perturbação da comunicação em casos de TCE independe da gravidade da lesão cerebral.
- () A avaliação das funções cognitivas nesses casos pode ser realizada pelo fonoaudiólogo a partir de procedimentos não padronizados.
- () Para fins diagnósticos, é fundamental que o fonoaudiólogo priorize a aplicação completa de testes padronizados elaborados para avaliação de pacientes afásicos.
- () De maneira geral, em sujeitos vítimas de TCE, observam-se, predominantemente, alterações que afetam o nível sintático da linguagem devido à forte presença de anomias.
- () Distúrbios cognitivos da comunicação têm grande impacto no discurso de sujeitos vítimas de TCE, mas podem ser observados em outros quadros que envolvem lesões focais em região parieto-occipital.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F
- B) V V F F F
- C) F V F V F
- D) F V V F F
- E) F F V F V

Questão 23 (Peso 0,75)

Erros de produção _____ não podem diferenciar _____, mas os parâmetros _____ podem. Pacientes _____ produzem vogais mais longas e apresentam redução da _____, o que não muda a significação do que é dito.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) fonêmica / apraxia de fala de afasia / vocais / apráxicos / intensidade vocal
- B) fonética / disartria de afasia / fonológicos / afásicos / intenção comunicativa
- C) fonética / apraxia de fala de disartria / vocais / disártricos / velocidade de fala
- D) fonética / disartria de parafasia fonêmica / fonéticos / disártricos / intenção comunicativa
- E) fonêmica / apraxia de fala de parafasia fonêmica / fonéticos / apráxicos / velocidade de fala

Questão 24 (Peso 0,75)

Sabe-se que o crescimento e desenvolvimento maxilofacial acontecem de maneira harmônica até atingir a fase adulta. No que diz respeito aos mecanismos de crescimento ósseo, é correto afirmar que

- A) o deslocamento primário ocorre por compressão de um osso contra o outro.
- B) o deslocamento secundário acontece pela ação indireta do crescimento dos tecidos moles.
- C) o crescimento da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro desloca a maxila para frente e para o lado.
- D) no processo de deslocamento primário, o osso cresce por deposição óssea e se desloca no sentido de aproximar-se do osso vizinho.
- E) o complexo nasomaxilar cresce para trás e para cima, mas é, ao mesmo tempo, deslocado para frente e para baixo.

Questão 25 (Peso 0,75)

As disartrias são ocasionadas por distúrbios neurológicos que atingem a capacidade do sistema nervoso central e/ou periférico de controlar a musculatura envolvida na produção da fala. A respeito da disartria espástica, é correto afirmar que

- A) a avaliação oromotora revela movimentos de língua excessivos durante a fala.
- B) a lesão responsável pela dificuldade de fala está localizada exclusivamente em região cortical.
- C) a disfunção respiratória observada pode ser advinda de um colapso na coordenação respiratória-laríngea.
- D) lesões unilaterais do neurônio motor superior, responsáveis por hemiplegia espástica, produzem disartrias persistentes.
- E) fornecer suporte abdominal empurrando os músculos abdominais durante a expiração não auxilia na melhora do suporte respiratório.

Questão 26 (Peso 0,75)

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico na encefalopatia crônica da infância, analise as assertivas a seguir.

A expressão Paralisia Cerebral remete a uma ampla heterogeneidade de síndromes clínicas caracterizadas por distúrbios motores e alterações posturais. Muitas vezes, o primeiro problema que dificulta a alimentação é a extensão anormal da cabeça, pescoço e também a retração da língua

PORQUE

à medida que a criança tenta levantar e rodar a cabeça, ela utiliza os extensores da cabeça e os músculos intrínsecos da língua para fixar-se. Quando alimentos líquidos e semi-líquidos são ofertados ocorre a redução da extensão da cabeça, o que provoca a realização de movimentos compensatórios na tentativa de controlar a comida na cavidade oral.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 27 (Peso 0,75)

No que diz respeito à função de mastigação do sistema estomatognático, é correto afirmar que

- A) embora a mastigação seja inicialmente uma função reflexa, ela é aperfeiçoada com a experiência.
- B) a mastigação tem como objetivo exclusivo preparar os alimentos para a deglutição, fragmentando-os.
- C) a mastigação unilateral alternada é considerada o padrão maduro dessa função, auxiliando no desenvolvimento dos arcos dentários.
- D) os contatos dentais no lado de balanceio também podem ocorrer de forma fisiológica desde que não interfiram nos contatos do lado de trabalho.
- E) o aspecto sensorial da erupção da dentição permanente funciona como guia para os músculos mastigatórios no desenvolvimento da função de mastigação.

Questão 28 (Peso 0,75)

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal, analise as assertivas a seguir.

Um dos testes complementares para avaliação da ressonância em sujeitos com fissura labiopalatina envolve o uso do espelho de Glatzel, colocado sob as narinas do paciente durante emissão sustentada de fonemas orais isolados, em vocábulos e sentenças, e sopro prolongado. Esse teste, no entanto, não deve ser realizado na presença de fístula

PORQUE

não é possível verificar o grau de influência da fístula, se observado escape de ar nasal.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 29 (Peso 0,75)

Com relação à terapia fonoaudiológica para a dispraxia verbal, é correto afirmar que

- A) as técnicas para o controle do ritmo de fala são contraindicadas.
- B) a terapia é contraindicada após a fase aguda da doença neurológica de base.
- C) a escolha da abordagem terapêutica depende, exclusivamente, da severidade do quadro dispráxico.
- D) as abordagens mistas, que envolvem a articulação de tarefas motoras e linguísticas, são indicadas em casos de dispraxia verbal.
- E) as abordagens articulatórias cinemáticas apontam para o uso de estímulos táteis-cinestésicos, descartando o apoio em estímulos visuais e auditivos.

Questão 30 (Peso 0,75)

Sobre a intervenção fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas a partir de ajustes posturais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Deitar-se de lado | () Promove a ampliação da orofaringe. |
| (2) Cabeça inclinada | () Promove o estreitamento da orofaringe. |
| (3) Cabeça para trás | () Aumenta oclusão das vias respiratórias. |
| (4) Cabeça para baixo | () Aumenta o fechamento das pregas vocais. |
| (5) Rotação de cabeça | () Elimina a ação da gravidade sobre resíduos na faringe. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 4 5 2 3
- B) 3 4 5 2 1
- C) 3 5 2 4 1
- D) 4 2 3 5 1
- E) 5 2 3 4 2

Questão 31 (Peso 1,00)

Na adolescência, ocorre mudança no comprimento das pregas vocais e, conseqüentemente, na frequência fundamental da voz em uma relação _____, ou seja, com uma _____ estrutura vibrátil, _____ será a frequência vibratória, havendo o agravamento vocal esperado (ALMEIDA; BALATA, 2014).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) direta / maior / maior
- B) direta / maior / menor
- C) direta / menor / menor
- D) indireta / menor / maior
- E) indireta / maior / menor

Questão 32 (Peso 1,00)

Sobre a voz de pacientes com câncer de laringe submetidos a laringectomias horizontais supraglóticas, é correto afirmar que

- A) a soprosidade é observada pela perda da função esfínctérica da laringe.
- B) a rugosidade é a principal característica em virtude do encurtamento do trato vocal.
- C) o padrão ressonantal não está comprometido, apesar da alteração estrutural da laringe.
- D) o padrão de voz molhado pode ser observado em virtude do acúmulo de saliva e/ou alimento na neolaringe.
- E) o padrão ressonantal é alterado, com predomínio de ressonância *cul de sac*, em virtude da posição elevada e posteriorizada da língua.

Questão 33 (Peso 1,00)

Considerando as inter-relações anatômicas e fisiológicas das estruturas envolvidas nas funções de fonação e deglutição, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As paralisias de prega vocal estão entre as causas mais comuns de aspiração de resíduos e/ou líquidos durante a deglutição.
- () O fechamento da laringe durante a fase orofaríngea da deglutição ocorre pela participação da epiglote e das pregas vestibulares e vocais.
- () O mecanismo de elevação da laringe na fase orofaríngea da deglutição está associado à penetração de resíduos em vias aéreas inferiores.
- () Alterações vocais relacionadas a fase oral preparatória e fase oral da deglutição são comuns, e nem sempre estão associadas à presença de desequilíbrios musculares orofaciais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 34 (Peso 1,00)

Sobre a avaliação e tratamento da voz para indivíduos com surdez, analise as assertivas a seguir.

A qualidade vocal de indivíduos com surdez pode se apresentar alterada em relação à ressonância, sendo hipernasal, hiponasal ou *cull de sac*

PORQUE

apesar das estruturas anatômicas e os processos fisiológicos envolvidos na fonação estarem preservados, o feedback auditivo reduzido ou ausente interfere no monitoramento da movimentação do esfíncter velofaríngeo e no posicionamento da língua.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 35 (Peso 1,00)

Na laringectomia _____, a principal alteração fonoaudiológica observada é _____, enquanto que na laringectomia _____ observa-se frequentemente alteração _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) frontal anterior / na deglutição / parcial vertical / no padrão ressonantal
- B) parcial vertical / na deglutição / horizontal supraglótica / no padrão vocal
- C) parcial vertical / no padrão vocal / horizontal supraglótica / na deglutição
- D) horizontal supraglótica / no padrão vocal / parcial vertical / na deglutição
- E) horizontal supraglótica / no padrão ressonantal / parcial vertical / na deglutição

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

Sobre os Cuidados Paliativos, é correto afirmar que

- A) a concomitância da abordagem paliativa com o tratamento curativo é inviável.
- B) os cuidados paliativos se resumem apenas aos cuidados dispensados no final da vida.
- C) em cuidados paliativos, o foco da atenção é a doença, sempre promovendo medidas para atingir a cura.
- D) o cuidado paliativo é a abordagem que promove a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento.
- E) o cuidado paliativo preconiza o tratamento de sintomas, como alívio da dor. Outros problemas de natureza psicossocial e espiritual devem ser tratados com outra equipe diferente dos cuidados paliativos.

Questão 37 (Peso 1,00)

Sobre tanatologia, estado terminal e luto, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Viver o luto significa: aceitar a realidade da perda, enfrentar as emoções do pesar, adaptar-se à vida sem a pessoa e encontrar maneiras adequadas para lembrar o falecido.
- () Por se tratar de um fenômeno complexo, identificamos cinco dimensões nas reações frequentemente encontradas no luto: intelectual, emocional, física, espiritual e social.
- () O objetivo da eutanásia é aliviar o sofrimento do paciente causado por um ou mais sintomas refratários, enquanto que, na sedação, a intenção é provocar a morte do paciente para libertá-lo de seu sofrimento.
- () Na fase final de vida, não é necessário rever quais são as medicações essenciais. As medicações de uso prévio do paciente devem ser mantidas para o controle adequado das doenças crônicas até o falecimento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V V F V
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 38 (Peso 1,00)

Considerando os dados sobre a mortalidade e morbidade do câncer no Brasil, é correto afirmar que

- A) as neoplasias são a principal causa de mortalidade na maioria das cidades brasileiras.
- B) dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontaram o câncer de pulmão como a principal causa de morte por câncer entre os homens desde 2015.
- C) a distribuição da incidência por região geográfica do país aponta que 70% dos novos casos concentram-se na Região Nordeste devido ao menor nível de desenvolvimento sociocultural.
- D) as transições demográficas e epidemiológicas globais, associados ao desenvolvimento impressionante do tratamento do câncer, sinalizam um impacto cada vez menor da carga de câncer nas próximas décadas.
- E) o aumento da incidência dos casos de pacientes com câncer está relacionado principalmente ao envelhecimento da população, não demonstrando relação com a mudança dos hábitos de vida e melhoria dos métodos diagnósticos.

Questão 39 (Peso 1,00)

Sobre a biologia do câncer é correto afirmar que

- A) a base do desenvolvimento do câncer é genético, portanto 90% dos casos são hereditários.
- B) o câncer é uma doença caracterizada pela expressão descontrolada de genes, ou seja, é uma doença genética.
- C) a pesquisa de biomarcadores moleculares para diagnóstico, prognóstico e terapia não atingiu resultados impactantes.
- D) a compreensão de como os cânceres se originam está sendo continuamente melhorada, mas não tem relação com pesquisa biológica.
- E) o conjunto de alelos presente nos genomas de todos os membros de uma espécie – reservatório de genes dessa espécie – se torna progressivamente mais homogêneo à medida que a espécie envelhece.

Questão 40 (Peso 1,00)

Sobre a fisiopatologia do câncer, é correto afirmar que

- A) os proto-oncogenes e genes supressores de tumores não são genes celulares normais.
- B) os produtos de proto-oncogenes e genes supressores de tumores não estabelecem relação com as vias de transdução de sinais.
- C) o desenvolvimento e a progressão do câncer, com poucas exceções, deriva da expansão clonal de uma única célula somática que adquire uma série de alterações genéticas, que resultam na alteração da atividade de múltiplos genes.
- D) a interação entre fatores exógenos e endógenos levam à diminuição do estresse oxidativo, resultando em menos danos ao DNA.
- E) os produtos de proto-oncogenes e genes supressores de tumores não estabelecem relação com os processos biológicos como proliferação, diferenciação, sobrevivência e morte celular.

Questão 41 (Peso 1,00)

Em relação aos fatores de risco para desenvolvimento do câncer e as medidas de prevenção, é correto afirmar que

- A) o tabagismo é o principal fator de risco associado ao desenvolvimento do câncer de pulmão, mas sua relação com outros tipos de cânceres não é bem documentada.
- B) apesar do conhecimento da obesidade como fator de risco importante para doenças cardiovasculares, a relação da obesidade com o câncer é praticamente inexistente.
- C) devido a grande relação do desenvolvimento do câncer com a idade, para os indivíduos acima de 60 anos não existem medidas de prevenção para modificar a chance de desenvolver câncer.
- D) o objetivo da prevenção secundária é detectar e tratar doenças pré-malignas (por exemplo, lesão causada pelo vírus HPV ou pólipos nas paredes do intestino) ou cânceres assintomáticos iniciais.
- E) existem fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis para o desenvolvimento do câncer, mas infelizmente, os fatores de risco modificáveis são mínimos, tendo um impacto na redução do risco de desenvolver câncer em menos de 10%.

Questão 42 (Peso 1,00)

Em relação ao estadiamento do câncer, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O câncer pela sua própria definição já constitui uma doença avançada e incurável.
- () A diferenciação celular evidenciada pelas características anatomopatológicas da célula neoplásica, não se relaciona com o prognóstico da doença.
- () O estadiamento clínico do câncer está diretamente relacionado as suas chances de cura, ou seja, se o estadiamento é inicial ao diagnóstico, a chance de cura é muito maior.
- () As informações sobre o acometimento linfonodal, o tamanho do tumor e a ausência ou a presença de doença, além do sítio primário, constituem informações imprescindíveis para a definição do estadiamento clínico da doença oncológica.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 43 (Peso 1,00)

Em relação à metástase, é correto afirmar que

- A) a metástase pode ocorrer pela via da circulação linfática, mas muito raramente ocorre pela invasão da circulação sanguínea.
- B) a angiogênese do tumor é um processo irrelevante para o crescimento do tumor primário e disseminação de células tumorais.
- C) estudos recentes têm fornecido evidências crescentes de que não existe qualquer relação do sistema imunológico na progressão do câncer.
- D) a metástase, que é responsável por mais de 90% das mortes por câncer, é uma doença sistêmica, definida como o desenvolvimento de tumores secundários a certa distância do local primário do câncer.
- E) as células do tumor primário adquirem progressivamente características que as fariam adquirir a capacidade de migrar pelo organismo, invadir a circulação sanguínea, mas não a circulação linfática.

Questão 44 (Peso 1,00)

Em relação ao rastreamento do câncer, é correto afirmar que

- A) o sangue oculto nas fezes e a colonoscopia não são exames indicados para o rastreamento do câncer de intestino.
- B) o rastreamento do câncer de pulmão com tomografia computadorizada de tórax para a população em geral não é recomendado.
- C) todo indivíduo que fuma, independente da carga tabágica, deve ser submetido à realização de radiografia de tórax anualmente.
- D) a mamografia, como exame de rastreamento do câncer de mama, é indicada para todas as mulheres acima de 30 anos, independente de fatores de risco.
- E) no rastreamento do câncer de próstata, é indicada a realização do exame de sangue com avaliação do PSA. O exame do toque retal deve ser realizado apenas quando o resultado do PSA encontra-se muito elevado.

Questão 45 (Peso 1,00)

Em relação ao rastreamento, à prevenção e à detecção precoce do câncer de mama, é correto afirmar que

- A) as medidas de prevenção primária e secundária têm pouco impacto no câncer de mama.
- B) a história familiar de câncer de mama em homens não constitui um fator de risco de câncer de mama.
- C) cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como: praticar atividade física; alimentar-se de forma saudável; manter o peso corporal adequado e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
- D) o câncer de mama de caráter genético/hereditário corresponde a quase 90% do total de casos da doença.
- E) o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento (exame realizado quando não há sinais, nem sintomas suspeitos) seja ofertada para mulheres entre 35 e 75 anos, anualmente.

Questão 46 (Peso 1,00)

Em relação ao rastreamento, à prevenção e à detecção precoce do câncer de pulmão, é correto afirmar que

- A) em pacientes assintomáticos sob risco de câncer de pulmão ou com sintomas precoces sugestivos (emagrecimento, tosse persistente, padrão de tosse diferente do habitual), a realização do raio-X de tórax é de grande valor.
- B) após 10 anos de cessação do tabagismo, o risco de desenvolver câncer de pulmão se iguala ao do indivíduo que nunca fumou.
- C) é indicada a realização de radiografia de tórax a cada seis meses para indivíduos com idade acima de 50 anos e carga tabágica elevada.
- D) o diagnóstico precoce do câncer de pulmão é possível na maioria dos casos, pois os sintomas são comuns e o acesso ao raio-X de tórax é fácil e barato.
- E) o tabagismo é o principal fator de risco associado ao câncer de pulmão, mas evitar o tabagismo passivo não está associado a uma forma de prevenção.

Questão 47 (Peso 1,00)

Em relação à prevenção de agravos em oncologia, é correto afirmar que

- A) na manipulação dos quimioterápicos, o risco de exposição ocorre apenas na fase do preparo.
- B) para a redução efetiva dos riscos entre os trabalhadores da saúde, as medidas de prevenção contempladas por meio da educação continuada não são indicadas.
- C) o risco biológico é o menos presente e incidente aos profissionais que atuam em serviços de saúde manifestos por meio da exposição a sangue e outros fluidos orgânicos.
- D) atualmente, acidentes resultantes de exposição ocupacional a materiais biológicos por trabalhadores da área de saúde não têm sido considerados fatores preocupantes.
- E) na perspectiva de minimizar a exposição ocupacional e evitar possibilidades de agravos, faz-se necessário que os trabalhadores do setor de oncologia conheçam e identifiquem os riscos gerados em seu ambiente de trabalho.

Questão 48 (Peso 1,00)

Sobre o tratamento em oncologia, é correto afirmar que

- A) reuniões multidisciplinares pouco acrescentam na qualidade e desfecho do tratamento oncológico.
- B) raramente são combinadas mais de uma modalidade (radioterapia, cirurgia e quimioterapia) no tratamento do câncer.
- C) apesar da complexidade do tratamento, o médico oncologista clínico é o especialista mais importante e suficiente no tratamento do câncer.
- D) de uma forma geral, a radioterapia sempre está indicada no tratamento do câncer, principalmente diante de uma doença avançada, com metástases.
- E) o tratamento oncológico está baseado na radioterapia, quimioterapia e cirurgia. As indicações de cada tratamento dependem do sítio primário e do estadiamento clínico.

Questão 49 (Peso 1,00)

Sobre a detecção precoce do câncer, é correto afirmar que

- A) o rastreamento do câncer colorretal não se mostrou eficaz na redução da mortalidade por essa neoplasia.
- B) a maioria dos consensos norte-americanos recomenda o rastreamento do câncer de mama de rotina dos 40 aos 80 anos.
- C) o rastreamento periódico do câncer do colo uterino deve ser realizado com colpocitologia oncótica e biópsia aleatória a partir dos 18 anos.
- D) não há evidência que medidas custo-efetivas de prevenção primária e de estratégias para a detecção de lesões pré-invasivas ou do câncer, em fases precoces, reduzem a mortalidade pelo câncer.
- E) o rastreamento do câncer de mama em populações de alto risco ainda não se provou muito eficaz na redução de mortalidade. A principal estratégia para a prevenção nessas mulheres consiste em mastectomia bilateral e ooforectomia bilateral profiláticas.

Questão 50 (Peso 1,00)

Sobre o diagnóstico do câncer, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Neoplasias são classificadas em benignas e malignas.
- () Atualmente, ainda é importante a classificação das neoplasias a partir de critérios morfológicos, macro e microscópicos.
- () Neoplasias malignas são genericamente conhecidas como cânceres. Enquanto neoplasias benignas tendem a crescer de maneira circunscrita ao seu tecido de origem.
- () A descrição de variáveis moleculares não agrega informações ao diagnóstico, como, por exemplo, classificar lesões em potencialmente responsivas a um ou outro tratamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F V F
- C) V V F F
- D) F F V V
- E) F V V F