

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013).

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que

- A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao mesmo tempo.
- B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter universal nem está fundamentada em conclusões sólidas.
- C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível.
- D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo.
- E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais.

Questão 02 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _____ se refere à identificação de potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é

- A) da equidade
- B) da autonomia
- C) da integralidade
- D) do empoderamento
- E) da participação social

Questão 03 (Peso 0,50)

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada

- A) virulência.
- B) patogenicidade.
- C) teratogenicidade.
- D) transmissibilidade.
- E) persistência do agente biológico no ambiente.

Questão 04 (Peso 0,50)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que

- A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 05 (Peso 0,50)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual.

Questão 06 (Peso 0,75)

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente em todos os espaços de produção de saúde.

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que

- A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores.
- B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda que menos resolutivo.
- C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do SUS, exceto no âmbito da gestão.
- D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores.
- E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado.

Questão 07 (Peso 0,75)

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8).

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que

- A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou científico.
- B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas.
- C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.
- D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a especificidade dos conhecimentos desta área.
- E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, embora não seja considerada uma prática social.

Questão 08 (Peso 0,75)

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das “[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011).

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela qual ela pode gerenciar sua própria vontade.
- () Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo assim, anula-se a ideia de equidade em saúde.
- () O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria.
- () Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 09 (Peso 0,75)

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, portanto, melhor planejar as ações em saúde.

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que

- A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são avaliados pelos indicadores de processo.
- B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos e da estrutura organizacional do serviço de saúde.
- C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais.
- D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado.
- E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade.

Questão 10 (Peso 0,75)

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes modelos de Vigilância em Saúde.

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que

- A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção com qualidade, efetividade e equidade à população.
- B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde.
- C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde.
- D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos.
- E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias.
- () A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde.
- () A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle.
- () A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 12 (Peso 0,75)

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010).

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas.
- () As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação.
- () A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança.
- () Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 0,75)

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde” (ONA, 2014).

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que

- A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma escolha da organização de saúde.
- B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à qualidade dos serviços ofertados à população.
- C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do qual é emitido um certificado para a instituição avaliada.
- D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas.
- E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso.

Questão 14 (Peso 0,75)

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde (RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4).

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- () Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares.
- () A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados.
- () A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 15 (Peso 0,75)

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” (BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015).

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares.
- () A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação.
- () Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde.
- () Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

O reflexo acústico funciona como um mecanismo de proteção da orelha interna mediante uma estimulação intensa e apresenta uma via aferente única e uma via eferente bilateral, representadas respectivamente, pelos _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) nervo facial e nervo trigêmeo
- B) nervo trigêmeo e nervo facial
- C) nervo vestibulo-coclear e nervo facial
- D) nervo vestibulo-coclear e núcleo coclear ventral
- E) nervo vestibulo-coclear e complexo olivar superior

Questão 17 (Peso 0,50)

Os potenciais auditivos evocados (PEAs) avaliam a atividade neuroelétrica na via auditiva, desde o nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico. Estes potenciais podem ser classificados de acordo com a latência em curtos, médios ou tardios. O PEA de curta latência mais utilizado clinicamente, devido a sua reprodutibilidade e geradores bem definidos, é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) (MATAS; MAGLIARO, 2015).

Considerando as aplicações, a realização do exame e a interpretação dos resultados do PEATE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A amplitude e a latência das ondas do PEATE diminuem de acordo com a redução na intensidade do estímulo teste.
- () O limiar eletrofisiológico corresponde ao menor valor de intensidade de estímulo em que se observa a presença da onda V.
- () A análise do tempo de latência das ondas do PEATE, realizado na intensidade de 80 dBNA, permite definir o tipo e grau da perda auditiva.
- () Para a análise dos traçados do PEATE de neonatos e lactentes, deve-se considerar o efeito de maturação da via auditiva sobre a latência, a amplitude e a morfologia das ondas.
- () Na avaliação da integridade da via auditiva, utiliza-se, frequentemente, o estímulo clique, geralmente em torno de 80dB, e analisa-se as latências absolutas e os interpicos das ondas I, III e V.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F V
- B) V V F V F
- C) V F V V F
- D) F F V V V
- E) F V F V V

Questão 18 (Peso 0,50)

Baixo desempenho na avaliação comportamental do processamento auditivo nos testes de fala com ruído branco e dicótico de dissílabos alternados (SSW) revelam, respectivamente, dificuldade nas habilidades auditivas de _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) fechamento e figura-fundo
- B) localização e figura-fundo
- C) figura-fundo e fechamento
- D) resolução temporal e fechamento
- E) figura-fundo e resolução temporal

Questão 19 (Peso 0,50)

Considerando os componentes e as características do aparelho de amplificação sonora individual (AASI), numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|------------------|--|
| (1) Ganho | () Apresenta relação com o ganho do AASI. |
| (2) Receptor | () Transforma o sinal elétrico em onda sonora. |
| (3) Microfone | () Transforma a onda sonora em energia elétrica. |
| (4) Amplificador | () Apresenta relação com o amplificador e com o receptor do AASI. |
| (5) Saída máxima | () Consiste na diferença em decibéis entre o som que entra no microfone e o que é liberado no receptor. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 5 2 3 4 2
- B) 4 2 3 5 1
- C) 3 5 2 4 1
- D) 2 1 4 3 5
- E) 1 4 5 2 3

Questão 20 (Peso 0,50)

De acordo com Ferre e Bellis (2004), os transtornos do processamento auditivo central podem ser classificados em três subperfis primários (decodificação auditiva, prosódia e integração) e dois secundários (associação e organização de resposta), considerando a correlação entre os achados na avaliação do processamento auditivo e os processos neurofisiológicos comportamentais, cognitivos e acadêmicos, bem como as manifestações na comunicação.

Sobre os indivíduos com transtorno do processamento auditivo classificado como associação, é correto afirmar que

- A) apresentam inabilidade em aplicar as regras da língua.
- B) mostram dificuldade na nomeação e na imitação de padrões temporais.
- C) revelam maior dificuldade de discriminação de sons em ambientes ruidosos.
- D) o local da disfunção é o córtex auditivo primário do hemisfério dominante para a linguagem.
- E) mostram dificuldade em tarefas que exijam transferência inter-hemisférica por disfunção no corpo caloso.

Questão 21 (Peso 0,75)

Desde o final do século XX, a introdução de técnicas de neuroimagem, como a tomografia por emissão de pósitrons e a ressonância magnética funcional, tem levado os estudos a um modelo funcional de organização da linguagem no cérebro.

Sobre esse modelo, é correto afirmar que

- A) a região da ínsula não participa do processamento cerebral da linguagem.
- B) a região frontal inferior esquerda participa do processo de compreensão verbal.
- C) somente a área de Wernicke participa da compreensão da linguagem em contexto.
- D) as áreas 39, 40 e 41 de Brodmann não participam do processamento da linguagem.
- E) o giro fusiforme está envolvido em processos periféricos de processamento da escrita.

Questão 22 (Peso 0,75)

Sobre as consequências do traumatismo cranioencefálico (TCE) sobre a linguagem, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A presença de perturbação da comunicação em casos de TCE independe da gravidade da lesão cerebral.
- () A avaliação das funções cognitivas nesses casos pode ser realizada pelo fonoaudiólogo a partir de procedimentos não padronizados.
- () Para fins diagnósticos, é fundamental que o fonoaudiólogo priorize a aplicação completa de testes padronizados elaborados para avaliação de pacientes afásicos.
- () De maneira geral, em sujeitos vítimas de TCE, observam-se, predominantemente, alterações que afetam o nível sintático da linguagem devido à forte presença de anomias.
- () Distúrbios cognitivos da comunicação têm grande impacto no discurso de sujeitos vítimas de TCE, mas podem ser observados em outros quadros que envolvem lesões focais em região parieto-occipital.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F
- B) V V F F F
- C) F V F V F
- D) F V V F F
- E) F F V F V

Questão 23 (Peso 0,75)

Erros de produção _____ não podem diferenciar _____, mas os parâmetros _____ podem. Pacientes _____ produzem vogais mais longas e apresentam redução da _____, o que não muda a significação do que é dito.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) fonêmica / apraxia de fala de afasia / vocais / apráxicos / intensidade vocal
- B) fonética / disartria de afasia / fonológicos / afásicos / intenção comunicativa
- C) fonética / apraxia de fala de disartria / vocais / disártricos / velocidade de fala
- D) fonética / disartria de parafasia fonêmica / fonéticos / disártricos / intenção comunicativa
- E) fonêmica / apraxia de fala de parafasia fonêmica / fonéticos / apráxicos / velocidade de fala

Questão 24 (Peso 0,75)

Sabe-se que o crescimento e desenvolvimento maxilofacial acontecem de maneira harmônica até atingir a fase adulta. No que diz respeito aos mecanismos de crescimento ósseo, é correto afirmar que

- A) o deslocamento primário ocorre por compressão de um osso contra o outro.
- B) o deslocamento secundário acontece pela ação indireta do crescimento dos tecidos moles.
- C) o crescimento da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro desloca a maxila para frente e para o lado.
- D) no processo de deslocamento primário, o osso cresce por deposição óssea e se desloca no sentido de aproximar-se do osso vizinho.
- E) o complexo nasomaxilar cresce para trás e para cima, mas é, ao mesmo tempo, deslocado para frente e para baixo.

Questão 25 (Peso 0,75)

As disartrias são ocasionadas por distúrbios neurológicos que atingem a capacidade do sistema nervoso central e/ou periférico de controlar a musculatura envolvida na produção da fala. A respeito da disartria espástica, é correto afirmar que

- A) a avaliação oromotora revela movimentos de língua excessivos durante a fala.
- B) a lesão responsável pela dificuldade de fala está localizada exclusivamente em região cortical.
- C) a disfunção respiratória observada pode ser advinda de um colapso na coordenação respiratória-laríngea.
- D) lesões unilaterais do neurônio motor superior, responsáveis por hemiplegia espástica, produzem disartrias persistentes.
- E) fornecer suporte abdominal empurrando os músculos abdominais durante a expiração não auxilia na melhora do suporte respiratório.

Questão 26 (Peso 0,75)

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico na encefalopatia crônica da infância, analise as assertivas a seguir.

A expressão Paralisia Cerebral remete a uma ampla heterogeneidade de síndromes clínicas caracterizadas por distúrbios motores e alterações posturais. Muitas vezes, o primeiro problema que dificulta a alimentação é a extensão anormal da cabeça, pescoço e também a retração da língua

PORQUE

à medida que a criança tenta levantar e rodar a cabeça, ela utiliza os extensores da cabeça e os músculos intrínsecos da língua para fixar-se. Quando alimentos líquidos e semi-líquidos são ofertados ocorre a redução da extensão da cabeça, o que provoca a realização de movimentos compensatórios na tentativa de controlar a comida na cavidade oral.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 27 (Peso 0,75)

No que diz respeito à função de mastigação do sistema estomatognático, é correto afirmar que

- A) embora a mastigação seja inicialmente uma função reflexa, ela é aperfeiçoada com a experiência.
- B) a mastigação tem como objetivo exclusivo preparar os alimentos para a deglutição, fragmentando-os.
- C) a mastigação unilateral alternada é considerada o padrão maduro dessa função, auxiliando no desenvolvimento dos arcos dentários.
- D) os contatos dentais no lado de balanceio também podem ocorrer de forma fisiológica desde que não interfiram nos contatos do lado de trabalho.
- E) o aspecto sensorial da erupção da dentição permanente funciona como guia para os músculos mastigatórios no desenvolvimento da função de mastigação.

Questão 28 (Peso 0,75)

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal, analise as assertivas a seguir.

Um dos testes complementares para avaliação da ressonância em sujeitos com fissura labiopalatina envolve o uso do espelho de Glatzel, colocado sob as narinas do paciente durante emissão sustentada de fonemas orais isolados, em vocábulos e sentenças, e sopro prolongado. Esse teste, no entanto, não deve ser realizado na presença de fístula

PORQUE

não é possível verificar o grau de influência da fístula, se observado escape de ar nasal.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 29 (Peso 0,75)

Com relação à terapia fonoaudiológica para a dispraxia verbal, é correto afirmar que

- A) as técnicas para o controle do ritmo de fala são contraindicadas.
- B) a terapia é contraindicada após a fase aguda da doença neurológica de base.
- C) a escolha da abordagem terapêutica depende, exclusivamente, da severidade do quadro dispráxico.
- D) as abordagens mistas, que envolvem a articulação de tarefas motoras e linguísticas, são indicadas em casos de dispraxia verbal.
- E) as abordagens articulatórias cinemáticas apontam para o uso de estímulos táteis-cinestésicos, descartando o apoio em estímulos visuais e auditivos.

Questão 30 (Peso 0,75)

Sobre a intervenção fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas a partir de ajustes posturais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) Deitar-se de lado | () Promove a ampliação da orofaringe. |
| (2) Cabeça inclinada | () Promove o estreitamento da orofaringe. |
| (3) Cabeça para trás | () Aumenta oclusão das vias respiratórias. |
| (4) Cabeça para baixo | () Aumenta o fechamento das pregas vocais. |
| (5) Rotação de cabeça | () Elimina a ação da gravidade sobre resíduos na faringe. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 4 5 2 3
- B) 3 4 5 2 1
- C) 3 5 2 4 1
- D) 4 2 3 5 1
- E) 5 2 3 4 2

Questão 31 (Peso 1,00)

Na adolescência, ocorre mudança no comprimento das pregas vocais e, conseqüentemente, na frequência fundamental da voz em uma relação _____, ou seja, com uma _____ estrutura vibrátil, _____ será a frequência vibratória, havendo o agravamento vocal esperado (ALMEIDA; BALATA, 2014).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) direta / maior / maior
- B) direta / maior / menor
- C) direta / menor / menor
- D) indireta / menor / maior
- E) indireta / maior / menor

Questão 32 (Peso 1,00)

Sobre a voz de pacientes com câncer de laringe submetidos a laringectomias horizontais supraglóticas, é correto afirmar que

- A) a soprosidade é observada pela perda da função esfínctérica da laringe.
- B) a rugosidade é a principal característica em virtude do encurtamento do trato vocal.
- C) o padrão ressonantal não está comprometido, apesar da alteração estrutural da laringe.
- D) o padrão de voz molhado pode ser observado em virtude do acúmulo de saliva e/ou alimento na neolaringe.
- E) o padrão ressonantal é alterado, com predomínio de ressonância *cul de sac*, em virtude da posição elevada e posteriorizada da língua.

Questão 33 (Peso 1,00)

Considerando as inter-relações anatômicas e fisiológicas das estruturas envolvidas nas funções de fonação e deglutição, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As paralisias de prega vocal estão entre as causas mais comuns de aspiração de resíduos e/ou líquidos durante a deglutição.
- () O fechamento da laringe durante a fase orofaríngea da deglutição ocorre pela participação da epiglote e das pregas vestibulares e vocais.
- () O mecanismo de elevação da laringe na fase orofaríngea da deglutição está associado à penetração de resíduos em vias aéreas inferiores.
- () Alterações vocais relacionadas a fase oral preparatória e fase oral da deglutição são comuns, e nem sempre estão associadas à presença de desequilíbrios musculares orofaciais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 34 (Peso 1,00)

Sobre a avaliação e tratamento da voz para indivíduos com surdez, analise as assertivas a seguir.

A qualidade vocal de indivíduos com surdez pode se apresentar alterada em relação à ressonância, sendo hipernasal, hiponasal ou *cull de sac*

PORQUE

apesar das estruturas anatômicas e os processos fisiológicos envolvidos na fonação estarem preservados, o feedback auditivo reduzido ou ausente interfere no monitoramento da movimentação do esfíncter velofaríngeo e no posicionamento da língua.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

Questão 35 (Peso 1,00)

Na laringectomia _____, a principal alteração fonoaudiológica observada é _____, enquanto que na laringectomia _____ observa-se frequentemente alteração _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) frontal anterior / na deglutição / parcial vertical / no padrão ressonantal
- B) parcial vertical / na deglutição / horizontal supraglótica / no padrão vocal
- C) parcial vertical / no padrão vocal / horizontal supraglótica / na deglutição
- D) horizontal supraglótica / no padrão vocal / parcial vertical / na deglutição
- E) horizontal supraglótica / no padrão ressonantal / parcial vertical / na deglutição

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

As proteínas são moléculas orgânicas formadas a partir da ligação peptídica entre dois aminoácidos, sendo sua estrutura constituída de diferentes combinações entre apenas vinte aminoácidos. Sobre as proteínas e sua biodisponibilidade, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Frutas e hortaliças são fontes ricas em proteína, por isso devem ser consumidas diariamente.
- () Soja é classificada como única proteína vegetal completa, pois fornece aminoácidos em quantidade suficiente para a manutenção orgânica.
- () Proteínas derivadas de carne, leite, ovos, peixes e aves apresentam todos os aminoácidos essenciais ao homem em quantidade adequada a seu crescimento e manutenção, por isso são classificadas como proteínas completas.
- () Considerando as funções específicas adquiridas pelas diversas combinações de aminoácidos presentes na sua composição, as proteínas podem ser classificadas em hormônios, enzimas, proteínas contráteis, proteínas estruturais, proteínas de reserva nutritiva e outras.
- () Apesar das limitações nutricionais apresentadas pelas proteínas vegetais, quando vários tipos de alimentos desse grupo são consumidos simultaneamente em proporções balanceadas podem apresentar valor proteico equivalente ao das proteínas de origem animal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F V
- B) V F V F F
- C) F V F V V
- D) F F V V V
- E) F F F V F

Questão 37 (Peso 1,00)

“A orientação nutricional é um pilar importante do tratamento do Diabetes melito (DM), sendo que o foco da abordagem atual não é uma dieta restritiva, estando bem mais próxima de uma abordagem em que são atendidas as necessidades nutricionais, de acordo com a idade, o tipo de diabetes e o estilo de vida” (CASTRO; MIACHON, 2009, p.514).

Sobre a conduta nutricional recomendada para crianças com DM, é correto afirmar que

- A) as dietas hiperproteicas são recomendadas, a fim de melhorar o controle metabólico.
- B) os adoçantes são contraindicados para crianças, não havendo indicação do uso destes para essa fase da vida.
- C) as dietas restritas em carboidratos não estão indicadas a pacientes diabéticos, não devendo a oferta destes ser inferior a 130 g/dia.
- D) a ingestão aumentada de gorduras poli-insaturadas deve ser estimulada, devendo representar 25% do valor calórico diário, pois diminuem as concentrações de triglicérides.
- E) as necessidades nutricionais de crianças com DM1 e DM2 são aumentadas em relação às crianças da mesma faixa etária, devido ao hipercatabolismo causado pela doença.

Questão 38 (Peso 1,00)

Em razão da sua importância na nutrição humana, os carboidratos estão entre os nutrientes mais estudados nas diversas áreas da ciência. Sobre a digestão, absorção e metabolismo dos carboidratos, é correto afirmar que

- A) ptialina é a enzima que apresenta maior atividade na borda em escova, participando ativamente do processo de digestão e absorção dos carboidratos a nível intestinal.
- B) carboidratos não disponíveis são aqueles que não podem ser digeridos, metabolizados e utilizados, portanto não podem fornecer qualquer fonte de energia ao organismo.
- C) a ação da α -amilase salivar é bloqueada imediatamente ao entrar no estômago, pelo simples contato com o ambiente ácido. Portanto, não se pode esperar nenhum efeito desta sobre a digestão dos amidos a nível gástrico.
- D) as mudanças ocorridas com os carboidratos no estômago não interferem nas estruturas conformacionais das moléculas que se apresentarão aos sistemas enzimáticos e transportadores que possibilitarão seu aproveitamento no intestino delgado.
- E) na boca, além do impacto mecânico da mastigação, os amidos sofrem ação da α -amilase salivar, enzima α -glicosidase, responsável pelo início da hidrólise das moléculas de amido. Sua ação se restringe à quebra parcial das longas cadeias polissacarídicas do amido, permanecendo intactos todos os carboidratos com menor grau de polimerização.

Questão 39 (Peso 1,00)

O termo lipídio se refere a diversos compostos químicos que têm como característica comum o fato de serem insolúveis em água. Sobre a digestão, absorção e biodisponibilidade dos lipídios, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os triacilgliceróis, os fosfolipídios e os ésteres de colesterol dos alimentos, ao serem ingeridos, mesmo sem sofrer digestão, conseguem atravessar as membranas das células intestinais por difusão passiva.
- () A digestão dos lipídios provenientes da alimentação, inclusive dos fosfolipídios e ésteres de colesterol, é efetuada especificamente por enzimas que digerem os triacilgliceróis, denominadas lipases pancreáticas.
- () As lipoproteínas são moléculas formadas por fosfolipídios, colesterol livre e proteínas, que envolvem os triacilgliceróis e ésteres de colesterol, permitindo o transporte dos lipídios pelo sangue após a absorção, mesmo sendo insolúveis em meio aquoso.
- () Os quilomícrons são as primeiras lipoproteínas formadas após absorção dos lipídios. São sintetizadas no retículo endoplasmático das células epiteliais do intestino delgado, e têm como função transportar os triacilgliceróis e o colesterol, provenientes da dieta, para os tecidos periféricos e para o fígado, respectivamente.
- () As micelas são partículas muito pequenas e facilmente difundidas nas microvilosidades dos enterócitos, permitindo que os diversos componentes lipídicos entrem nas células epiteliais por difusão. Após a absorção, os componentes lipídicos são reesterificados como triacilgliceróis, fosfolipídios e éster de colesterol, e os ácidos graxos de cadeia curta e média são secretados diretamente dos enterócitos para a veia porta.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F V
- B) V F V F V
- C) F V F V F
- D) F F V V V
- E) F F F V F

Questão 40 (Peso 1,00)

Adolescente, 16 anos, sexo feminino, eutrófica, comparece à consulta com nutricionista acompanhada da mãe, com relato de alterações no comportamento alimentar nos últimos três meses, temor intenso de ganhar peso, com sinais de perturbação na percepção da forma e do peso corporal. Em associação, apresenta episódios repetidos de compulsões alimentares, acompanhados por comportamentos compensatórios inadequados, tais como: vômitos autoinduzidos, mau uso de laxantes e diuréticos, jejuns ou exercícios físicos excessivos, sem que se evidencie perda de peso significativa.

Considerando esse caso clínico, a principal suspeita diagnóstica é

- A) Bulimia.
- B) Anorexia.
- C) Vigorexia.
- D) Ortorexia.
- E) Psicose alimentar inespecífica.

Questão 41 (Peso 1,00)

A.M.S., sexo feminino, 20 anos, solteira. Queixa e duração: em outubro de 2017, começou a apresentar diarreia (4 episódios de fezes liquefeitas ao dia); em maio de 2018, iniciou com sintomas de vômitos diariamente, dor abdominal e emagrecimento importante. Antecedentes pessoais: paciente refere que até 2017 não tinha alterações no hábito intestinal. Em consulta com gastroenterologista recebeu diagnóstico de doença de Crohn. Até o momento não havia tido consulta com nutricionista. A partir das medidas antropométricas constatou-se uma adequação de peso de 78,8%, que se refere a uma desnutrição moderada. A paciente apresenta uma alimentação monótona. As preferências alimentares da paciente são: frituras, refrigerantes e salgadinhos. Em relação ao consumo diário, refere consumo de: produtos lácteos 3 a 4 vezes; cereais 2 a 3 vezes; grãos 1 vez; fruta 1 vez; verduras e/ ou legumes 1 vez; doces 1 vez e refrigerante 1 a 2 vezes.

A dieta que deve ser orientada na fase aguda é

- A) isenta de lactose e isenta de fibras.
- B) isenta de lactose e com pouco teor de gordura.
- C) isenta de sacarose e com elevado teor de gordura.
- D) isenta de frutose e com baixo teor de fibras solúveis.
- E) sem bebidas carbonatadas e com elevado teor de fibras insolúveis.

Questão 42 (Peso 1,00)

“Há vários fatores que repercutem na ingestão e no gasto de energia em pacientes portadores de fibrose cística (FC), com consequência variável devido à diferença na expressão clínica e na progressão da doença pulmonar” (MAURI; PATIN; CHIBA, 2009, p. 530). A conduta nutricional mais adequada para crianças com FC é _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) dieta hipocalórica e hipolipídica devido à insuficiência pancreática.
- B) oferta de dieta hipoproteica e hipossódica, a fim de reduzir o declínio da função pulmonar.
- C) oferta aumentada de carboidratos e restrita de gorduras totais na presença de esteatorreia.
- D) dieta variada, hipercalórica e hiperlipídica, a fim de suprir as necessidades aumentadas de energia e gorduras.
- E) restrição de gorduras e proteínas, devendo a oferta ser calculada de acordo com a dose prescrita de enzimas pancreáticas.

Questão 43 (Peso 1,00)

Paciente, 35 anos, portadora de Obesidade grau III associada a Dislipidemia e Síndrome do Ovário Policístico (SOP), procura consultório da nutrição por recomendação do obstetra, que solicita perda de peso urgente antes de engravidar. História prévia de acompanhamento com endócrino, psicólogo e nutricionista nos últimos dois anos, período em que foi submetida a tratamento clínico com dieta, exercício físico, medicação e psicoterapia, tendo apresentado perda leve de peso e reganho imediato após interrupção do tratamento. Diante do que se preconiza atualmente no tratamento da obesidade, a conduta nutricional mais acertada é

- A) indicar internação hospitalar para melhor controle da ingestão alimentar, e, consequentemente, perda rápida de peso, atendendo, assim, à solicitação do obstetra.
- B) indicar a implantação de um balão intragástrico sob acompanhamento de uma equipe de saúde, composta, minimamente, por nutricionista, psicólogo e endocrinologista.
- C) convencê-la a desistir da gravidez, tendo em vista sua idade avançada, o elevado risco de complicações na gestante obesa e o fato dela vir tentando emagrecer há dois anos sem sucesso.
- D) tentar uma nova dieta, mais restritiva, levando em consideração que a dieta da nutricionista anterior pode não ter restringido quantidade suficiente de calorias para promover perda de peso em uma mulher com esse grau de obesidade.
- E) encaminhar a paciente para avaliação com equipe especializada em cirurgia bariátrica, já que aparentemente ela não apresenta contraindicação, e um maior controle do peso corporal induzido pela cirurgia pode promover melhora das comorbidades relacionadas à obesidade, dentre elas a síndrome dos ovários policísticos, a infertilidade e as complicações gestacionais.

Questão 44 (Peso 1,00)

Sobre as recomendações nutricionais atuais para tratamento de dislipidemias e prevenção de doenças cardiovasculares, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Manter o colesterol total abaixo de 140mg/dia.
- () Consumir três ou mais porções de alimentos integrais/dia.
- () Consumir duas ou mais porções de peixes e frutos do mar por semana.
- () Gorduras saturadas devem ser menor do que 14% e devem ser totalmente substituídas por mono e poli-insaturadas.
- () Triglicérides > 150 mg/dL deve ser tratado com perda de peso, exercício físico, restrição de álcool, açúcar e amido refinado, além de gradual substituição de açúcar e amido refinado por uma combinação de gorduras insaturadas, proteínas e alimentos ricos em fibras.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V F V
- B) F F V V V
- C) F V F V F
- D) V V F F V
- E) V F V F F

Questão 45 (Peso 1,00)

Apesar do risco das reações alérgicas serem graves e mesmo fatais, até o momento, o método mais efetivo para a prevenção dos sintomas e tratamento tanto das alergias como das intolerâncias alimentares é a retirada do alimento “agressor” da dieta (BRASIL, 2015, p. 129). Em relação à abordagem nutricional para lactentes com diagnóstico de alergia alimentar é recomendado

- A) eliminar parcialmente o alimento alergênico como opção de tratamento.
- B) reintroduzir, gradualmente, os alimentos excluídos da dieta, de acordo com a resposta clínica.
- C) utilizar as dietas de exclusão por menos de três meses, devido ao risco de inadequação da ingestão alimentar.
- D) interromper a amamentação e oferecer, prioritariamente, fórmulas à base de soja, para reduzir a sintomatologia da alergia.
- E) oferecer bebidas vegetais como alternativa alimentar à alergia ao leite de vaca, pois as mesmas são ricas em proteína e cálcio.

Questão 46 (Peso 1,00)

Em pacientes com síndrome de má absorção pode ocorrer deficiência da síntese ou da ação das enzimas pancreáticas, o que acarreta má absorção de gordura de forma mais acentuada do que a má absorção de proteínas e carboidratos. Por causa da má absorção de gorduras, as vitaminas _____ também têm sua absorção prejudicada, podendo levar a complicações, como osteopatia, coagulopatias e danos neurológicos, causadas pelo baixo nível das vitaminas _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) lipossolúveis / D, A e K
- B) lipossolúveis / E, K e A
- C) lipossolúveis / D, K e E
- D) hidrossolúveis / B₁, C e B₁₂
- E) hidrossolúveis / B₁₂, B₁ e B₆

Questão 47 (Peso 1,00)

“Por ser da mesma espécie, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento ótimos da criança pequena, além de ser mais bem digerido, quando comparado com leites de outras espécies. O leite materno é capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais da criança nos primeiros seis meses e continua sendo uma importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida, especialmente de proteínas, gorduras e vitaminas” (BRASIL, 2015, p. 16).

Considerando a importância de uma adequada técnica de amamentação para que não ocorra o desmame precoce, a alternativa que apresenta características de uma pega/sucção adequada do bebê durante a amamentação é

- A) mais aréola visível acima da boca do bebê e queixo tocando a mama.
- B) bochechas do bebê encovadas a cada sucção e boca bem aberta.
- C) bebê com cabeça e tronco alinhados e bochechas do bebê encovadas a cada sucção.
- D) lábios do bebê curvados para dentro formando um lacre e menos aréola visível acima da boca do bebê.
- E) rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo, e mais aréola visível abaixo da boca do bebê.

Questão 48 (Peso 1,00)

Em relação às orientações nutricionais para crianças maiores de 2 anos e adolescentes que tenham fatores de risco positivos para doença cardiovascular (DCV) e perfil lipídico alterado, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O consumo de carboidratos totais deve ser restringido para até 35% do valor energético total.
- () A ingestão de leite de vaca e derivados deve ser restrita aos produtos com pouca ou nenhuma gordura, como leite desnatado e queijos brancos.
- () A restrição de gorduras na alimentação deverá ser qualitativa, sendo que a quantidade da ingestão de gorduras totais deve seguir o que foi preconizado para a idade.
- () Limitar o consumo de gorduras saturadas e hidrogenadas, presentes em carnes ricas em gorduras aparentes e peles, e em óleos vegetais (soja, canola), respectivamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V V
- C) F F V F
- D) F F F V
- E) F V V F

Questão 49 (Peso 1,00)

A oferta de nutrientes intraluminais na fase adaptativa da síndrome do intestino curto (SIC) melhora a capacidade absorptiva intestinal, tendo, inclusive, aumento na hipercelularidade, ganho na altura das vilosidades intestinais, na profundidade das criptas e no conteúdo de DNA intracelular.

A partir dessas informações e considerando a terapia nutricional de pacientes com SIC, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Pacientes com SIC beneficiam-se com dietas ricas em carboidratos e pobres em gordura.
- () O uso de glutamina se mostra eficaz para melhorar a adaptação intestinal e diminuir o uso de nutrição parenteral total.
- () A oferta de fibras solúveis deve ser restrita, pois aumenta o número de evacuações líquidas, piorando a adaptação intestinal.
- () Dependendo da tolerância do paciente, a alimentação via oral pode ser estimulada, e a quantidade de alimentos pode ser oferecida gradativamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F V
- C) V F F V
- D) F F F V
- E) F V V F

Questão 50 (Peso 1,00)

Sobre a terapia nutricional neonatal, analise as assertivas a seguir.

Em neonatos prematuros com idade gestacional a partir de 30 semanas, observa-se, com frequência, a incoordenação respiração-deglutição e imaturidade do reflexo de engasgo, e, desta forma, a via de nutrição recomendada é a enteral

PORQUE

em torno de 28-30 semanas de gestação o trato gastrointestinal ainda é imaturo, no entanto já é capaz de realizar a absorção dos nutrientes necessários para o crescimento extrauterino.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.