

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)

Questão 01 (Peso 0,50)

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013).

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que

- A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao mesmo tempo.
- B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter universal nem está fundamentada em conclusões sólidas.
- C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível.
- D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo.
- E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais.

Questão 02 (Peso 0,50)

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _____ se refere à identificação de potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é

- A) da equidade
- B) da autonomia
- C) da integralidade
- D) do empoderamento
- E) da participação social

Questão 03 (Peso 0,50)

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada

- A) virulência.
- B) patogenicidade.
- C) teratogenicidade.
- D) transmissibilidade.
- E) persistência do agente biológico no ambiente.

Questão 04 (Peso 0,50)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que

- A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 05 (Peso 0,50)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual.

Questão 06 (Peso 0,75)

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente em todos os espaços de produção de saúde.

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que

- A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores.
- B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda que menos resolutivo.
- C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do SUS, exceto no âmbito da gestão.
- D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores.
- E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado.

Questão 07 (Peso 0,75)

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8).

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que

- A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou científico.
- B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas.
- C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.
- D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a especificidade dos conhecimentos desta área.
- E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, embora não seja considerada uma prática social.

Questão 08 (Peso 0,75)

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das “[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011).

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela qual ela pode gerenciar sua própria vontade.
- () Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo assim, anula-se a ideia de equidade em saúde.
- () O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria.
- () Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 09 (Peso 0,75)

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, portanto, melhor planejar as ações em saúde.

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que

- A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são avaliados pelos indicadores de processo.
- B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos e da estrutura organizacional do serviço de saúde.
- C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais.
- D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado.
- E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade.

Questão 10 (Peso 0,75)

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes modelos de Vigilância em Saúde.

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que

- A) o modelo sanitaria demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção com qualidade, efetividade e equidade à população.
- B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde.
- C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde.
- D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos.
- E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias.
- () A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde.
- () A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle.
- () A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 12 (Peso 0,75)

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010).

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas.
- () As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação.
- () A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança.
- () Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

Questão 13 (Peso 0,75)

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde” (ONA, 2014).

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que

- A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma escolha da organização de saúde.
- B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à qualidade dos serviços ofertados à população.
- C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do qual é emitido um certificado para a instituição avaliada.
- D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas.
- E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso.

Questão 14 (Peso 0,75)

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde (RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4).

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- () Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares.
- () A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados.
- () A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V F
- D) F F V V
- E) F V F V

Questão 15 (Peso 0,75)

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” (BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015).

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares.
- () A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação.
- () Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde.
- () Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)

Questão 16 (Peso 0,50)

Sobre as alterações nos sinais vitais de pessoa inconsciente, sem pulso, sem respiração, e mantida com hipoxemia cerebral persistente, é correto afirmar que

- A) a fibrilação atrial é irreversível.
- B) a apneia é o primeiro sinal a ser avaliado.
- C) a fibrilação arterial sugere sinal vital secundário.
- D) a taquicardia ventricular é uma das prováveis alterações.
- E) a avaliação ungueal é fundamental para checar o nível de consciência.

Questão 17 (Peso 0,50)

Considerando os direitos do profissional de enfermagem, de acordo com o código de ética dos profissionais de enfermagem, resolução COFEN nº 564/2017, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional.
- Anunciar a prestação de serviços para os quais detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais.
- Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- Comunicar formalmente ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F V
- C) V V F F
- D) F V F V
- E) F F V V

Questão 18 (Peso 0,50)

“A avaliação de desempenho é uma responsabilidade gerencial que procura monitorar o trabalho da equipe e de cada membro e os resultados alcançados para compará-los com os resultados esperados” (CHIAVENATO, 2011, p. 146).

Sobre as principais aplicações dos resultados da avaliação de desempenho, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- Proporcionar retroação a cada pessoa; com destaque, sobretudo, ao subdesempenho.
- Planejar diversas metas individuais que vão de encontro às metas organizacionais ou departamentais.
- Atuar como processo dinâmico, bidirecional, interativo e criativo na construção de melhores condições de desempenho com foco na qualidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V
- B) V V F
- C) F V F
- D) F F F
- E) F F V

Questão 19 (Peso 0,50)

“A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia científica utilizada pelo enfermeiro para sustentar a gestão do cuidado de enfermagem. A SAE é composta por várias fases para fortalecer o julgamento e tomada de decisão clínica assistencial do enfermeiro quanto à priorização, delegação, gestão do tempo [...]” (ALBERT EINSTEIN, 2018).

Considerando essas fases, _____ é momento em que o enfermeiro interpreta e agrupa os dados coletados; já _____ acontece após o planejamento de enfermagem.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) a avaliação / o diagnóstico
- B) o diagnóstico / a implementação
- C) o histórico / o processo de enfermagem
- D) o processo de enfermagem / a consulta de enfermagem
- E) o diagnóstico de enfermagem / a consulta de enfermagem

Questão 20 (Peso 0,50)

“A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde. Neste sentido, promover a comunicação entre estes três grupos pode provocar uma série de debates em direção a mudanças que proporcionem melhor forma de cuidar e novas formas de organizar o trabalho”. (BRASIL, 2018).

Sobre as inovações que devem ser instituídas a fim de ser proporcionar de fato o cuidado humanizado em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O saber dos usuários deve ser valorizado, quando se tratar de crenças populares.
- () O que agrega valor ao cuidado é promover uma escuta qualificada como elemento das tecnologias semi-duras.
- () Mudanças nos modelos de atenção e de gestão, os quais são dissociáveis, têm como foco as necessidades dos cidadãos.
- () O método de tríplice inclusão é uma ferramenta inovadora no processo de humanização do cuidado em saúde, o qual é executado com as seguintes técnicas: rodas, fenômenos modificadores e fomento das redes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) V F V V
- D) F V V F
- E) F F F F

Questão 21 (Peso 0,75)

As estratégias que promovem prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) devem ser direcionadas à população e aos grupos de riscos. Neste sentido, o Ministério da Saúde definiu como elas serão conduzidas por meio de intervenções educativas proporcionadas pela consulta de enfermagem, cujo objetivo principal é reorientar pessoas no grupo de risco com valores limítrofes de pressão arterial, ou seja, predispostos à hipertensão. Para além disso, as ações educativas de enfermagem, logicamente, ganham outros escopos no aspecto preventivo da hipertensão.

Sobre as estratégias e as orientações recomendadas para a prevenção primária da HAS, é correto afirmar que

- A) o estímulo à atividade aeróbica por 30 minutos, na maioria dos dias, não é uma orientação de enfermagem.
- B) as consultas de enfermagem voltadas para mudanças no estilo de vida não podem ser coletivas, por interferirem na privacidade do indivíduo.
- C) as estratégias de prevenção primária da hipertensão arterial, definidas pelo Ministério da Saúde, são estímulo a atividade física, redução do peso, alimentação saudável e moderação no consumo de álcool.
- D) umas das estratégias em que os enfermeiros não podem atuar diz respeito ao controle do índice de massa corporal, visto que é uma ação restrita aos nutricionistas atuante nos Núcleos de Apoio ao Saúde da Família.
- E) uma recomendação pertinente à mudança no estilo de vida é o aconselhamento do uso de bebida alcoólica no volume máximo de 30 ml de etanol por dia para homens e mulheres, priorizando evitar o consumo.

Questão 22 (Peso 0,75)

Antibiótico muito utilizado em unidades hospitalares, a Polimixina B é comercializada na forma liofilizada, com ampola de 500.000 UI, e é administrada após ser diluída em solução.

Se o médico prescrever 2.500 UI a cada seis horas, o volume infundido ao dia, se diluirmos a ampola em 10 ml de soro, é

- A) 0,2 ml
- B) 0,25 ml
- C) 0,05 ml
- D) 0,005 ml
- E) 0,002 ml

Questão 23 (Peso 0,75)

Atualmente, observa-se um aumento no uso do dispositivo conector de sistema fechado em pessoas com acessos venosos centrais e periféricos, o que tem sido justificado pelo fato de ter havido estudos corroborando a redução de infecção primária de corrente sanguínea. Nesta perspectiva, para administrar o medicamento Propofol, o enfermeiro tem de ter o cuidado de _____ o dispositivo na via de infusão, administrar de forma _____, e, por fim, _____.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) manter / rápida / aspirar o resíduo
- B) retirar / rápida / reinstalar o dispositivo
- C) retirar / lenta / aspirar conteúdo do lúmen
- D) manter / lenta / injetar água destilada na via
- E) retirar / rápida / injetar água destilada na via

Questão 24 (Peso 0,75)

A antissepsia cirúrgica das mãos é uma medida importante e de grande impacto na prevenção de infecção. O que chama a atenção é o fato comprovado de que os profissionais de saúde, sobretudo os de nível superior, não higienizam as mãos corretamente, sequer lavam as mãos como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Na ausência dessas medidas importantes, o que se verifica é um alto percentual de infecções, inclusive, relacionadas ao parto.

O ato de realizar antissepsia cirúrgica das mãos, antes de iniciar o parto cesáreo, contribui para

- A) esterilizar a microbiota residente na pele das mãos dos profissionais.
- B) proporcionar efeito residual na pele do profissional que realiza o parto.
- C) reduzir a microbiota transitória da pele dos médicos que realizam o parto.
- D) prevenir a embrocção ginecológica provocada pelas bactérias multirresistentes.
- E) reduzir o percentual de infecções de sítio cirúrgico provocadas pelas bactérias presentes na pele das parturientes.

Questão 25 (Peso 0,75)

A tuberculose, no Brasil, ainda é uma das mais preocupantes doenças infectocontagiosas que assola a população, sobretudo, o segmento com menor poder econômico, uma vez que outros determinantes associados potencializam os efeitos sociais da doença. Diante desta e de outras perspectivas, o Ministério da Saúde vem adotando inúmeras estratégias para prevenção dessa doença, sendo o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose a que contempla ações distribuídas por cada ente da federação.

De acordo com o Plano Nacional pelo fim da Tuberculose e considerando as competências da esfera Municipal, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Descentralizar as ações de controle dessa doença na Atenção Básica.
- () Assegurar a realização dos exames diagnósticos, conforme preconizado nas normas.
- () Identificar e organizar a rede de laboratórios locais e suas referências municipais, regionais e estaduais.
- () Promover e participar da capacitação de recursos humanos, fomentando a integração de instituições de ensino e serviço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V V F F
- C) F F V V
- D) F V F V
- E) F V V F

Questão 26 (Peso 0,75)

A Sra. K.O.C., relata história paterna de cardiopatia e hipertensão arterial sistêmica, sendo confirmados os diagnósticos médicos: edema em membros inferiores, trombose venosa profunda, distúrbio metabólico etc., e queixa-se de dor na panturrilha durante exame físico quando submetida ao movimento dorsiflexão passiva do pé.

Considerando os dados do caso da Sra. K.O.C., a queixa tem relação com

- A) Sinal de Burnnot.
- B) Sinal de Homans.
- C) Sinal de Pinnard.
- D) Crises de hidrocefale.
- E) Crises de rins hiponefróticos.

Questão 27 (Peso 0,75)

A mãe de J.R.C. procura a Unidade de Saúde da Família para vacinar sua filha de dois anos de idade. Ao analisar o cartão de vacina, a enfermeira verificou que a criança foi vacinada ao nascer com a BCG e a contra Hepatite B. No entanto, o que chamou a atenção foi que a criança recebeu a vacina Pentavalente dois meses depois e a DTP quatro meses após nascimento.

Sobre esse caso clínico e considerando o calendário vacinal para crianças nessa faixa etária, é correto afirmar que

- A) a segunda dose da BCG está pendente.
- B) a criança ficou descoberta para prevenção de tétano.
- C) o esquema vacinal para a vacina Pentavalente está correto.
- D) a conduta correta do profissional será vacinar a criança com reforço para a difteria e tétano.
- E) a vacina DTP só poderia ter sido administrada como reforço do esquema básico da vacina Pentavalente.

Questão 28 (Peso 0,75)

Sobre o calendário atual para vacinação de idosos, analise as assertivas abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A vacina febre amarela não é indicada por razão da senilidade.
- () Administrada a cada cinco anos, a vacina antitetânica é indicada para os idosos acamados.
- () A vacina contra hepatite B pode ser indicada, sobretudo, quando há idosos não imunizados, fato comprovado com exame anti-Hbs.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F F V
- D) F V F
- E) F F F

Questão 29 (Peso 0,75)

O escore OMP é um instrumento para avaliação de alterações em olhos, mãos e pés, sendo muito recomendado na prevenção e no controle de novos agravos decorrentes da hanseníase.

Sobre o escore OMP, é correto afirmar que

- A) é parâmetro para classificar o tipo de hanseníase.
- B) é restrito àquelas pessoas com risco de lesão neuropática.
- C) avalia o grau de incapacidade no paciente com hanseníase, o qual varia entre 0 e 12.
- D) seu uso é direcionador do cuidado, sendo fundamental para definir o tipo de terapia medicamentosa.
- E) seu uso é exclusivo no diagnóstico, sendo de fundamental importância para avaliar grau de incapacidade neuropática.

Questão 30 (Peso 0,75)

Atualmente, sendo mais uma intervenção no Programa Nacional de Prevenção do HIV, o Ministério da Saúde instituiu a estratégia Profilaxia Pré-exposição ao HIV (PrEP), a qual consiste no uso de antirretrovirais para reduzir o risco de adquirir a infecção por esse vírus (BRASIL, 2018).

Considerando a complexidade dessa nova estratégia e sobre outra voltada para Profilaxia pós-exposição (PEP), é correto afirmar que

- A) a PEP é mais eficiente para aqueles portadores de HIV do sorotipo I e II.
- B) o uso da PrEP em pessoas infectadas evita seleção de novas cepas do vírus.
- C) indivíduos com indicação momentânea de PEP podem ser futuros candidatos à PrEP.
- D) a transição para PrEP pode ser feita antes de 28 dias de uso da PEP e exclusão de infecção por HIV.
- E) o tratamento já é iniciado na primeira consulta, independentemente do resultado do teste rápido para HIV.

Questão 31 (Peso 1,00)

De uma forma geral, existem diferentes opções de vias pelas quais uma forma farmacêutica pode ser administrada a um indivíduo, e, desta forma, é fundamental o conhecimento das características, vantagens e desvantagens de cada uma dessas vias.

Sobre as características das diferentes vias de administração de formas farmacêuticas, é correto afirmar que

- A) a via sublingual tem importância especial para certos fármacos, pois pode protegê-los do rápido metabolismo causado pela primeira passagem pelos intestinos e pelo fígado.
- B) a via retal, apesar de apresentar a mesma taxa de metabolismo hepático de primeira passagem observada pela via oral, é mais vantajosa que a via oral por apresentar absorção mais regular e completa.
- C) a via oral de administração de fármacos em formas farmacêuticas sólidas não pode ser utilizada quando o fármaco irrita a mucosa estomacal ou é destruído pelas secreções gástricas e pelo pH ácido do estômago.
- D) a via transdérmica é adequada, principalmente, para fármacos altamente hidrofílicos e incorporados em veículos aquosos, em peles que possuem epiderme intacta, sem abrasão, queimaduras ou inflamação.
- E) a via intravenosa é adequada para a administração de um grande número de formas farmacêuticas líquidas como soluções aquosas e oleosas, suspensões e emulsões do tipo óleo-em-água (O/A) ou água-em-óleo (A/O).

Questão 32 (Peso 1,00)

A atuação do(a) enfermeiro(a) no rastreamento para Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é parte do processo de cuidado de pessoas com essa doença, o qual envolve consulta de enfermagem que oriente estilo de vida saudável, encaminhamento para consulta médica, identificação de risco cardiovascular, etc.

Tendo como base o rastreamento de pessoas com idade acima de 18 anos, com sintomatologia típica de DM tipo 2 e glicemia casual acima de 200 mg/dL, a conduta correta do enfermeiro é

- A) solicitar novo exame em jejum.
- B) direcionar para rastreamento para DM tipo 1.
- C) orientar para que seja feito teste TTG – 75 gramas.
- D) concluir diagnóstico com encaminhamento para consulta médica.
- E) iniciar hipoglicemiantes orais, conforme protocolo aprovado na unidade.

Questão 33 (Peso 1,00)

Muitos idosos, por conta do quadro clínico e sob indicação médica, são alimentados por sonda nasogástrica ou nasoenteral, por isso inúmeros cuidados precisam ser feitos pelos enfermeiros: técnica correta na passagem da sonda, não deixar que seja obstruída, triturar medicamentos que não precipitam com a dieta, etc. O _____, por exemplo, é um medicamento que não pode ser triturado e, além disso, precipita com a dieta enteral.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Lítio
- B) AAS
- C) Bisacodil
- D) Lactulona
- E) Haloperidol

Questão 34 (Peso 1,00)

As estratégias para prevenção de úlceras por pressão precisam ser ampliadas para o campo transdisciplinar, o que envolve vários profissionais de saúde que cuidam dos pacientes no ambiente hospitalar, na assistência domiciliar, etc.

Sobre a prevenção de lesão em idosa de 70 anos, acamada, hipertensa, com hiperemia em trocânter direito e tecido de granulação em toda a ferida da região sacra, é correto afirmar que

- A) a opção por hidrogel está indicada para a lesão de estágio III.
- B) a papaína é mais adequada para a lesão que está com esfacelo.
- C) o decúbito que alivia o pé direito deve ser priorizado para amenizar a hiperemia.
- D) se deve dar maior atenção para a mudança de decúbito supino e lateral direito, evitando permanecer nessas posições acima de uma hora.
- E) a mudança de decúbito é indicada para a idosa, no entanto, a permanência nas posições decúbito dorsal e lateral esquerdo deve ser de duas horas.

Questão 35 (Peso 1,00)

A instalação e manutenção de via aérea artificial é facilitada pelo uso de equipamentos que conduzem o ar até os pulmões ou por meio de tubo orotraqueal e nasotraqueal, ou pela traqueostomia.

Sobre os cuidados de enfermagem com esses tubos, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A sonda nasoenteral deve ser posicionada na ostomia traqueal para evitar necrose na traqueia.
- () A fixação do tubo orotraqueal é feita com auxílio de barbante, podendo ser improvisada com micropore ou esparadrapo.
- () O tubo nasotraqueal deve ser trocado de narina sempre que for realizar o curativo e se o tubo estiver seletivo para apenas um pulmão.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F
- B) F F F
- C) F F V
- D) V V F
- E) V F F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)

Questão 36 (Peso 1,00)

A Portaria GM/MS nº 2.616, de 12 de maio de 1998, instituiu diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares, e estabelece as ações mínimas necessárias a serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.

Sobre as diretrizes e normas para prevenção e controle das infecções hospitalares instituídas pela Portaria nº 2.616/1998, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares.
- () O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam mucosas, sangue outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções.
- () São recomendadas, para a finalidade de antissepsia, as formulações contendo mercúrios orgânicos, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e clorofórmio.
- () É competência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V F V F
- C) F F V V
- D) F V V F
- E) F V F F

Questão 37 (Peso 1,00)

Participar de comissão _____ constitui uma atividade desenvolvida pelo Enfermeiro no Centro de Material e Esterilização (CME), visando a segurança do paciente.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Participar de Comissão de Gestão de Leitos
- B) Participar de Comissão de Terapia Intensiva
- C) Participar de Comissão de Arquivo Hospitalar
- D) Participar de Comissão com Banco de Sangue e Hemoderivados
- E) Participar de Comissão com Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)

Questão 38 (Peso 1,00)

A unidade de Centro Cirúrgico é o conjunto de elementos destinados às atividades cirúrgicas, bem como a recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediatas.

Sobre o Centro Cirúrgico, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O Centro Cirúrgico é definido como uma área complexa de acesso livre, que pertence a um Estabelecimento de Saúde (EAS).
- () A arquitetura do Centro Cirúrgico e a sua área física têm particularidades que devem atender a Legislação Sanitária vigente.
- () O Centro Cirúrgico é composto de uma série de dependências interligadas, a fim de proporcionar ótimas condições à realização do ato anestésico-cirúrgico
- () As unidades de suporte ao Centro Cirúrgico devem ser de fácil acesso, sendo elas: almoxarifado, farmácia, lavanderia, banco de Sangue, laboratório, UTI, Unidade de apoio, Raio-X e CME.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V V V
- B) F V V F
- C) V V F F
- D) V F V F
- E) V F F F

Questão 39 (Peso 1,00)

O cálculo utilizado para dimensionamento de pessoal no Centro Cirúrgico é determinado, segundo as Práticas Recomendadas pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC).

Sobre o(s) aspecto(s) que deve(m) ser considerado(s) para este cálculo, é correto afirmar que é(são)

- A) apenas o porte de cirurgia.
- B) apenas o tempo de cirurgia.
- C) o número de salas de cirurgias.
- D) o horário de funcionamento do centro cirúrgico.
- E) o número de salas de cirurgia e de leitos de Recuperação Pós-Anestésica (RPA).

Questão 40 (Peso 1,00)

Para a segurança do paciente no contexto hospitalar é necessário assegurar o processamento adequado dos produtos para saúde, ou seja, o “[...] conjunto de ações relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras” (BRASIL, 2012, p.2).

Sobre as ações realizadas para o processamento dos produtos para saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos;
- () Desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies
- () Esterilização consiste remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F V F
- E) F F V

Questão 41 (Peso 1,00)

Aplica-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no Centro de Material e Esterilização (CME) com o objetivo de implementar as Boas Práticas Recomendadas no Processamento de Produtos para Saúde.

A alternativa que contém o Diagnóstico de Enfermagem que corresponde ao processo da SAE no CME é

- A) risco para morte
- B) risco para infecção
- C) risco para sequelas
- D) risco para contaminação do ambiente
- E) proteção contra contaminação cruzada

Questão 42 (Peso 1,00)

Tendo em vista a organização e a otimização do processo de trabalho no Centro de Material e Esterilização (CME) a fim de manter um fluxo unidirecional com barreira física entre as áreas, é correto afirmar que os Centros de Material Esterilização Classes I e II devem possuir minimamente _____ setores distintos.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) oito
- B) sete
- C) seis
- D) cinco
- E) quatro

Questão 43 (Peso 1,00)

Segundo os manuais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), "ainda não foi demonstrada uma clara associação entre banho pré-operatório com produto antisséptico e redução do risco [...] (BRASIL, 2017, p. 87) de infecção de sítio cirúrgico (ISC).

Considerando que ainda não há consenso na indicação de banho com agente antisséptico para todos os procedimentos cirúrgicos, a orientação de enfermagem para o banho para uma pessoa que fará cirurgia eletiva e de médio porte é

- A) utilizar clorexidina 2% na região íntima e axilar.
- B) utilizar sabonete neutro individual em banho de corpo total antes de ir ao centro cirúrgico.
- C) utilizar sabonete líquido individual com iodo 10% no corpo e clorexidina 2% em região íntima.
- D) preferir sabonete em barra composto de solução iodada e com percentual menor de concentração de álcool.
- E) lançar mão de sabonetes em barra, preferindo aqueles líquidos individuais autorizados pela instituição.

Questão 44 (Peso 1,00)

Se considerarmos um diagnóstico médico de infarto agudo do miocárdio em um senhor de 60 anos, J.B.V., que deu entrada com queixa principal dor torácica constritiva intensa por mais de duas horas de duração e não alivia com repouso, um dos diagnósticos de enfermagem seria Dor relacionada com um desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio.

Diante desse caso clínico e considerando o diagnóstico de enfermagem explicitado, relacione a segunda coluna com a primeira.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Posicionar em semi-fowler. | () Pode indicar bloqueio cardíaco. |
| (2) Administrar morfina prescrita. | () Pode diminuir as extrassístoles. |
| (3) Administrar oxigênio prescrito. | () Ajuda a diminuir sensação de dor. |
| (4) Monitorar a frequência cardíaca. | () Permite excursão adequada do tórax. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 3 2 4
- B) 2 1 4 3
- C) 4 1 2 1
- D) 4 2 1 4
- E) 4 3 2 1

Questão 45 (Peso 1,00)

As cardiopatias são as malformações congênitas mais frequentes e são responsáveis por até 50% das internações em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Os avanços no pré-natal, os diagnósticos precoces, o tratamento clínico pré e pós-operatório e a melhoria das técnicas cirúrgicas e anestésicas permitem uma melhoria significativa no prognóstico dessas cardiopatias (HIRSCHHEIMER et al, 2013; FORONDA, 2013, p. 352-354).

Considerando as principais situações relacionadas à ventilação pulmonar mecânica (VPM) que devem ser registradas no processo assistencial do intraoperatório, por estarem correlacionadas com as complicações na evolução do pós-operatório, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Peso da criança.
- () Tempo de anestesia.
- () Tempo de circulação intracorpórea.
- () Dificuldades encontradas e estratégias utilizadas na ventilação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V F
- E) F F V F

Questão 46 (Peso 1,00)

Os cuidados de enfermagem para o neonato são divididos em três fases de transição: a primeira fase, o cuidado imediato depois do nascimento até 1 h de vida, a segunda fase de 1 a 4 horas de vida, e a terceira fase de 4h até alta hospitalar (LEIFER, 2013, p.135).

Um dos objetivos na primeira fase pós-nascimento do recém-nascido é

- A) o envolvimento de toda família.
- B) a realização do primeiro banho do recém-nascido.
- C) a manutenção da termorregulação do recém-nascido.
- D) o registro somente das intercorrências durante o nascimento do recém-nascido.
- E) a realização do segundo exame detalhado do recém-nascido pelo neonatologista.

Questão 47 (Peso 1,00)

A Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). De acordo com a PNSP, a segurança do paciente consiste na redução, a um mínimo aceitável, do risco de _____ associado(a) ao cuidado de saúde.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) falha
- B) acidente
- C) reação adversa
- D) evento adverso
- E) dano desnecessário

Questão 48 (Peso 1,00)

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi instituído através da Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. De acordo com a Portaria nº 529/2013, a _____ consiste na “[...] aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional” (BRASIL, 2013, p. 2).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) gestão de riscos
- B) cultura de segurança
- C) cultura de redução de danos
- D) gestão da segurança hospitalar
- E) gestão da segurança do paciente

Questão 49 (Peso 1,00)

O centro de material e esterilização (CME) é a “[...] unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde” (BRASIL, 2012, p.1), e a resolução ANVISA RDC nº 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde. De acordo com a RDC nº 15/2012, os produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas são denominados produtos para saúde _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) críticos
- B) não-críticos
- C) semicríticos
- D) passíveis de processamento
- E) de conformação não complexa

Questão 50 (Peso 1,00)

Para garantir a Segurança dos pacientes no contexto hospitalar, é necessário prevenir a contaminação cruzada entre o ambiente sujo e limpo. Na ausência de barreiras físicas entre o ambiente sujo e limpo, os profissionais de saúde adotam um conjunto de medidas comportamentais denominado

- A) Pré-limpeza
- B) Barreira técnica
- C) Rastreabilidade
- D) Qualificação da instalação
- E) Controle de qualidade de processamento