

**CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)**

**Questão 01 (Peso 0,50)**

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013).

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que

- A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao mesmo tempo.
- B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter universal nem está fundamentada em conclusões sólidas.
- C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível.
- D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo.
- E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais.

**Questão 02 (Peso 0,50)**

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove princípios. De acordo com a PNPS, o princípio \_\_\_\_\_ se refere à identificação de potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é

- A) da equidade
- B) da autonomia
- C) da integralidade
- D) do empoderamento
- E) da participação social

**Questão 03 (Peso 0,50)**

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada

- A) virulência.
- B) patogenicidade.
- C) teratogenicidade.
- D) transmissibilidade.
- E) persistência do agente biológico no ambiente.

**Questão 04 (Peso 0,50)**

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que

- A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

**Questão 05 (Peso 0,50)**

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que

- A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde.
- D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.
- E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual.

**Questão 06 (Peso 0,75)**

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente em todos os espaços de produção de saúde.

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que

- A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores.
- B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda que menos resolutivo.
- C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do SUS, exceto no âmbito da gestão.
- D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores.
- E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado.

**Questão 07 (Peso 0,75)**

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8).

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que

- A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou científico.
- B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, habilidades e destrezas.
- C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a realidade e transformá-la.
- D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a especificidade dos conhecimentos desta área.
- E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de saúde, embora não seja considerada uma prática social.

**Questão 08 (Peso 0,75)**

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das “[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011).

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela qual ela pode gerenciar sua própria vontade.
- ( ) Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo assim, anula-se a ideia de equidade em saúde.
- ( ) O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria.
- ( ) Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 09 (Peso 0,75)**

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, portanto, melhor planejar as ações em saúde.

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que

- A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são avaliados pelos indicadores de processo.
- B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos e da estrutura organizacional do serviço de saúde.
- C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais.
- D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado.
- E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade.

**Questão 10 (Peso 0,75)**

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes modelos de Vigilância em Saúde.

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que

- A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção com qualidade, efetividade e equidade à população.
- B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde.
- C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde.
- D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos.
- E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde.

**Questão 11 (Peso 0,75)**

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias.
- ( ) A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde.
- ( ) A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle.
- ( ) A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) F V F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 12 (Peso 0,75)**

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010).

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas.
- ( ) As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação.
- ( ) A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança.
- ( ) Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V
- B) V V F F
- C) V F V F
- D) F F V V
- E) F V V F

**Questão 13 (Peso 0,75)**

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de saúde” (ONA, 2014).

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que

- A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma escolha da organização de saúde.
- B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à qualidade dos serviços ofertados à população.
- C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do qual é emitido um certificado para a instituição avaliada.
- D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas.
- E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso.

**Questão 14 (Peso 0,75)**

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde (RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4).

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- ( ) Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados segundo as densidades tecnológicas singulares.
- ( ) A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados.
- ( ) A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F F V
- C) F V V F
- D) F F V V
- E) F V F V

**Questão 15 (Peso 0,75)**

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” (BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015).

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares.
- ( ) A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação.
- ( ) Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde.
- ( ) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V F
- B) V V F F
- C) V F F V
- D) F F V V
- E) F V V F

**CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)**

**Questão 16 (Peso 0,50)**

O reflexo acústico funciona como um mecanismo de proteção da orelha interna mediante uma estimulação intensa e apresenta uma via aferente única e uma via eferente bilateral, representadas respectivamente, pelos \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) nervo facial e nervo trigêmeo
- B) nervo trigêmeo e nervo facial
- C) nervo vestibulo-coclear e nervo facial
- D) nervo vestibulo-coclear e núcleo coclear ventral
- E) nervo vestibulo-coclear e complexo olivar superior

**Questão 17 (Peso 0,50)**

Os potenciais auditivos evocados (PEAs) avaliam a atividade neuroelétrica na via auditiva, desde o nervo auditivo até o córtex cerebral, em resposta a um estímulo acústico. Estes potenciais podem ser classificados de acordo com a latência em curtos, médios ou tardios. O PEA de curta latência mais utilizado clinicamente, devido a sua reprodutibilidade e geradores bem definidos, é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) (MATAS; MAGLIARO, 2015).

Considerando as aplicações, a realização do exame e a interpretação dos resultados do PEATE, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A amplitude e a latência das ondas do PEATE diminuem de acordo com a redução na intensidade do estímulo teste.
- ( ) O limiar eletrofisiológico corresponde ao menor valor de intensidade de estímulo em que se observa a presença da onda V.
- ( ) A análise do tempo de latência das ondas do PEATE, realizado na intensidade de 80 dBNA, permite definir o tipo e grau da perda auditiva.
- ( ) Para a análise dos traçados do PEATE de neonatos e lactentes, deve-se considerar o efeito de maturação da via auditiva sobre a latência, a amplitude e a morfologia das ondas.
- ( ) Na avaliação da integridade da via auditiva, utiliza-se, frequentemente, o estímulo clique, geralmente em torno de 80dB, e analisa-se as latências absolutas e os interpicos das ondas I, III e V.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F V
- B) V V F V F
- C) V F V V F
- D) F F V V V
- E) F V F V V

**Questão 18 (Peso 0,50)**

Baixo desempenho na avaliação comportamental do processamento auditivo nos testes de fala com ruído branco e dicótico de dissílabos alternados (SSW) revelam, respectivamente, dificuldade nas habilidades auditivas de \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) fechamento e figura-fundo
- B) localização e figura-fundo
- C) figura-fundo e fechamento
- D) resolução temporal e fechamento
- E) figura-fundo e resolução temporal

**Questão 19 (Peso 0,50)**

Considerando os componentes e as características do aparelho de amplificação sonora individual (AASI), numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                  |  |
|------------------|--|
| (1) Ganho        | ( ) Apresenta relação com o ganho do AASI.   |
| (2) Receptor     | ( ) Transforma o sinal elétrico em onda sonora.  |
| (3) Microfone    | ( ) Transforma a onda sonora em energia elétrica.  |
| (4) Amplificador | ( ) Apresenta relação com o amplificador e com o receptor do AASI.                                       |
| (5) Saída máxima | ( ) Consiste na diferença em decibéis entre o som que entra no microfone e o que é liberado no receptor. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 5 2 3 4 2
- B) 4 2 3 5 1
- C) 3 5 2 4 1
- D) 2 1 4 3 5
- E) 1 4 5 2 3

**Questão 20 (Peso 0,50)**

De acordo com Ferre e Bellis (2004), os transtornos do processamento auditivo central podem ser classificados em três subperfis primários (decodificação auditiva, prosódia e integração) e dois secundários (associação e organização de resposta), considerando a correlação entre os achados na avaliação do processamento auditivo e os processos neurofisiológicos comportamentais, cognitivos e acadêmicos, bem como as manifestações na comunicação.

Sobre os indivíduos com transtorno do processamento auditivo classificado como associação, é correto afirmar que

- A) apresentam inabilidade em aplicar as regras da língua.
- B) mostram dificuldade na nomeação e na imitação de padrões temporais.
- C) revelam maior dificuldade de discriminação de sons em ambientes ruidosos.
- D) o local da disfunção é o córtex auditivo primário do hemisfério dominante para a linguagem.
- E) mostram dificuldade em tarefas que exijam transferência inter-hemisférica por disfunção no corpo caloso.

**Questão 21 (Peso 0,75)**

Desde o final do século XX, a introdução de técnicas de neuroimagem, como a tomografia por emissão de pósitrons e a ressonância magnética funcional, tem levado os estudos a um modelo funcional de organização da linguagem no cérebro.

Sobre esse modelo, é correto afirmar que

- A) a região da ínsula não participa do processamento cerebral da linguagem.
- B) a região frontal inferior esquerda participa do processo de compreensão verbal.
- C) somente a área de Wernicke participa da compreensão da linguagem em contexto.
- D) as áreas 39, 40 e 41 de Brodmann não participam do processamento da linguagem.
- E) o giro fusiforme está envolvido em processos periféricos de processamento da escrita.

**Questão 22 (Peso 0,75)**

Sobre as consequências do traumatismo cranioencefálico (TCE) sobre a linguagem, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A presença de perturbação da comunicação em casos de TCE independe da gravidade da lesão cerebral.
- ( ) A avaliação das funções cognitivas nesses casos pode ser realizada pelo fonoaudiólogo a partir de procedimentos não padronizados.
- ( ) Para fins diagnósticos, é fundamental que o fonoaudiólogo priorize a aplicação completa de testes padronizados elaborados para avaliação de pacientes afásicos.
- ( ) De maneira geral, em sujeitos vítimas de TCE, observam-se, predominantemente, alterações que afetam o nível sintático da linguagem devido à forte presença de anomias.
- ( ) Distúrbios cognitivos da comunicação têm grande impacto no discurso de sujeitos vítimas de TCE, mas podem ser observados em outros quadros que envolvem lesões focais em região parieto-occipital.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F
- B) V V F F F
- C) F V F V F
- D) F V V F F
- E) F F V F V

**Questão 23 (Peso 0,75)**

Erros de produção \_\_\_\_\_ não podem diferenciar \_\_\_\_\_, mas os parâmetros \_\_\_\_\_ podem. Pacientes \_\_\_\_\_ produzem vogais mais longas e apresentam redução da \_\_\_\_\_, o que não muda a significação do que é dito.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) fonêmica / apraxia de fala de afasia / vocais / apráxicos / intensidade vocal
- B) fonética / disartria de afasia / fonológicos / afásicos / intenção comunicativa
- C) fonética / apraxia de fala de disartria / vocais / disártricos / velocidade de fala
- D) fonética / disartria de parafasia fonêmica / fonéticos / disártricos / intenção comunicativa
- E) fonêmica / apraxia de fala de parafasia fonêmica / fonéticos / apráxicos / velocidade de fala

**Questão 24 (Peso 0,75)**

Sabe-se que o crescimento e desenvolvimento maxilofacial acontecem de maneira harmônica até atingir a fase adulta. No que diz respeito aos mecanismos de crescimento ósseo, é correto afirmar que

- A) o deslocamento primário ocorre por compressão de um osso contra o outro.
- B) o deslocamento secundário acontece pela ação indireta do crescimento dos tecidos moles.
- C) o crescimento da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro desloca a maxila para frente e para o lado.
- D) no processo de deslocamento primário, o osso cresce por deposição óssea e se desloca no sentido de aproximar-se do osso vizinho.
- E) o complexo nasomaxilar cresce para trás e para cima, mas é, ao mesmo tempo, deslocado para frente e para baixo.

**Questão 25 (Peso 0,75)**

As disartrias são ocasionadas por distúrbios neurológicos que atingem a capacidade do sistema nervoso central e/ou periférico de controlar a musculatura envolvida na produção da fala. A respeito da disartria espástica, é correto afirmar que

- A) a avaliação oromotora revela movimentos de língua excessivos durante a fala.
- B) a lesão responsável pela dificuldade de fala está localizada exclusivamente em região cortical.
- C) a disfunção respiratória observada pode ser advinda de um colapso na coordenação respiratória-laríngea.
- D) lesões unilaterais do neurônio motor superior, responsáveis por hemiplegia espástica, produzem disartrias persistentes.
- E) fornecer suporte abdominal empurrando os músculos abdominais durante a expiração não auxilia na melhora do suporte respiratório.

**Questão 26 (Peso 0,75)**

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico na encefalopatia crônica da infância, analise as assertivas a seguir.

A expressão Paralisia Cerebral remete a uma ampla heterogeneidade de síndromes clínicas caracterizadas por distúrbios motores e alterações posturais. Muitas vezes, o primeiro problema que dificulta a alimentação é a extensão anormal da cabeça, pescoço e também a retração da língua

**PORQUE**

à medida que a criança tenta levantar e rodar a cabeça, ela utiliza os extensores da cabeça e os músculos intrínsecos da língua para fixar-se. Quando alimentos líquidos e semi-líquidos são ofertados ocorre a redução da extensão da cabeça, o que provoca a realização de movimentos compensatórios na tentativa de controlar a comida na cavidade oral.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 27 (Peso 0,75)**

No que diz respeito à função de mastigação do sistema estomatognático, é correto afirmar que

- A) embora a mastigação seja inicialmente uma função reflexa, ela é aperfeiçoada com a experiência.
- B) a mastigação tem como objetivo exclusivo preparar os alimentos para a deglutição, fragmentando-os.
- C) a mastigação unilateral alternada é considerada o padrão maduro dessa função, auxiliando no desenvolvimento dos arcos dentários.
- D) os contatos dentais no lado de balanceio também podem ocorrer de forma fisiológica desde que não interfiram nos contatos do lado de trabalho.
- E) o aspecto sensorial da erupção da dentição permanente funciona como guia para os músculos mastigatórios no desenvolvimento da função de mastigação.

**Questão 28 (Peso 0,75)**

Sobre o acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal, analise as assertivas a seguir.

Um dos testes complementares para avaliação da ressonância em sujeitos com fissura labiopalatina envolve o uso do espelho de Glatzel, colocado sob as narinas do paciente durante emissão sustentada de fonemas orais isolados, em vocábulos e sentenças, e sopro prolongado. Esse teste, no entanto, não deve ser realizado na presença de fístula

**PORQUE**

não é possível verificar o grau de influência da fístula, se observado escape de ar nasal.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 29 (Peso 0,75)**

Com relação à terapia fonoaudiológica para a dispraxia verbal, é correto afirmar que

- A) as técnicas para o controle do ritmo de fala são contraindicadas.
- B) a terapia é contraindicada após a fase aguda da doença neurológica de base.
- C) a escolha da abordagem terapêutica depende, exclusivamente, da severidade do quadro dispráxico.
- D) as abordagens mistas, que envolvem a articulação de tarefas motoras e linguísticas, são indicadas em casos de dispraxia verbal.
- E) as abordagens articulatórias cinemáticas apontam para o uso de estímulos táteis-cinestésicos, descartando o apoio em estímulos visuais e auditivos.

**Questão 30 (Peso 0,75)**

Sobre a intervenção fonoaudiológica nas disfagias neurogênicas a partir de ajustes posturais, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| (1) Deitar-se de lado | ( ) Promove a ampliação da orofaringe.                     |
| (2) Cabeça inclinada  | ( ) Promove o estreitamento da orofaringe.                 |
| (3) Cabeça para trás  | ( ) Aumenta oclusão das vias respiratórias.                |
| (4) Cabeça para baixo | ( ) Aumenta o fechamento das pregas vocais.                |
| (5) Rotação de cabeça | ( ) Elimina a ação da gravidade sobre resíduos na faringe. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 4 5 2 3
- B) 3 4 5 2 1
- C) 3 5 2 4 1
- D) 4 2 3 5 1
- E) 5 2 3 4 2

**Questão 31 (Peso 1,00)**

Na adolescência, ocorre mudança no comprimento das pregas vocais e, conseqüentemente, na frequência fundamental da voz em uma relação \_\_\_\_\_, ou seja, com uma \_\_\_\_\_ estrutura vibrátil, \_\_\_\_\_ será a frequência vibratória, havendo o agravamento vocal esperado (ALMEIDA; BALATA, 2014).

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) direta / maior / maior
- B) direta / maior / menor
- C) direta / menor / menor
- D) indireta / menor / maior
- E) indireta / maior / menor

**Questão 32 (Peso 1,00)**

Sobre a voz de pacientes com câncer de laringe submetidos a laringectomias horizontais supraglóticas, é correto afirmar que

- A) a soprosidade é observada pela perda da função esfínctérica da laringe.
- B) a rugosidade é a principal característica em virtude do encurtamento do trato vocal.
- C) o padrão ressonantal não está comprometido, apesar da alteração estrutural da laringe.
- D) o padrão de voz molhado pode ser observado em virtude do acúmulo de saliva e/ou alimento na neolaringe.
- E) o padrão ressonantal é alterado, com predomínio de ressonância *cul de sac*, em virtude da posição elevada e posteriorizada da língua.

**Questão 33 (Peso 1,00)**

Considerando as inter-relações anatômicas e fisiológicas das estruturas envolvidas nas funções de fonação e deglutição, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) As paralisias de prega vocal estão entre as causas mais comuns de aspiração de resíduos e/ou líquidos durante a deglutição.
- ( ) O fechamento da laringe durante a fase orofaríngea da deglutição ocorre pela participação da epiglote e das pregas vestibulares e vocais.
- ( ) O mecanismo de elevação da laringe na fase orofaríngea da deglutição está associado à penetração de resíduos em vias aéreas inferiores.
- ( ) Alterações vocais relacionadas a fase oral preparatória e fase oral da deglutição são comuns, e nem sempre estão associadas à presença de desequilíbrios musculares orofaciais.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V V

**Questão 34 (Peso 1,00)**

Sobre a avaliação e tratamento da voz para indivíduos com surdez, analise as assertivas a seguir.

A qualidade vocal de indivíduos com surdez pode se apresentar alterada em relação à ressonância, sendo hipernasal, hiponasal ou *cull de sac*

**PORQUE**

apesar das estruturas anatômicas e os processos fisiológicos envolvidos na fonação estarem preservados, o feedback auditivo reduzido ou ausente interfere no monitoramento da movimentação do esfíncter velofaríngeo e no posicionamento da língua.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 35 (Peso 1,00)**

Na laringectomia \_\_\_\_\_, a principal alteração fonoaudiológica observada é \_\_\_\_\_, enquanto que na laringectomia \_\_\_\_\_ observa-se frequentemente alteração \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) frontal anterior / na deglutição / parcial vertical / no padrão ressonantal
- B) parcial vertical / na deglutição / horizontal supraglótica / no padrão vocal
- C) parcial vertical / no padrão vocal / horizontal supraglótica / na deglutição
- D) horizontal supraglótica / no padrão vocal / parcial vertical / na deglutição
- E) horizontal supraglótica / no padrão ressonantal / parcial vertical / na deglutição

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)**

**Questão 36 (Peso 1,00)**

Em relação à avaliação da alimentação de recém-nascidos hospitalizados, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) O peso do recém-nascido e a idade gestacional são critérios determinantes para a indicação do momento de início da estimulação da sucção não nutritiva.
- ( ) Os reflexos de procura, de sucção, de vômito, de mordida fásica e de deglutição devem ser observados e avaliados, pois contribuem para o prognóstico da alimentação via oral.
- ( ) Quadro respiratório estável, mesmo com balanço calórico inferior a 90 cal/kg/dia, deve ser considerado como parâmetro favorável à transição da sucção não nutritiva para a alimentação oral.
- ( ) Para que seja indicada a alimentação por via oral, é importante observar se o recém-nascido apresenta um padrão adequado de sucção, e por quanto tempo este padrão é mantido durante as mamadas.
- ( ) A sucção e a deglutição de bebês pré-termo devem ser avaliadas somente próximo à alta hospitalar para evitar ou reduzir situações de estresse que possam desorganizar o bebê e interferir no quadro de saúde geral.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F
- B) V V F F V
- C) F V F V F
- D) F V V F F
- E) F F V F V

**Questão 37 (Peso 1,00)**

Sobre a terapia nutricional neonatal, analise as assertivas a seguir.

Em neonatos prematuros com idade gestacional a partir de 30 semanas, observa-se, com frequência, a incoordenação respiração-deglutição e imaturidade do reflexo de engasgo, e, desta forma, a via de nutrição recomendada é a enteral

**PORQUE**

em torno de 28-30 semanas de gestação o trato gastrointestinal ainda é imaturo, no entanto já é capaz de realizar a absorção dos nutrientes necessários para o crescimento extrauterino.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- A) as duas assertivas são falsas.
- B) a primeira assertiva é falsa e a segunda é verdadeira.
- C) a primeira assertiva é verdadeira e a segunda é falsa.
- D) as duas assertivas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- E) as duas assertivas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

**Questão 38 (Peso 1,00)**

Os quadros de demência mais frequentes são encontrados em pessoas com doença de Alzheimer. Nesta doença, os comprometimentos de memória, de linguagem, de habilidades viso espaciais e funções executivas são insidiosos e estão presentes desde as fases iniciais (BRANDÃO; FREITAS, 2014).

Sobre as características do comprometimento da linguagem nestes casos, é correto afirmar que

- A) o conteúdo expressivo pode ser vago e impreciso, ocorrendo mudanças abruptas de assuntos que produzem incoerências no discurso.
- B) as parafasias semânticas são comuns e decorrem da degradação de atributos semânticos que possibilitam a diferenciação de significados.
- C) a ocorrência de substituições e omissões fonêmicas são raras e, quando presentes, são atribuídas a problemas específicos no sistema fonológico.
- D) os distúrbios pragmáticos tipicamente se expressam por dificuldade de compreensão da conversação em decorrência de déficits de memória episódica e de trabalho.
- E) os distúrbios sintáticos são mais significativos nos aspectos relacionados à expressão do que à compreensão, uma vez que a produção de estruturas sintáticas é um processo relativamente automático.

**Questão 39 (Peso 1,00)**

A triagem auditiva neonatal universal é o principal meio para detecção precoce da perda auditiva e todas as crianças, com ou sem indicadores de risco para a deficiência auditiva (IRDA), devem ser testadas ao nascimento através de medidas fisiológicas da audição, como as emissões otoacústicas (EOA) e os potenciais evocados de tronco encefálico (PEATE).

Considerando as Diretrizes de Atenção da Triagem Auditiva Neonatal, publicadas pelo Ministério da Saúde em 2012, sobre o protocolo para neonatos com IRDA, é correto afirmar que

- A) o registro das EOA transientes é recomendado como teste, pois é um método rápido, simples, não invasivo e com alta sensibilidade e especificidade.
- B) o reteste com EOA transientes é recomendado, pois diminui os índices de falso-positivos devido às alterações de orelha média muito comuns nesta faixa etária.
- C) o PEATE automático é utilizado como teste e reteste, devido à maior prevalência de perdas auditivas retrococleares nesta população, as quais não são identificáveis através do teste com EOA transientes.
- D) o teste com PEATE automático é indicado, e, em casos de falha bilateral, o reteste deve ser realizado com o mesmo procedimento. Para os casos de falha unilateral, é recomendado o reteste com EOA transientes.
- E) o teste com PEATE automático é indicado, e, em casos de falhas uni ou bilateral, é recomendado o reteste com EOA transientes, pois diminui os índices de falso-positivos devido às alterações de orelha média muito comuns nesta faixa etária.

**Questão 40 (Peso 1,00)**

A linguagem e a audição de crianças com indicadores de risco para perda auditiva devem ser monitoradas até os dois anos de idade. Considerando a avaliação comportamental da audição nesta faixa etária, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A presença do reflexo cócleo-palpebral não exclui perda auditiva na melhor orelha.
- ( ) Os testes de fala podem ser realizados em crianças sem linguagem oral expressiva.
- ( ) A avaliação com instrumentos não calibrados permite a identificação do tipo e do grau da perda auditiva na melhor orelha.
- ( ) Com a maturação da função auditiva, observa-se redução do nível mínimo de resposta e maior complexidade das habilidades auditivas.
- ( ) Para a avaliação da habilidade auditiva de localização sonora, são apresentados estímulos sonoros decrescentes de forma alternada entre as orelhas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V F
- B) V V F V F
- C) F V F V V
- D) F V V F F
- E) F F V F V

**Questão 41 (Peso 1,00)**

Os potenciais auditivos evocados de tronco encefálico (PEATE) são utilizados para a triagem auditiva neonatal e o diagnóstico audiológico em crianças. Sobre a influência da imaturidade neurofisiológica nos achados do PEATE em neonatos com integridade das vias auditivas em comparação com o padrão encontrado em adultos, é correto afirmar que

- A) os parâmetros das respostas eletrofisiológicas não diferem, pois o processo maturacional das vias auditivas se completa durante o período gestacional.
- B) as latências absolutas das ondas I, III e V são menores, pois o processo ativo de mielinização das fibras nervosas promove uma aceleração das respostas eletrofisiológicas.
- C) os parâmetros das respostas eletrofisiológicas são diferentes apenas em neonatos pré-termo, pois o processo de maturação das vias auditivas ocorrerá para esta população ao longo do primeiro ano de vida.
- D) a latência absoluta da onda I é maior, porém a imaturidade não modifica os demais parâmetros, pois as fibras em processo de mielinização apresentam condução neurofisiológica mais lenta apenas na porção periférica da via auditiva.
- E) os parâmetros das respostas eletrofisiológicas são diferentes, pois, apesar do sistema estar completamente formado ao nascimento, o processo maturacional do nervo auditivo e tronco encefálico continua em desenvolvimento até os 18 meses.

**Questão 42 (Peso 1,00)**

Lesões ou disfunções nos \_\_\_\_\_ geram quadros disártricos do tipo \_\_\_\_\_, frequentemente observados em indivíduos com doença de Parkinson. Nestes quadros, as alterações vocais são caracterizadas por voz \_\_\_\_\_ em decorrência \_\_\_\_\_ da amplitude dos movimentos respiratórios e da competência glótica.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) núcleos da base / hipocinético / fraca / da redução
- B) núcleos da base / espástico / áspera / do aumento
- C) núcleos da base / hipercinético / rouca / da redução
- D) neurônios motores inferiores / flácido / instável / da redução
- E) neurônios motores superiores / espástico / rugosa / do aumento

**Questão 43 (Peso 1,00)**

A disfagia orofaríngea mecânica é um distúrbio da deglutição caracterizado pela dificuldade secundária à perda sensorial e/ou muscular de estruturas responsáveis pela deglutição fisiológica normal, como nos casos de traumas e câncer de cabeça e pescoço. Considerando a intervenção fonoaudiológica neste tipo de disfagia, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A técnica de empuxe é recomendada para a maximização da atividade esfíntérica da faringe, favorecendo a proteção das vias aéreas.
- ( ) A manobra de anteriorização da língua, associada com a deglutição seca, auxilia na movimentação da musculatura oro e laringofaríngea.
- ( ) A manobra de esforço, na qual o paciente é orientado a contrair com força a língua e os músculos da faringe durante a deglutição, é indicada para pacientes que apresentam acúmulo de resíduos na base da língua após a deglutição.
- ( ) A maximização da mobilidade de estruturas remanescentes como lábios, bucinadores, mandíbula, parede posterior da faringe e elevação da laringe é uma estratégia de tratamento para favorecer a deglutição após ressecções orofaríngeas.
- ( ) Exercícios de variação da altura com vogais podem ser associados ao movimento de posteriorização da mandíbula, pois favorecem a elevação e anteriorização da laringe durante a fase faríngea da deglutição, minimizando a aspiração de alimentos.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V F
- B) F V V V F
- C) F F V F V
- D) V F F V F
- E) V V F F V

**Questão 44 (Peso 1,00)**

O Método Canguru é um modelo de assistência peri-natal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado, que parte dos princípios da atenção humanizada, com o objetivo de reduzir o tempo de separação entre a família e o recém-nascido hospitalizado, favorecendo o vínculo, a melhora clínica e a qualidade do desenvolvimento neurocomportamental e psico-afetivo do recém-nascido (BRASIL, 2011).

Considerando os critérios de elegibilidade para acompanhamento dos bebês nas diferentes etapas do método canguru, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| (1) Primeira etapa | ( ) Bebê com nutrição enteral plena.         |
| (2) Segunda etapa  | ( ) Bebê com sucção exclusiva no peito.      |
| (3) Terceira etapa | ( ) Identificação de gestação de alto-risco. |
|                    | ( ) Bebê com peso mínimo de 1.250 gramas.    |
|                    | ( ) Bebê com peso mínimo de 1.600 gramas.    |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 1 2 3 1 2
- B) 2 1 3 2 3
- C) 2 3 1 2 3
- D) 2 3 1 3 2
- E) 3 2 1 2 3

**Questão 45 (Peso 1,00)**

As malformações congênitas do trato digestivo precisam ser identificadas o mais precocemente possível para que o adequado tratamento cirúrgico seja realizado com urgência, reduzindo a morbimortalidade em neonatos.

Considerando os sinais clínicos observados nestas afecções, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Presença de salivação abundante e espumosa, acompanhada de tosse e crises de asfixia, é um sinal de alerta para investigação de atresia de esôfago em neonatos.
- ( ) As obstruções gástricas congênitas são alterações frequentes em recém-nascidos e o quadro clínico é caracterizado por vômito bilioso frequente nas primeiras 24 horas de vida.
- ( ) Em neonatos com fístula traqueo-esofágica sem atresia do esôfago, crises de asfixia e cianose são observadas após a deglutição, e não durante a ingestão do leite, pois a passagem do líquido para a via aérea ocorre no momento em que o neonato arrota ou regurgita.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F
- B) V F V
- C) F V V
- D) F F V
- E) F V F

**Questão 46 (Peso 1,00)**

“A vigilância em saúde detém conhecimentos e metodologias que auxiliam a gestão para o conhecimento da realidade, identificação de problemas, estabelecimento de prioridades de atuação e melhor utilização dos recursos em busca de resultados efetivos, fundamentais para a elaboração do planejamento” (BRASIL, 2009, p. 18).

Sobre a gestão e vigilância em saúde, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) Recomenda-se para análise da situação de saúde utilizar os sistemas de informação disponíveis, os indicadores de saúde, as fontes diversas de dados, o processamento estatístico, a construção de séries temporais, a desagregação por grupos e a distribuição territorial.
- ( ) Outro aspecto fundamental da vigilância em saúde é o cuidado integral à saúde das pessoas por meio da promoção da saúde. Essa política objetiva promover a qualidade de vida, estimulando a população a reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais.
- ( ) A análise da situação de saúde permite a identificação, descrição, priorização e explicação dos problemas de saúde da população, por intermédio da: caracterização da população, caracterização das condições de vida, caracterização do perfil epidemiológico e descrição dos problemas. Contudo, essa análise deve ser realizada pelo nível central do Ministério da Saúde, já que este possui os indicadores capazes de traçar melhor as estratégias a serem realizadas.
- ( ) O planejamento das ações de vigilância em saúde deve ser desenvolvido de forma ascendente, articulada, integrada e solidária entre os três níveis de gestão. Para tal, os níveis devem seguir o planejamento previsto nas políticas desenvolvidas pelo nível federal, pois nestas há um estudo efetivo de cada território, fortalecendo os objetivos e diretrizes do SUS. Além disso, deve buscar o monitoramento e a avaliação do SUS, bem como promover a participação social e a integração intra e intersetorial, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F V F V
- B) F F F V
- C) V V V F
- D) V F V F
- E) V V F F

**Questão 47 (Peso 1,00)**

“A paralisia cerebral descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e postura atribuído a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa” (Brasil, 2013).

Considerando a classificação da paralisia cerebral segundo as características clínicas mais dominantes, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- |                 |     |                                 |
|-----------------|-----|---------------------------------|
| (1) Atáxica     | ( ) | Distonia.                       |
| (2) Espástica   | ( ) | Sistema piramidal.              |
| (3) Discinética | ( ) | Sistema extrapiramidal.         |
|                 | ( ) | Aumento do tônus muscular.      |
|                 | ( ) | Cerebelo e vias cerebelares.    |
|                 | ( ) | Aumento da base de sustentação. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 3 2 3 2 1 1
- B) 3 2 1 2 3 1
- C) 1 3 2 3 2 1
- D) 2 1 3 2 3 1
- E) 2 3 2 3 1 1

**Questão 48 (Peso 1,00)**

A traqueostomia é indicada quando há obstrução da via aérea, retenção de secreção e outras insuficiências respiratórias. Esta intervenção compromete a anatomia e a fisiologia de sistemas envolvidos na respiração, comunicação e alimentação.

Considerando o impacto da traqueostomia na fonação e deglutição, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) As alterações vocais em pacientes traqueostomizados ocorrem devido ao aumento da pressão infraglótica e conseqüente comprometimento da mobilidade e força da musculatura intrínseca da laringe.
- ( ) A intubação prolongada está associada a alterações da mecânica fonatória, as quais permanecem após a extubação, sendo potencializadas pelas modificações decorrentes da presença da cânula de traqueostomia.
- ( ) O balão insuflado pode comprometer a fase esofágica da deglutição, mesmo após a desinsuflação deste, pois a dificuldade no trânsito do alimento no esôfago pode permanecer em função da dilatação promovida pelo balão.
- ( ) A presença da traqueostomia reduz a pressão e a quantidade do fluxo aéreo, comprometendo o reflexo de tosse e, conseqüentemente, aumentando o risco de aspiração pela ineficiência do efeito de limpeza em casos de entrada de alimento nas vias aéreas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F
- B) V F F F
- C) F V V F
- D) F V F V
- E) F V V V

**Questão 49 (Peso 1,00)**

As discussões sobre Redes de Atenção à Saúde (RAS) têm auxiliado na organização da atenção às doenças agudas e às doenças crônicas no Brasil. Entende-se por Redes de Atenção à Saúde organizações \_\_\_\_\_ de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral à determinada população, coordenada pela atenção \_\_\_\_\_, cuja organização acontece em territórios sanitários definidos pelos fluxos sanitários da \_\_\_\_\_.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) poliárquicas / hospitalar / gestão
- B) hierárquicas / primária à saúde / regionalização
- C) hierárquicas / especializada / população em busca de atenção
- D) poliárquicas / primária à saúde / população em busca de atenção
- E) hierárquicas / primária à saúde / população em busca de atenção

**Questão 50 (Peso 1,00)**

No bojo das discussões sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), como um arranjo organizativo de ações e serviços de saúde, foram priorizadas, para implantação no Brasil, cinco redes temáticas, conforme a Portaria GM/MS nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A alternativa que apresenta os três elementos constitutivos das RAS é

- A) Estrutura operacional, sistema de governança da rede e regulação.
- B) População, modelos de atenção à saúde e responsabilidade sanitária.
- C) Atenção às condições crônicas, sistema logístico e Atenção Primária à Saúde.
- D) Qualidade de vida dos usuários, atenção diferenciada e sistema de acesso regulado.
- E) População/Região de Saúde definidas, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.